Braulio Araya M.
Guillermo Millie H.

GUIA DE CAMPO DE LAS AVES DE CHILE

Colección
FUERA DE SERIE

EDITORIAL UNIVERSITARIA

VISIT…

GUIA DE CAMPO
DE LAS AVES DE CHILE

Colección
FUERA DE SERIE

© 1986, BRAULIO ARAYA MÖDINGER,
GUILLERMO MILLIE H.
Inscripción N° 70.510. Santiago de Chile
Derechos de edición reservados por
© Editorial Universitaria, S.A.
María Luisa Santander 0447. Fax: 56-2-2099455
Santiago de Chile

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos o químicos, incluidas las fotocopias, sin permiso escrito del editor

ISBN 956-11-0683-2
Código interno: 000511-8

Texto compuesto con matrices *Linotron Times 8/9*

Se terminó de imprimir esta
QUINTA EDICIÓN
en los talleres de Editorial Universitaria
San Francisco 454, Santiago de Chile
en el mes de agosto de 1992

CUBIERTA

Una pareja de cormoranes antárticos,
***Phalacrocorax atriceps bransfieldensis*, en su nido.**
(Foto de *Franz Lazi,* Stuttgart)©

DECLARADO MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSULTA DE LA EDUCACIÓN CHILENA PARA LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGÍA EN NIVEL DE 7° Y 8° BÁSICO, SEGÚN ORD. 05/1547 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1989 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

GUIA DE CAMPO
DE LAS
AVES DE CHILE

por

Braulio Araya Mödinger

Ex Profesor

Universidad de Chile y
Universidad de Valparaíso

Research Associate

Sea World Research Institute

Hubbs Marine Research Center

Guillermo Millie Holman

Ex Profesor

Universidad de Chile

Dibujos de

Mariano Bernal Morales

Universidad de Valparaíso

EDITORIAL UNIVERSITARIA

I N D I C E

Pág.

Signos y abreviaturas 10
Prólogo a la primera edición 11
Prólogo a la segunda edición 13
Introducción 14
Las aves de este libro 14
La conservación de las aves 17
Topografía de un ave 23
Topografía de un ala 23
Topografía de una pluma 24
Medidas que se toman en un ave 24
Tipos de colas 25
Topografía de un pico 26
Perdices sudamericanas Familia Tinamidae 28
Ñandúes Familia Rheidae 32
Zambullidores Familia Podicipedidae 34
Albatros Familia Diomedeidae 38
Petreles y Fardelas Familia Procellariidae 44
Golondrinas de mar Familia Oceanitidae 66
Petreles zambullidores Familia Pelecanoididae 72
Pingüinos Familia Spheniscidae 74
Aves del trópico Familia Phaethontidae 82
Piqueros Familia Sulidae 84
Pelícanos Familia Pelecanidae 88
Cormoranes Familia Phalacrocoracidae 90
Aves fragata Familia Fregatidae 94
Garzas y Huairavos Familia Ardeidae 96
Bandurrias, Cuervos de pantano y Espátulas Familia Threskiornithidae 102
Bandurrias y Cuervos de pantano Subfamilia Threskiornithinae 102
Espátulas Subfamilia Plataleinae 104
Cigüeñas Familia Ciconiidae 106
Flamencos Familia Phoenicopteridae 108
Cisnes, Gansos y Patos Familia Anatidae 110

Pág
Patos silbones, Cisnes y Gansos Subfamilia Anserinae....110
Patos Subfamilia Anatinae. 116
Cóndores y Jotes Familia Cathartidae. 130
Aguilas, Aguiluchos, Peucos y Bailarines Familia Accipitridae 134
Aguilas pescadoras Subfamilia Pandioninae. 134
Aguiluchos, Peucos y Bailarines Subfamilia Accipitrinae ... 136
Halcones, Tiuques y Traros Familia Falconidae. 144
Faisanes y Codornices Familia Phasianidae. 152
Taguas y Pidenes Familia Rallidae. 154
Chorlos cabezones Familia Burhinidae. 164
Chorlos y Queltehues Familia Charadriidae. 166
Pilpilenes Familia Haematopodidae. 176
Perritos y Caitís Familia Recurvirostridae. 178
Jacanas Familia Jacanidae. 180
Becacinas pintadas Familia Rostratulidae. 182
Playeros, Pollitos de mar, etc. Familia Scolopacidae. 184
Playeros, Becacinas, Zarapitos, etc. Subfamilia Scolopacinae 184
Pollitos de mar Subfamilia Phalaropodinae. 202
Perdicitas Familia Thinocoridae. 204
Palomas antarticas Familia Chionididae. 208
Salteadores, Gaviotas, Gaviotines y Rayadores Familia Laridae 210
Salteadores Subfamilia Stercorariinae. 210
Gaviotas Subfamilia Larinae. 214
Gaviotines Subfamilia Sterninae. 220
Rayadores Subfamilia Rynchopinae. 230
Palomas y Tórtolas Familia Columbidae. 232
Loros Familia Psittacidae. 240
Cuclillos Familia Cuculidae. 242
Lechuzas Familia Tytonidae. 244
Buhos Familia Strigidae. 246
Gallinas ciegas Familia Caprimulgidae. 250
Vencejos Familia Apodidae. 252
Picaflores Familia Trochilidae. 254
Martín pescadores Familia Alcedinidae. 260
Carpinteros Familia Picidae. 262
Mineros, Bandurrillas, Churretes, Canasteros, etc. Familia Furnariidae. 266

Pág
Tapaculos Familia Rhinocryptidae 288
Cazamoscas sudamericanos Familia Tyrannidae 294
Raras Familia Phytotomidae 318
Golondrinas Familia Hirundinidae 320
Chercanes Familia Troglodytidae 326
Muscicápidos Familia Muscicapidae 328
Zorzales Subfamilia Turdinae 328
Tencas Familia Mimidae 332
Bailarines chicos Familia Motacillidae 334
Verderones Familia Vireonidae 336
Emberízidos Familia Emberizidae 336
Cerrojillos Subfamilia Parulinae 336
Tángaras Subfamilia Thraupinae 338
Cardenales, Pepiteros, etc. Subfamilia Cardinalinae 340
Chirihues, Chincoles y Semilleros Subfamilia Emberizinae . . 342
Loicas y Tordos Subfamilia Icterinae 350
Jilgueros, Diucas y Yales Familia Fringillidae 356
Gorriones Familia Passeridae 368

Glosario 371
índice de nombres científicos 379
índice de nombres comunes en español 373
Index (nombres comunes en inglés) 387
Register (nombres comunes en alemán) 395
Literatura consultada 403

SIGNOS Y ABREVIATURAS

D.		= distribución
ad.		= adulto
juv.		= juvenil
inm.		= inmaduro
subad.		= subadulto
f.	cl.	= fase clara
f. obs.		= fase obscura
pr.		= plumaje de reposo
♂		= macho
♀		= hembra

P R O L O G O
a la primera edición

De acuerdo a varias referencias antiguas, el nombre de nuestro país, Chile, derivaría de la antropomorfización del canto de ciertas aves autóctonas. Una de ellas parece ser el Trile (Agelaius thilius), ave palustre y, posiblemente otro, un ermitaño misterioso de la floresta austral, el Colilarga (Sylviorthorhynchus desmursii) ¿Cuántos chilenos identificamos a estas dos especies de aves nuestras? ¿Conocemos su ambiente típico? ¿Qué rol desempeñan en él? ¿Qué alteraciones ambientales pueden afectar su sobrevivencia? Estas y otras preguntas no creo que puedan ser respondidas por más de un centenar de personas, demostrando así una penosa realidad en el conocimiento de nuestro valioso patrimonio ecológico.

Chile posee una obra ornitológica monumental, publicada en 1932 por el destacado museólogo norteamericano Charles E. Hellmayr, sin figuras, en inglés y cargada de tecnicismos, por lo que resulta difícil de consultar para cualquier laico en estas materias. Posteriormente, en los años 1945 y 1951 se publicaron los tan esperados y avanzados textos para la época, por Goodall, Johnson y Philippi, de líneas más livianas para la lectura y láminas en colores dibujadas por el primer autor. Las ediciones de este elemental texto en castellano, en dos volúmenes, y la de su reimpresión mejorada, más otra reactualizada en inglés por Johnson en 1965 y 1967, ya no se pueden adquirir en ninguna parte y son pesados para el bolsillo del moderno hombre de terreno, ecólogo u ornitólogo aficionado. Esfuerzos recientes en el sentido de hacer guías de terreno para aves, son locales, como máximo de alcance regional, como el loable esfuerzo de Claudio Venegas para las aves de Magallanes, pero que no trascienden a todo público y no llegan a ser un estándar nacional.

La obra que Ud. tiene ante sí, señor lector, se refiere a todas las aves de la república, ya sea de cordillera, mar, valles, desiertos, bosques y litoral. Permite identificar y descubrir a las especies en todos esos ambientes para el estudio, deleite recreacional, objetivo del fotógrafo y también para inspiración del poeta, folclorista o amante de la natura-

leza. No es un texto para el que busca fines consumistas o comerciales con las aves, o para el cazador que desea encontrar nuevas presas para satisfacer sus primitivos instintos atávicos, o para el inculto que desea hacer puntería con su honda. Es para poner ante nuestros connacionales la existencia de estos seres que llenan el ambiente con su canto, vuelos, aleteos, molestos a veces, pero siempre una fuente de descanso para el espíritu y una inspiración ¿Por qué nuestros antepasados araucanos y otros pueblos aborígenes tenían sus apellidos y nombres con etimologías inspiradas en características del paisaje o de la fauna o creaban objetos artesanales con forma de aves para incentivar o enriquecer sus cultos?

Esta obra de Braulio Araya Mödinger, Guillermo Millie Holman y del dibujante Mariano Bernal Morales se ha plasmado luego de años de pacientes esfuerzos para conocer, dibujar y describir las especies, más la lucha por el financiamiento esquivo, para que Ud., amigo de la naturaleza, tenga en sus manos esta práctica y útil herramienta de terreno, que espero eduque e incentive el conocimiento de nuestra avifauna y así compartir con los entendidos en la protección integral de nuestras especies y el tan poco amado y apreciado rico ambiente chileno. Con esta obra se está, pues, contribuyendo a guiar al público para lograr un mundo ecológicamente más saludable y con ello asegurar este patrimonio para las futuras generaciones.

No cabe más que congratular por este esfuerzo y su tenacidad y visión a Braulio, ornitólogo y amigo, quien en sus andanzas desde el cálido desierto y la transparente puna hasta las heladas tierras antárticas, ha podido cristalizar uno de los anhelos de su vida.

Roberto P. Schlatter, Ph. D.
Médico Veterinario
Instituto de Zoología
Universidad Austral de Chile

Valdivia, diciembre de 1985.

P R O L O G O
a la segunda edición

Agotada rápidamente la primera edición de este libro, presentamos ahora una segunda edición con algunas correcciones y adiciones.

Se han agregado los nombres comunes de las aves en inglés y alemán, para facilitar la consulta por los anglo y germanoparlantes, que cada día visitan nuestro país en mayor número para observar sus aves. Para los primeros se han consultado los trabajos de Schauensee y la "Check-list" de la American Ornithologists' Union. Para los nombres en idioma alemán, hemos contado con una lista proporcionada por el señor Horst Hanemann de Bad Durreheim, Alemania Federal.

También se han agregado fotografías en colores de algunas aves, para que con su colorido ilustren y adornen las páginas de esta obra.

Agradecemos al señor Guillermo Egli, del Colegio Suizo de Santiago por la revisión de los nombres en alemán y al señor Hanemann por habernos enviado la lista de dichos nombres. Agradecemos especialmente al señor Frank S. Todd, de Ecocepts International de San Diego, California, por las hermosas fotografías en colores que nos proporcionó.

BRAULIO ARAYA M.

Viña del Mar, octubre de 1988

INTRODUCCION

Este trabajo se inició hace ya algunos años con el auspicio y financiamiento de la Universidad de Chile. Cuando la Sede de Valparaíso de esa Universidad se constituyó en la Universidad de Valparaíso, contamos con el apoyo de esta nueva Casa de Estudios.

Don Guillermo Millie Holman (1909-1977) participó en las primeras fases de este proyecto, en la recopilación de antecedentes bibliográficos, en numerosas salidas a terreno en que se recolectaron ejemplares y se tomaron cientos de fotografías de aves.

Para la realización de esta obra efectuamos numerosas expediciones al norte y sur del país, tanto a la costa como a la cordillera, recorriendo miles de kilómetros, haciendo observaciones de las aves en su hábitat, fotografiándolas y recolectando ejemplares. Don Guillermo Millie participó en el crucero Marchile VIII, en agosto y septiembre de 1972, lo que le permitió fotografiar muchas aves marinas. Braulio Araya tomó parte en varias expediciones antárticas, permitiéndole acumular una gran cantidad de material relativo a las aves del Continente helado.

LAS AVES DE ESTE LIBRO

En Chile se encuentran 439 especies de aves representantes de 56 familias. De este total anidan en nuestro país aproximadamente 296 especies. Las familias mejor representadas son Procellariidae, con 32 especies entre las aves marinas, y Tyrannidae, con 35 especies entre las terrestres. Son exclusivamente chilenas, es decir, no se encuentran fuera de los límites de Chile, 6 especies continentales y 5 insulares.

La avifauna de Chile representa alrededor del 5% del total mundial, que se calcula en aproximadamente 8.600 especies.

Aparecen aquí todas las aves que se encuentran dentro de los límites del territorio nacional, tanto las residentes, visitantes habituales u ocasionales y las que han sido señaladas sólo una vez para Chile. Por lo tanto, se incluyen las aves del territorio chileno desde su límite norte

colindante con el Perú hasta el cabo de Hornos y 200 millas de mar adyacente, las del Territorio Chileno Antartico (90° a 52°W) y de las islas oceánicas, tales como Pascua, Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio y el archipiélago Juan Fernández.

Esta guía de campo es un instrumento que permite a la persona interesada en las aves, ya sea como actividad profesional o como aficionado, identificarlas en el terreno con la ayuda de un par de binoculares. En los dibujos hechos por Mariano Bernal se muestran las aves en plumaje de reproducción o normal, salvo que se indique lo contrario, y se destacan los caracteres que permiten su individualización. La longitud total (L) es sólo aproximada y es la medida tomada con un compás desde la punta del pico hasta el extremo de la cola de un ave descansando en su espalda. La envergadura (E) es la distancia de punta a punta de las alas estiradas al máximo y se da para algunas especies. Las aves no están dibujadas a escala.

Se han dibujado sólo las especies indicándose en el texto las características y distribución de las subespecies, cuando es pertinente. Se han dibujado láminas en que se explica la terminología de la topografía de las aves, del pico y de las diferentes clases de cola.

La secuencia de las familias es la de la "American Ornithologists" Union Check-list" (1983) y la de las especies es la de Meyer de Schauensee (1970), con ligeras modificaciones. Los nombres comunes son los que aparecen en la Lista Patrón de las Aves Chilenas (Araya 1985).

A G R A D E C I M I E N T O S

Agradecemos sinceramente al Servicio de Desarrollo Científico y Creación Artística de la Universidad de Chile, que financió inicialmente este trabajo; al señor George E. Moffet, de Edgartown, Mass., U.S.A., por su asistencia financiera; al Dr. George E. Watson, ex Curador de Aves del National Museum of Natural History, de la Smithsonian Institution, Washington D.C., U.S.A.; al Dr. Jorge R. Navas, del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", de Buenos Aires, Argentina, por prestarnos pieles de aves; al Lic. Michel Sallaberry, Jefe de la Sección Aves del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago; a la señora Erika Behn, de Zapallar, por

permitirnos examinar la colección del Museo y la colección Behn, respectivamente; al señor Ronald Templeton, de Aberdeen, Escocia, por las fotografías de aves del extremo sur del país que nos regaló; al Sr. John McNutt, de Seattle, Washington, por permitirnos usar sus fotos de Falco kreyenborgi; al señor Mateo Martinic, ex Rector del Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, por permitirnos fotografiar la colección de aves de ese Instituto; al Sr. Jorge Morales, de caleta Higuerilla, Concón, por los ejemplares de aves que recolectó para nosotros, y al Sr. Enrique Couve M., de Viña del Mar, por las pieles de estudio que nos donó.

Agradecemos muy especialmente al Dr. Roberto Schlatter, Profesor Titular de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, por el prólogo y la revisión del manuscrito; al Dr. Jürgen Rottmann, de la Corporación Nacional Forestal, por haber escrito la parte de conservación, y al señor William Belton, Chairman de la Sección Panamericana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, por sus esfuerzos por ver cristalizada esta obra.

Finalmente, nuestro agradecimiento a las secretarias del Instituto de Oceanología, señoras Ester Contreras A. y Carmen Gloria Arancibia, quienes mecanografiaron numerosas versiones del texto.

La conservación de las aves

Conservación (Del lat. conservatio, -onis) f. Acción y efectos de conservar.

Conservar (Del lat. conservare; de cum, con y servare, guardar) tr. Mantener una cosa o cuidar de su permanencia. 2. Mantener vivo y sin daño a uno. 3. ... 4. Guardar con cuidado una cosa.

Real Academia Española 1984, Diccionario de la Lengua Española I, Espasa Calpe, Madrid.

En Ciencias Naturales se entiende por conservación las medidas que buscan minimizar o prevenir la disminución o extinción de especies o razas en un área dada y, en forma más general, evitar cualquier cambio innecesario o súbito de las condiciones de vida de los vegetales y animales.

Para lograr una conservación se debe estudiar los factores que influyen en la elección y explotación exitosa del hábitat por diferentes especies, efectuar investigaciones de los factores del suelo, clima, hidrología, vegetación y fauna, los que en conjunto determinan la naturaleza de cualquier hábitat e investigaciones de la etología, ecología, dinámica de poblaciones y distribución.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) preparó un documento titulado "Estrategia Mundial para la Conservación". Como principio básico, se postula que se debe conservar el material genético presente en todas las especies, los procesos vitales como la fotosíntesis, el flujo energético, la reproducción, el crecimiento, etc. y la productividad de los ecosistemas y de las poblaciones. Se postula que se debe tender a un uso sostenido de los recursos, conservando la productividad. Esto sólo se logra si jamás se

sobreexplota una especie o ecosistema, o sea, que nunca se use más que el incremento neto anual.

También en la Declaración de Principios del Consejo Internacional para la Conservación de las Aves (cipa) encontramos ideas directrices para enfocar este asunto en las aves y del que extractamos algunas:

— Las aves siempre han inspirado y encantado al hombre desde el punto de vista estético y no solamente han influenciado muchas culturas del pasado sino que también han adquirido en nuestros días una gran importancia para la recreación, con el resultado de un aumento creciente en el número de miembros de organizaciones especialmente dedicadas a su estudio y conservación.

— Las aves juegan un rol importante como indicadores biológicos del estado de los ecosistemas naturales, dando un aviso anticipado de cambios ambientales que pueden resultar dañinos para la gente.

— Las aves cumplen una función ecológica importante al ayudar a mantener los procesos naturales, incluyendo el control de muchas pestes.

— Las aves tienen un potencial como recurso natural.

— Las aves tienen un gran valor en un número importante de disciplinas científicas y contribuyen considerablemente a la comprensión de procesos y funciones ecológicas importantes del ambiente.

Sin embargo, la necesidad de proteger y usar racionalmente a las aves ha estado presente desde hace muchos años. Naturalistas, científicos y viajeros mencionaron la riqueza de aves de Chile, pero también hicieron ver la necesidad de protegerlos para que esta riqueza no se pierda.

La conservación es compleja; para que podamos seguir disfrutando la presencia de aves que hoy tenemos, debemos realizar investigaciones científicas para poder entender su biología, sus hábitos de vida y sus requerimientos. Se necesita que todos los aficionados a la observación de las aves estén atentos a posibles cambios o peligros que puedan amenazarlas. Si se interviene a tiempo se puede lograr mucho. Así por ejemplo se están protegiendo los cisnes en la laguna de Torca, los ñandúes en los Parques Nacionales Lauca y Torres del Paine y se está

librando una lucha por la supervivencia de la Tagua gigante en el lago Chungará.

La conservación en el largo plazo es perfectamente posible. Todas las aves se reproducen e incrementan si se evita la intervención del hombre. Se debe evitar el exceso de caza y la destrucción del ambiente en que viven. Se debe controlar el uso de biocidas, de depósitos de relaves, petróleo y sustancias venenosas y se debe combatir enfermedades y depredadores introducidos al país.

A través de la dictación de la Ley de Caza en 1929 y de varias normas complementarias posteriores se redactaron disposiciones para la protección de las aves en general o de grupos, como por ejemplo las aves guaneras. Aún no existe cuerpo legal que legisle sobre la protección del ambiente en que viven las especies, sin embargo, la creación de Parques Nacionales y otras áreas afines, los reglamentos y acciones que evitan los incendios forestales y las que regulan el uso de pesticidas, en cierto modo protegen al medio ambiente. Faltan disposiciones claras que protejan el medio acuático.

Existe conciencia que los cuerpos legales deben adaptarse a las situaciones del momento y deben ser perfeccionados; es por eso que cada cierto tiempo se dictan nuevas normas o se modifican las actuales.

Hay especies que ya no existen en Chile. Las llamativas espátulas vivían en la zona central. Su principal refugio era la laguna de Tagua-Tagua que hoy ya no existe, ha sido drenada, las aves perdieron su hogar favorito. Algo semejante está pasando con los flamencos, ya casi no se ven en Chile central. Las lagunas o pantanos en que vivían han sido modificados, el exceso de gente, de botes, motores y niños con rifles a postones y hondas las hacen inseguras. Sin embargo, a diferencia de la espátula, los flamencos aún sobreviven en el extremo sur y norte del país. Allí tampoco están seguros. Explotaciones mineras, captaciones de agua y otras actividades las amenazan. Sólo pocos ejemplares se cazan. Sin embargo, la mayoría de los huevos que ponen cada año son recolectados para ser consumidos.

La nueva ley de fomento de las obras de riego y drenaje que el Estado bonifica, no considera para nada el daño que pueden causar a la fauna en general y a las aves en particular. Debieran solicitarse estu-

dios de impacto ambiental del área a drenar o de las fuentes de agua a utilizar como motivo de las nuevas obras.

En los últimos años se ha visto que la conservación no tiene fronteras y es un problema mundial. Se han suscrito acuerdos internacionales sobre comercio y transporte internacional, aves migratorias, ambientes húmedos y varios más que igualmente están siendo perfeccionados cada día.

En Chile es un hecho que se han alcanzado progresos en la conservación de las aves, fruto de las medidas legales que las protegen, de la creación de los Parques Nacionales y Reservas Forestales y del mayor grado de cultura a este respecto alcanzado por sus habitantes.

Algunas especies que estaban a punto de desaparecer a causa de la persecución de que eran objeto, están recuperando sus niveles históricos de población. Tal es el caso de las garzas (Familia Ardeidae), especialmente la Garza grande y la Garza chica y el Cisne de cuello negro, entre otros. En otras especies, los resultados alcanzados por estas medidas de protección no están muy claros, a pesar de los esfuerzos realizados. Tal es el caso del Tricahue, la Torcaza y las tres especies de flamencos o parinas, cuyas poblaciones han declinado peligrosamente.

Al igual que las leyes, también las instituciones que velan para que se cumplan estas normas, deben adaptarse al mundo cambiante. Con agrado se vería la creación de un organismo único que abogue por la conservación de las aves. Hoy día el "Servicio Nacional de Pesca" está encargado de la protección de las aves marinas y algunas de aguas continentales. No existe ningún reglamento que especifique qué aves están en uno u otro grupo.

De la conservación de las aves terrestres se preocupa el "Servicio Agrícola y Ganadero", que será reemplazado por la "Corporación Nacional Forestal y de Recursos Naturales Renovables".

Ya que las normas legales vigentes son cambiantes, para estar al día en su conocimiento se debe pedir información a los servicios respectivos, los cuales publican folletos con las normas que regulan la caza o sobre otros aspectos legales.

Según las disposiciones vigentes actualmente, sólo dos especies de aves pueden ser cazadas en cualquier época del año. La mayoría de las

especies tiene una temporada de caza desde el 1° de abril al 31 de agosto. Para algunas especies la temporada es más corta (becacinas, patos, perdices).

Los años 1954 a 1956 fueron críticos para la Torcaza. Esta hermosa paloma de bosques ya diezmada por cazadores, se estaba muriendo por miles. No se podían culpar ni a los cazadores ni encontrar una relación entre la disminución y la modificación del ambiente por la tala y quema del bosque en que viven. Se trataba de un virus que llegó a Chile. La Torcaza no estaba adaptada a este nuevo flagelo que antes no había existido en nuestro país. Por suerte, sobrevivieron algunas torcazas en los lugares más remotos y gracias a que no fueron cazadas y debido a que encontraron suficiente alimento en los bosques, pudieron reproducirse y volver a poblar el paisaje chileno.

La supervivencia de varias aves marinas que habitan el archipiélago Juan Fernández no están amenazadas por enfermedades sino por depredadores introducidos a la isla. El coatí —un mamífero carnívoro—, los gatos asilvestrados, perros y ratas atacan a fardelas adultas o se comen los pichones o los huevos. Estas aves no saben defenderse contra carnívoros que jamás antes habían existido en la isla. Urge hacer algo para salvar a estas aves, siendo necesario controlar los depredadores.

Se podrían dar muchos ejemplos más, como la Perdiz que escasea debido a la intensa caza y captura o como el caso de aves rapaces o insectívoras que mueren envenenadas por pesticidas agrícolas.

Varias especies escasas o importantes como controladoras de plagas gozan de veda permanente, o sea, no pueden ser cazadas. Entre ellas figuran: Albatros, petreles y yuncos (Familias Diomedeidae, Procellariidae y Pelecanoididae); aves de rapiña en general, con la excepción del Peuco y el Traro, ambas consideradas dañinas, lo que es muy discutible; aves guaneras en general (Guanay, Piquero y Pelícano); Ñandúes, Bandurria, Lechuza y Buhos, Carpintero negro, Cisne coscoroba y Cisne de cuello negro, Cuervos de pantano (género Plegadis), Flamencos o Parinas, Garza grande y Garza cuca, Martín pescador, Pato cortacorrientes, Perdicita cordillerana, Pidén, todas las especies de pingüinos, Piuquén, Tagua gigante y Tagua cornuda, Torcaza, Tricahue, Perdiz copetona, Queltehue, Perrito y Caití.

Para las especies que se pueden cazar, existen normas sobre el máximo de ejemplares que se pueden obtener en cada cacería. También existen normas sobre los métodos permitidos y prohibidos, sobre criaderos de aves silvestres y sobre caza con fines científicos.

Pero no sólo debemos proteger a las aves con fines interesados, sino también por la belleza y por el lugar que ocupan en nuestro corazón estos hermosos seres alados. Con la conservación aseguraremos que nuestros nietos también puedan admirar las mismas aves que hoy nos alegran.

Dr. JÜRGEN ROTTMANN S.
Corporación Nacional Forestal

Santiago, diciembre de 1985.



Topografía de un ave

BORDE DE ATAQUE DEL ALA



BORDE DE FUGA DEL ALA

Topografía de un ala



Topografía de una pluma



Medidas que se toman en un ave

Tipos de colas



Cuadrada



Redondeada



Marginada



Cuneada o
Graduada

Cuneada con
plumas centrales
alargadas



Ahorquillada

Topografía de un pico



GUIA
DE CAMPO
DE LAS AVES DE CHILE

PERDICES SUDAMERICANAS — FAMILIA TINAMIDAE

Son aves de cuerpo compacto y alas cortas y redondeadas. La cola es muy corta y está cubierta por las plumas de contorno en algunas especies. El pico es algo largo y curvado. Las patas son cortas o moderadamente largas. Su coloración es castaña, café y gris con estrías, manchas o barras dispuestas en patrones crípticos. Ambos sexos son muy similares en coloración. La hembra es usualmente más grande. Ponen de 1 a 10 o más huevos de colores vivos y brillo de porcelana. Son incubados por el macho y los pollos son nidífugos.

Perdiz cordillerana — ***Nothoprocta ornata*** (Gray)

Ornate Tinamou - Pisacca

L. 35 cm. Partes superiores gris parduscas con vermiculaciones negras y bandas irregulares blanco amarillentas; pecho gris con barritas transversales de color café claro; parte inferior del pecho y flancos amarillo obscuro; abdomen blanco acanelado; corona negruzca con manchas blanco amarillentas.

Vive en la zona de la puna.

D. En la región de Tarapacá. hasta el salar del Huasco por el sur.

Perdiz chilena

Chilean Tinamou - Chile-Steisshuhn — ***Nothoprocta perdicaria*** (Kittlitz)

L. 29 cm. Partes superiores café grisáceas con manchas negras y líneas finas café amarillento obscuro y pecas blancas; garganta y centro del abdomen blanquecino; parte baja del cuello, pecho y lados del cuerpo de color gris cafesoso pálido. Pico con maxila color cuerno y mandíbula amarillenta; patas amarillas.

Se la encuentra en matorrales, pastizales y campos cultivados con cereales.

D. Está dividida en dos subespecies: la Perdiz chilena, *N.p. perdicaria*, desde el valle del Huasco hasta la provincia de Ñuble, y la Perdiz chilena del sur, *N. p. sanborni* Conover, desde la provincia de Linares hasta la de Llanquihue. Esta se distingue de la subespecie anterior porque las barras del dorso son más café rojizas, por carecer de gris en el pecho y ser en general más obscura

Introducida en la isla de Pascua. Se desconoce la subespecie.

Perdiz cordillerana de Arica

Andean Tinamou - Anden-Steisshuhn — ***Nothoprocta pentlandii*** (Gray)

L. 28 cm. Parecida a la especie precedente, pero más pequeña. Corona y nuca negruzcas; partes superiores pardo grisáceas con manchas negras y barras pardas en el centro y grises a los lados. Garganta, centro del pecho y centro del abdomen amarillo obscuro; flancos con barritas grisáceas y negras. Frente, lados de la cabeza, parte anterior del cuello y pecho gris azulado, este último con manchas blancas.

Vive en la alta cordillera.

D. Zonas de Putre y Socoroma. alta cordillera de Arica.



Perdiz cordillerana

Perdiz chilena





Perdiz cordillerana de Arica

Perdiz copetona ***Eudromia elegans*** Is. Geoffroy
Elegant Tinamou - Perl Steisshuhn

L. 42 cm. Tiene un largo y delgado copete negro sobre la cabeza. Las partes superiores con manchas finas negras y café amarillentas; el pecho con barras finas y el resto de las partes inferiores con barras más gruesas, negras y café amarillentas; rayas detrás del ojo y la garganta de color café amarillento.

Vive en pastizales y cerros áridos.

D. En Chile se la ha encontrado, hasta la fecha, solamente en Chile Chico, en la provincia General Carrera, región de Aysen.

Perdiz de la puna ***Tinamotis pentlandii*** **Vigors**
Puna Tinamou - Puna-Steisshuhn

L. 42 cm. Es la perdiz más grande de la zona y su coloración general es grisácea con rayas y manchitas amarillentas; partes inferiores gris claro con rayitas amarillentas; parte inferior del vientre castaño; cabeza y cuello con rayas longitudinales negras.

D. Zona de la puna de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Perdiz austral
Patagonian Tinamou - Patagonien-Steisshuhn ***Tinamotis ingoufi*** Oustalet

L. 39 cm. Cabeza y cuello blanquecinos con rayas longitudinales negruzcas; espalda y pecho gris azulado con ocráceo, con marcas centrales negras. Abdomen y primarias café rojizas.

Vive en estepas secas.

D. En Aysen y Magallanes.



Perdiz copetona

Perdiz de la puna

Perdiz austral

ÑANDUES — FAMILIA RHEIDAE

Son aves grandes, parecidas a las avestruces y pueden llegar a pesar 20 Kg. Son buenas corredoras, no pueden volar por tener las alas muy reducidas, con remiges largas y suaves. Las rectrices están ausentes. Tienen el pico ancho y aplanado. El cuello es largo al igual que las patas, que tienen tres dedos, lo que las diferencia de las avestruces que tienen dos. Viven en las pampas patagónicas y en la puna, formando pequeñas bandadas. Son aves polígamas y varias hembras ponen en un mismo nido 20 a 30 huevos blancos, los que son incubados por el macho; él se encarga también del cuidado de los pollos.

Ñandú — *Pterocnemia pennata* (d'Orbigny)

Lesser Rhea - Darwin-Strauss / Nandu

L. 95 cm. Ave grande de coloración general gris cafesosa con pintas blancas. Partes inferiores blanquecinas. Cuello largo de color pardo ocráceo. Patas largas de color amarillento. Pico pardo córneo.

Vive en campos abiertos, generalmente en grupos y corren a grandes velocidades.

D. En Chile existen dos razas: Ñandú de Magallanes, *P. p. pennata*, que habita en las pampas de Aysen y Magallanes e introducido en Tierra del Fuego, y Ñandú de la puna, *P. p. tarapacensis* Chubb, que se encuentra en la zona de la puna de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

Huala

Huairavo

Albatros oscuro de manto claro



Pingüino emperador

Ñandú



ZAMBULLIDORES — FAMILIA PODICIPEDIDAE

Los zambullidores son aves de plumaje satinado de coloración general negra o gris obscura por encima y blanca o moteada de café por debajo. El pico es puntiagudo (excepto en el Picurio) y largo en las especies grandes. Las alas son cortas y la cola rudimentaria. Los tarsos están comprimidos lateralmente y los dedos son lobulados. Nadan muy bien debajo del agua impulsándose con las patas, que están colocadas en posición muy posterior. Fabrican un nido flotante hecho de hojas largas de plantas acuáticas. Los huevos, 3 a 9, son de color blanco sucio y son incubados por ambos padres.

Pimpollo — ***Podiceps rolland*** (Quoy y Gaimard)
White-tufted Grebe - Rolland-Taucher

L. 26 cm. Cabeza y cuello negro con brillo metálico, con un penacho en la región auricular de color blanco con algunas plumas negras. Dorso de color negro con plumas bordeadas de café. Por debajo de color café rojizo mezclado con gris y blanquecino. Alas negras con banda transversal blanca. Pico negro; iris rojo. Patas gris verdosas.

Vive en lagos, lagunas, lagunas de los salares alto andinos y ríos tranquilos. Ocasionalmente en el mar.

D. Desde Tarapacá hasta Tierra del Fuego.

Blanquillo — ***Podiceps occipitalis*** (Garnot)
Silvery Grebe - Inka-T.

L. 28 cm. Coloración general gris cenicienta; partes inferiores de un color blanco puro. Lados de la cabeza con penacho de plumas finas de color gris o amarillo. Pico delgado y puntiagudo de color negro.

Vive en lagos y lagunas andinas. Raramente en el mar.

D. En nuestro país se encuentran dos subespecies; el Blanquillo, *P. o. occipitalis*, que vive desde la laguna del Negro Francisco, en Atacama, hasta Tierra del Fuego, y el Blanquillo del Norte, *P. o. juninensis* Berlepsch y Stolzmann. en la alta cordillera de Tarapacá y Antofagasta. Se diferencia de la subespecie precedente por tener el penacho grisáceo en vez de amarillo.

Picurio — ***Podilymbus podiceps*** (Linné)
Pied-billed Grebe - Binden-T.

L. 31 cm De tamaño algo mayor que el Blanquillo, se distingue con facilidad por ser el único zambullidor que carece de penacho o moño y por tener el pico grueso, algo corto y de dos colores, grisáceo y negro. Mentón negro que se destaca. Partes superiores gris obscuras; se nota zona blanca debajo de la cola.

Habita lagos, lagunas y ríos.

D. Desde Vallenar (Atacama) hasta Tierra del Fuego.



Pimpollo



Blanquillo



Picurio

Huala ***Podiceps major*** (Boddaert)
Great Grebe - Magellan-Taucher

L. 78 cm. Se distingue de las especies precedentes por su mayor tamaño y pico largo, ligeramente encorvado hacia arriba; cuello largo de color café rojizo, con parte posterior color pizarra; tiene un mechón eréctil de color negro sobre la cabeza. Dorso negro grisáceo y partes inferiores blancas; barra blanca en el ala.

Vive en lagunas, ríos y estuarios, encontrándose a veces en el mar hasta 5 km. de la costa.

D. En zonas bajas y costa desde Bahía Salada (Atacama) a Tierra del Fuego.



Huala

ALBATROS — FAMILIA DIOMEDEIDAE

Los albatros son las aves marinas de mayor tamaño. Tienen las alas largas y angostas. Su pico es grande y fuerte, con las aberturas nasales formadas por tubos colocados a ambos lados del culmen. Son de coloración general blanca y negra o completamente obscura. Las especies que anidan en el Hemisferio Sur, que son la mayoría, hacen nidos en forma de cono truncado hecho de barro, algas y hierbas. La postura es de un solo huevo blanco. Ambos padres se turnan en la incubación y los pollos son alimentados por regurgitación.

Albatros errante — ***Diomedea exulans*** Linné
Wandering Albatross - Wanderalbatros

L. 107 a 122 cm. E. Hasta 350 cm. El más grande de los albatros, sólo puede confundirse con el Albatros real. Es de color blanco con las puntas de las alas negras. Cola y grandes cubiertas alares moteadas de blanco y negro, aumentando el blanco con la edad. Pico rosado y patas color carne pálido. El juvenil es café negruzco, con la cara, garganta, parte inferior de las alas y ocasionalmente el vientre, blancos.

Con el ejemplar en la mano, se diferencia del Albatros real por tener los orificios nasales ligeramente dirigidos hacia arriba y no hacia adelante como aquél.

D. Tienen distribución circumpolar y se les encuentra en alta mar, frente a toda la costa chilena. Ocasionalmente cerca de tierra.

Albatros real — ***Diomedea epomophora*** Lesson
Royal Albatross - Königs-A.

L. 107 a 122 cm. E. Hasta 350 cm. Muy parecido al Albatros errante en tamaño y en apariencia. Tiene todo el cuerpo blanco, excepto áreas moteadas de negro en el dorso y en los flancos de los juveniles. La parte inferior de las alas es blanca en todas las edades; la parte superior de las alas es obscura, con un moteado variable de negro en los juveniles. El pico es grande, el color variando de cuerno pálido a rosado pálido. A corta distancia se nota una línea negra en el borde de la maxila

En vuelo la mano se dobla ligeramente hacia atrás, mientras que D. exulans la mantiene recta.

D. Se encuentra a lo largo de toda nuestra costa y penetra ocasionalmente en puertos y canales.

Albatros de ceja negra — ***Diomedea melanophris*** Temminck
Black-browed Albatross - Mollymauk

L. 80 cm. E. 225 cm. Es el único albatros chico que tiene el pico amarillo con la punta rosada. Cuerpo blanco y parte de encima de las alas y cola negras; alas por debajo blanco, marginadas de negro. Una raya apizarrada pasa a través del ojo. que es de color café. El inmaduro, con su pico pardusco y corona y cuello gris obscuro, es diferente a cualesquiera de las especies de cara obscura.

El pico amarillo lo diferencia del adulto del Albatros de cabeza gris y de Buller y la cabeza blanca lo distingue del Albatros de frente blanca.

D. Es común en nuestros mares, cerca de la costa y en alta mar. desde Arica hasta el paso Drake. Anida en islas Diego Ramírez, Noir y Evout.



Albatros errante

Albatros real





Albatros de ceja negra

Albatros de Buller ***Diomedea bulleri*** Rothschild
Buller's Albatross - Buller-A.

L. 85 cm. E. 210 cm. Un albatros con la cabeza gris y la frente blanca. Dorso y parte superior de las alas pardo grisáceo. Es difícil distinguirlo del Albatros de cabeza gris y la característica más segura es el pico, que es negro, con la parte superior de la maxila e inferior de la mandíbula de color amarillo. Tiene una mancha obscura alrededor del ojo. La superficie inferior de las alas es blanca, con márgenes negros, más anchos en el borde de ataque.

Los juveniles tienen la cabeza y el cuello enteramente grises, la superficie alar inferior es igual a la de los adultos y el pico es café negruzco, más obscuro en la punta.

D. Visitante en las costas de Chile, donde ha sido capturado en Iquique, Bahía Salada (Atacama), Valparaíso y Concón.

Albatros de cabeza gris ***Diomedea chrysostoma*** Forster
Gray-headed Albatross - Graukopf-A.

L. 84 cm E. 215 cm. Tiene la cabeza y el cuello gris, con mancha obscura alrededor del ojo, que se destacan del resto del cuerpo que es blanco, lo que, junto a las alas marginadas de negro como en el Albatros de ceja negra, sirve para identificarlo. El pico es como el de la especie precedente, con algo menos de amarillo en la parte inferior y con el culminicornio rosado.

Los juveniles tienen la cabeza y cuello más obscuros que los adultos; debajo de las alas es completamente obscuro, aumentando el blanco con la edad. El pico es negro.

D. Es más común en el extremo sur del país y por la corriente de Humboldt llega hasta el extremo norte. Anida en las islas Diego Ramírez.

Albatros de frente blanca ***Diomedea cauta*** Gould
White-capped Albatross - Weisskappen-A.

L. 95 cm. E. 244 cm. El más grande de los albatros chicos, tiene la parte inferior de las alas blancas con un delgado margen negro. Cabeza y cuello gris perla, excepto la frente y corona blancas, que están separadas del resto de la cabeza por una faja gris obscura que se nota muy bien delante de los ojos. Dorso gris apizarrado, más claro que las alas. Partes inferiores blancas. El pico es gris claro, con el culminicornio y unguicornio superior de color marfil; unguicornio inferior gris obscuro.

D. Anida en Nueva Zelanda. En nuestro país se le encuentra ocasionalmente desde Arica hasta Llanquihue y posiblemente más al sur. (Faltan observaciones).



Albatros de Buller



Albatros de cabeza gris



Albatros de frente blanca

Albatros obscuro ***Phoebetria fusca*** (Hilsenberg)
Sooty Albatross - Dunkel-A.

L. 85 cm. E. 203 cm. Un albatros completamente obscuro, de color café ahumado. Tiene un semicírculo de plumas blancas detrás del ojo; el pico negro, con una raya de color amarillo o anaranjado en la mandíbula. La cola es larga y cuneada. Tiene los ejes de las primarias y de las rectrices blancos, lo que constituye una buena marca de campo.

El juvenil tiene un collar amarillento y la nuca blanquecina y los raquis de las primarias y de las rectrices de color obscuro.

D. Es un visitante accidental. Un registro de ejemplar capturado en aguas del cabo de Hornos.

Albatros obscuro de manto claro ***Phoebetria palpebrata*** (Forster)
Light-mantled Albatross - Russ-A.

L. 85 cm. E. 203 cm. Se diferencia del anterior por tener las partes superiores e inferiores del cuerpo más pálidas, que contrastan con el color más obscuro de la cabeza y alas; la raya de la mandíbula es de color azul o púrpura.

Los juveniles se parecen a los adultos, pero carecen de blanco en los raquis de las primarias.

D. Es común en los mares del extremo austral. Ocasionalmente llega hasta Tarapacá.



Albatros obscuro

Albatros obscuro de manto claro

PETRELES Y FARDELAS — FAMILIA PROCELLARIIDAE

Los miembros de esta Familia forman un grupo de aves cuyo tamaño va desde el de un ganso hasta el de una tórtola. Poseen un tubo único sobre el culmen donde van las aberturas nasales. Son pelágicas y sólo se acercan a tierra para anidar. Ponen un solo huevo de color blanco. Anidan en colonias en lugares aislados, la mayoría en pequeñas cuevas o hendiduras de rocas.

Petrel gigante antártico — ***Macronectes giganteus*** (Gmelin)
Southern Giant Petrel - Riesensturmvogel

L. 88 cm. E. 222 cm. Ave del tamaño aproximado de un Albatros de ceja negra. Coloración general gris cafesosa obscura, con la cabeza y cuello más claros. Pico grande y macizo, de color cuerno verdoso con la punta verdosa en todas las edades. El borde delantero de las alas se aclara con la edad. Presenta dos fases de coloración: la descrita y una blanca, con algunas plumas obscuras esparcidas al azar en el cuerpo y alas.

Esta especie se diferencia de los albatros por tener las alas más anchas y por el tubo nasal sobre el culmen muy visible.

Los juveniles son completamente obscuros.

D. Desde Arica hasta la Antartica. Esta especie o la siguiente casual en isla de Pascua y archipiélago Juan Fernández.

Petrel gigante subantártico — ***Macronectes halli*** Mathews
Northern Giant Petrel - Hall-St.

L. 88 cm. E. 222 cm. Coloración general gris cafesosa obscura; las plumas de la cara, garganta y parte superior del pecho gris más claro, lo que no ocurre con la corona y parte posterior de la cabeza. Pico como en la especie giganteus, pero con la punta rosada o café. Esta se ve obscura desde la distancia. El borde delantero de las alas no se aclara con la edad.

Los juveniles son iguales a los de la especie precedente aunque algo más obscuros; la punta del pico es rosada, único carácter que permite distinguirlos a esta edad.

D. Ocasionalmente en nuestras costas, aunque puede haber sido confundido con giganteus. Distinguir las especies en el mar es difícil.

Petrel plateado — ***Fulmarus glacialoides*** (Smith)
Southern Fulmar - Silber-St.

L. 45cm. E. 120 cm. De coloración gris azulado en las partes superiores y blanco en las inferiores, tiene el aspecto de una gaviota. Parte superior de las alas gris, más obscura en las puntas, excepto triángulo blanco formado por la base de las primarias, que es claramente visible en vuelo. Pico rosado con naricomio azul y punta gris obscura; patas celeste grisáceas.

D. Desde Arica hasta la Antártica, donde anida. También visitante en el archipiélago Juan Fernández e islas San Félix y San Ambrosio.



Fase blanca

Petrel gigante sp.



Petrel plateado

Petrel antártico ***Thalassoica antarctica*** (Gmelin)
Antarctic Petrel - Weissflügel-St.

L. 43 cm. E. 104 cm. Un petrel de color café chocolate y blanco. Partes superiores café con una ancha banda blanca en las alas que se destaca en el vuelo. Partes inferiores casi enteramente blancas, excepto el margen de las alas que es café.

D. En la Antártica y casual en Tierra del Fuego y aguas del cabo de Hornos. Errante más al norte (Valdivia).

Petrel moteado ***Daption capense*** (Linné)
Pintado Petrel - Kap-St.

L. 41 cm. E. 91 cm. De color negro y blanco, inconfundible por su dorso y parte superior de las alas como un tablero de damas. Cabeza y nuca negras; cola blanca con una banda terminal negra. Partes inferiores blancas, como asimismo las alas, que tienen un delgado margen negro. Pico y patas negros.

D. Desde Arica hasta la Antártica, donde anida. Casual en isla de Pascua.

Petrel de las nieves ***Pagodroma nivea*** (Forster)
Snow Petrel - Schnee-St.

L. 34 cm. E. 79 cm. Es enteramente blanco. El pico es negro y las patas gris azuladas. La cola es cuadrada cuando está cerrada y en forma de abanico cuando está abierta.

D. Circumpolar. Rara vez se aleja del hielo a la deriva. Anida y vive en la Antartica chilena.



Petrel antartico

Petrel moteado





Petrel de las nieves

Fardela blanca de Juan Fernández ***Pterodroma externa*** (Salvin)
Juan Fernández Petrel - Salvin-St.

L. 43 cm. E. 96 cm. Una fardela grande con partes superiores grises cafesosas e inferiores blancas; cola larga. Las alas son grises en la parte superior y tienen una marca en forma de M abierta, que va de punta a punta de las alas. La corona, nuca, manto y espalda son grises; cola negra. Frente y cara blancas. Partes inferiores blancas, con el borde posterior del ala gris; corta faja diagonal negra en el doblez del ala. Pico negro. Patas color carne con la mayor parte de los dedos y membranas de color negro.

D. En aguas del archipiélago Juan Fernández, donde nidifica.

Fardela de Más Afuera ***Pterodroma longirostris*** (Stejneger)
Stejneger's Petrel - Stejneger-St.

L. 31 cm. E. 53 cm. Una fardela pequeña con las partes superiores grises, la frente blanca y la corona obscura. Frente, bridas y parte delantera de la corona blancas; el resto de la corona, nuca y cola negro cafesosas. Parte superior de las alas negro cafesosas con una marca en forma de M abierta, de color negro, que va de punta a punta de las alas. Partes inferiores blancas; las alas con un borde negro poco notorio en el margen anterior; corta faja diagonal negra en el doblez del ala. Pico negro y patas azul lila con membranas café.

Se diferencia de la anterior por su tamaño y el color de la patas.

D. En aguas del archipiélago Juan Fernández, donde nidifica.

Fardela blanca de Más a Tierra ***Pterodroma cooki*** (Gray)
Cook's Petrel - Cook-St.

L. 28 cm. E. 66 cm. Una fardela pequeña con la parte superior del cuerpo gris pálido, parte superior de las alas obscuras y partes inferiores blancas. Frente y bridas blancas moteadas de gris; mancha negra debajo y adelante de los ojos. Alas gris cafesosas obscuras con marca en forma de M abierta. Partes inferiores blancas, con negro en los bordes de las alas, especialmente en el posterior. Pico negro. Patas azul pálido.

D. En Chile hay dos subespecies: Fardela blanca de Más a Tierra, *P. c. defilippiana* (Giglioli y Salvadori), que se distingue de la subespecie siguiente por tener el pico mucho más robusto, más ancho y más alto y por la cola más larga. Se la encuentra en aguas de las islas de Juan Fernández. San Félix y San Ambrosio, y en alta mar llega por el norte hasta Arica. La Fardela de Cook, *P. c. orientalis* Murphy, se encuentra en alta mar. desde Arica hasta los 34° de latitud sur.



Fardela blanca de Juan Fernández

Fardela de Más Afuera





Fardela blanca de Más a Tierra

Fardela negra de Juan Fernández ***Pterodroma neglecta*** (Schlegel)
Kermadec Petrel - Kermadec-St.

L. 38 cm. E. 91 cm. Una fardela grande que tiene fases de coloración clara, obscura e intermedias; todas tienen manchas blancas debajo de las alas.

En la fase clara la cabeza es gris y el resto de las partes superiores café ahumado. Parte de abajo del cuerpo blanca, con excepción de las coberteras subcaudales que son obscuras. Parte inferior de las alas café obscuro con un parche blanco subterminal formado por la base de las primarias.

En la fase obscura es café obscura uniforme, excepto por las manchas blancas debajo de las alas. En la fase intermedia hay una combinación de los plumajes descritos, con variaciones del blanco y del café, especialmente en la parte inferior del cuerpo. Así. por ejemplo, pueden tener la cabeza obscura y una ancha banda del mismo tono en el pecho, con la garganta y el vientre blancos; cabeza y garganta obscuras con el resto de las partes inferiores café grisáceo pálido o completamente obscura, con algunas manchas blancas en el pecho y vientre.

En todas las fases de plumaje el pico corto es de color negro; las patas son de color carne y la mayor parte de las membranas son negras.

Las aves de la fase clara son generalmente fáciles de identificar, aunque pueden ser confundidas con la fase clara de la Fardela heráldica. La fase obscura también puede ser confundida con la fase obscura de la misma fardela. Los de la fase intermedia pueden ser diferenciados de la Fardela de Fénix por las manchas blancas cerca de la punta de la superficie inferior de las alas. Son difíciles de distinguir de los de la misma fase de la Fardela heráldica.

D. En Chile, en aguas de las islas de Pascua, San Félix y San Ambrosio y archipiélago Juan Fernández.

Fardela heráldica ***Pterodroma arminjoniana*** Lönnberg
Herald Petrel - Südtrinidad-St.

L. 36 cm. E. 90 cm. Una fardela con fases de color obscuro, claro e intermedio, muy similar a la especie anterior, de la que se diferencia porque las manchas blancas de la cara inferior de las alas se extiende para llegar hasta el cuerpo, formando una línea irregular. A corta distancia se nota que los cálamos de las primarias de esta fardela son negros y no blancos como en la especie anterior. Además, en la fase clara hay un esbozo de collar en la parte alta del pecho. Pico negro y patas color carne, con dedos y membranas obscuras.

D. En Chile se encuentra la subespecie *P. a. heraldica* Lönnberg en aguas de la isla de Pascua.

Fardela de Fénix ***Pterodroma alba*** (Gmelin)
Phoenix Petrel - Phoenix-St.

L. 33 cm. E. 83 cm. Es de tamaño mediano, con las partes superiores de color café ahumado y las inferiores blancas, excepto un collar obscuro en la parte alta del pecho. La parte inferior de las alas es obscura, del mismo color del dorso. Pico negro y patas color carne, con la parte terminal de color negro.

D. En aguas de la isla de Pascua.



Fardela negra de Juan Fernández



Fardela heráldica



Fardela de Fénix

Fardela de frente blanca ***Pterodroma lessoni*** (Garnot)
White-headed Petrel - Weisskopf-St.

L. 43 cm. E. 99 cm. Es grande, con el cuerpo y la cabeza blancos, con una mancha negra alrededor del ojo. Manto, lomo y cola gris pálido. En la parte superior de las alas hay una marca en forma de M abierta más obscura que el resto del ala, las que por debajo son completamente obscuras. Pico corto y macizo de color negro; patas rosado carne con la parte distal obscura.

D. Ha sido observada en el paso Drake y en la entrada occidental del estrecho de Magallanes. Posiblemente hasta la latitud de Valdivia.

Fardela moteada ***Pterodroma inexpectata*** (Forster)
Mottled Petrel - Regen-St.

L. 33 cm. E. 74 cm. De tamaño mediano, con las partes de encima de color gris con una marca más obscura en forma de M abierta en las alas y espalda. La corona y el área alrededor del ojo es gris obscura contrastando con la frente moteada de gris y la cara blanca. Partes inferiores es blanco, con excepción de la parte baja del pecho y vientre que son grises obscuros. La cara inferior de las alas es blanca, marginada de gris en el borde posterior, con una barra negra en forma de M abierta, más o menos completa.

D. En nuestros mares ha sido observada en el extremo sur, en el paso Drake.

Fardela de alas grandes ***Pterodroma macroptera*** (Smith)
Great-winged Petrel - Langflügel-St.

L. 41 cm. E. 102 cm. Plumaje completamente café negruzco, con gris pálido en la frente, cara y garganta. La cola es larga y ligeramente cuneada. El pico de color negro es grueso y ganchudo; las patas son negras.

Se diferencia de la Fardela de patas pálidas, por su tamaño un poco más pequeño y el pico negro; de la Fardela negra y de la Fardela negra de Juan Fernández, por tener la parte inferior de las alas completamente obscura.

D. Ha sido observada en el canal Cockburn, región de Magallanes. Posiblemente se encuentra en toda la costa austral del país. (Faltan observaciones).



Fardela de frente blanca



Fardela moteada



Fardela de alas grandes

Fardela de Kerguelen ***Pterodroma brevirostris*** (Lesson)
Kerguelen Petrel - Kerguelen-St.

L. 35 cm. E. 82 cm. De tamaño mediano, de color café obscuro, con alas largas y puntiagudas, cuerpo corto y la cabeza grande y redondeada. Cola corta. Pico y patas negros.

Se diferencia de la Fardela de alas grandes por su tamaño menor y por tener la cabeza completamente obscura.

D. En el paso Drake y en Mehuín. cerca de Valdivia. Debe encontrarse en toda la zona intermedia entre estas dos localidades.

Petrel azulado ***Halobaena caerulea*** (Gmelin)
Blue Petrel - Blau-St.

L. 30 cm. E. 58 cm. Es un petrel pequeño, con la corona obscura. De coloración general gris azulada, blanca abajo y con la cola terminada en una angosta banda blanca. La frente es blanca moteada de gris y la corona, nuca y lados del cuello gris obscuros. Tienen un collar incompleto en la parte alta del pecho, formado por el plumaje obscuro del cuello. El resto de las partes superiores es gris, notándose una M abierta que va de punta a punta de las alas. La cola es cuadrada. Las partes inferiores son enteramente blancas. El pico es negro y las patas son azul pálidas con membranas gris claras.

Se diferencia de los petreles-paloma del género Pachyptila por tener el pico negro, la frente blanca y la cola terminada en una angosta banda blanca.

D. Circumpolar en los mares australes. Anida en islas Diego Ramírez. En aguas chilenas desde el paso Drake hasta la latitud de Valparaíso.

Petreles-paloma ***Pachyptila*** sp.

L. 25-31 cm. E. 56-59 cm. Los petreles-paloma son todos muy similares, lo que hace su identificación en el terreno a nivel de especie casi imposible. Todos tienen las partes superiores gris azuladas, con una banda del mismo color debajo del ojo y una banda blanca, a manera de cejas. Tienen una marca en forma de M a través de las alas, que va de punta a punta de ellas. La cola es cuneada y termina en una banda obscura. Las partes inferiores son blancas; las patas azules con membranas más claras; el pico es azul y los ojos café.

Las especies se diferencian por la forma del pico y las proporciones del cuerpo.

En Chile se encuentran las siguientes especies, casi indistinguibles en el mar:

Fardela de Kerguelen





Petrel azulado

Petreles - palomas



Petrel-paloma antártico ***Pachyptila desolata*** (Gmelin)
Antarctic Prion - Tauben-St.

L. 28 cm. E. 57 cm. La diferencia específica está en la forma del pico que es moderadamente ancho, siendo éste aproximadamente la mitad del largo y visto desde arriba los bordes son casi rectos, sin convexidad. Las laminillas son pequeñas y no son visibles con el pico cerrado.

D. Especie pelágica de aguas antarticas y subantárticas. En Chile se han capturado ejemplares en la costa de Concepción (Lota y Penco), en Antofagasta (Paposo), Mehuín (Valdivia) y en alta mar en Lat. 33°20'S y Long. 75°40'W.

Petrel-paloma de pico ancho ***P. salvini*** (Mathews)
Salvin's Prion - Kleiner Enten-St.

L. 29 cm. E. 57 cm. De tamaño y plumaje similar a la especie anterior, pero con el pico más ancho y visto desde arriba los bordes son convexos. Las laminillas son visibles con el pico cerrado.

D. Es una especie pelágica en la zona subantártica, más abundante en el océano Indico. En Chile ha sido encontrada en La Rinconada (Antofagasta) y cabo de Hornos.

Petrel-paloma de pico delgado ***P. belcheri*** **(Mathews)**
Narrow-billed Prion - Belcher-St.

L. 26 cm. E. 56 cm. Imposible de distinguir en el mar de las especies precedentes. Su pico muy angosto la diferencia de ellas.

D. Pelágico en las zonas antarticas y subantárticas. En Chile desde el paso Drake hasta Antofagasta y posiblemente más al norte.

Petrel - paloma antartico



Petrel - paloma de pico ancho

Petrel - paloma de pico delgado

Petrel-paloma chico ***P. turtur*** (Kuhl)
Fairy Prion - Feen-St.

L. 23 cm. E. 56 cm. Esta especie es parecida a las otras, pero más pequeña. Además, la banda negra de la cola es más ancha. El pico es más corto.

D. Es subantártico. En nuestro país fue capturado una sola vez en Arica y hay un registro en isla de Pascua.

Fardela negra grande ***Procellaria aequinoctialis*** Linné
White-chinned Petrel - Weisskinn-St.

L. 56 cm. E. 136 cm. Una fardela grande de color enteramente café negruzco con un pico llamativo de color amarillo pálido. Una mancha blanca en el mentón, de tamaño variable y a veces ausente. Patas negras.

Se diferencia de los petreles gigantes juveniles por su tamaño menor y por la forma del pico.

D. Desde Anca hasta la Antártica.

Fardela gris ***Procellaria cinerea*** Gmelin
Brown Petrel - Grau-St.

L. 51 cm. E. 117 cm. Las partes superiores son de coloración general gris cenicienta, más obscura en la corona, cola y alas. Las partes inferiores son blancas, con excepción de las coberteras inferiores de la cola y de los flancos que son grises.

El pico es verde pálido o color cuerno; las patas son gris rosado.

Difiere de la Fardela de frente blanca por su tamaño mayor, partes superiores más obscuras, la cola gris obscura y el pico claro.

D. Circumpolar en aguas subantárticas. En nuestro país desde Arica hasta el paso Drake. en las vecindades del cabo de Hornos.



Petrel - paloma chico



Fardela negra grande



Fardela gris

Fardela de Nueva Zelanda ***Procellaria westlandica*** Falla
Westland Petrel - Westland-St.

L. 51 cm. E. 136 cm. Es completamente negra. El pico es de color marfil con la punta negra. Se diferencia de la Fardela negra grande por el pico con punta negra y el mentón negro.

D. Restringida a aguas del sur de Nueva Zelanda y costas del este de Australia. Un solo registro en Chile, en la península de Tumbes (región del Biobío).

Fardela blanca ***Puffinus creatopus*** Coues
Pink-footed Shearwater - Blassfuss-St.

L. 48 cm. E. 99 cm. Esta fardela es de tamaño intermedio entre la Fardela negra, *P. griseus*, y la Fardela negra grande. *Procellaria aequinoctialis*. Todas las partes superiores son gris cafesoso obscuro, las inferiores en su mayor parte blancas, y el pico y las patas de color claro. Los lados de la garganta, parte inferior del vientre y flancos tienen barras obscuras, por lo que la demarcación entre las partes superiores obscuras y las inferiores blancas no está bien delimitadas. Las coberteras subcaudales son obscuras. La parte inferior de las alas es blanca, con márgenes irregulares grises. Hay aves con las partes inferiores con barras o completamente grises. El pico es amarillo claro con la punta obscura y las patas color carne.

Se diferencia de la Fardela de dorso gris. *P. bulleri*, por no tener su patrón de coloración de las parles superiores y las partes inferiores son completamente blancas y por tener el pico y patas claras. Difiere de la Fardela capirotada. *P. gravis*, por no tener una banda blanca en la nuca y en la base de la cola y por tener el vientre blanco.

D. Desde las vecindades de la isla de Chiloé hasta Arica. Anida en la isla Mocha y en el archipiélago Juan Fernández.

Fardela capirotada ***Puffinus gravis*** (O'Reilly)
Greater Shearwater - Kappen-St.

L. 48 cm. E. 101 cm. Es una fardela grande, de coloración general café y blanca con capuchón café obscuro, separado del resto del dorso por una banda blanca. Tiene una banda blanca en la base de la cola. Las partes inferiores son en general blancas, con una mancha café de extensión variable en el vientre. Superficie inferior de las alas blancas, con excepción de los márgenes, que son obscuros, al igual que una barra en la base de las primarias que a veces llega hasta las axilares. Pico largo negro; patas color carne con bordes obscuros.

D. Ave pelágica que ha sido observada en contadas ocasiones en el estrecho de Magallanes.

Fardela de Nueva Zelanda

Fardela blanca





Fardela capirotada

Fardela de dorso gris ***Puffinus bullen*** Salvin
New Zealand Shearwater - Graunacken-St.

L. 46 cm. E. 97 cm. Es grande, con alas anchas y cola cuneada larga. Partes superiores grises con un capuchón café obscuro en la cabeza, una marca obscura en forma de M abierta sobre las alas y cola café obscura. Las partes inferiores son enteramente blancas. Pico largo y delgado, de color gris pizarra; patas rosado carne con dedos externos negros.

Se diferencia de la Fardela blanca, P. creatopus, por tener el capuchón obscuro, la marca en forma de M sobre las alas y las partes inferiores completamente blancas. De la Fardela capirotada, *P. gravis*, por no tener las bandas blancas en la nuca y la cola y por sus partes inferiores completamente blancas.

D. Es una especie pelágica que anida en Nueva Zelanda y que ha sido capturada en Concón y Valparaíso.

Fardela negra ***Puffinus griseus*** (Gmelin)
Sooty Shearwater - Dunkel-St.

L. 45 cm. E. 102 cm. De tamaño mediano y de coloración completamente obscura, con excepción de un área clara bajo las alas, que al contrastar con la coloración obscura del resto del cuerpo, la hace aparecer blanca. Pico largo y delgado de color gris obscuro. Patas del mismo color.

Se diferencia de la Fardela de patas pálidas. *P. carneipes*, por las zonas claras bajo las alas y pico y patas obscuras.

D. Desde el extremo sur de nuestro país hasta Arica, en aguas pelágicas y costeras. Anida en isla Hornos y posiblemente en otras del litoral austral expuesto.

Fardela chica ***Puffinus assimilis*** Gould
Little Shearwater - Kleiner-St.

L. 28 cm. E. 53 cm. Una fardela pequeña de coloración general negra y blanca. Partes superiores negras o gris obscuras. La separación entre el negro y el blanco en la cara pasa por encima del ojo. Partes inferiores completamente blancas. Pico corto y delgado, de color plomo. Patas azules con membranas de color carne.

D. En aguas chilenas sólo ha sido encontrada a 2 millas al W de la isla de Chiloé.



Fardela de dorso gris



Fardela negra



Fardela chica

Fardela atlántica ***Puffinus puffinus*** (Brünnich)
Manx Shearwater - Schwarzschnabel-St.

L. 35 cm. E. 84 cm. Partes superiores negro ahumadas e inferiores blancas. El negro de la cabeza se extiende hasta debajo del ojo. Un triángulo blanco se aprecia en la región auricular. El pico negro es largo y delgado. Las patas son de color carne con los márgenes obscuros.

Se diferencia de la Fardela chica por su mayor tamaño y porque en aquélla la separación del negro y blanco de la cabeza ocurre encima del ojo.

D. Sólo dos registros en Chile: uno cerca de la boca oriental del estrecho de Magallanes y el otro en las inmediaciones del Falso cabo de Hornos.

Fardela negra de patas pálidas ***Puffinus carneipes*** Gould
Flesh-footed Shearwater - Blassfuss-St.

L. 48 cm. E. 109 cm. Una fardela grande de color café obscuro uniforme, con el pico y las patas pálidas y la cola redondeada. El pico es rosado pálido con punta obscura sólo visible de cerca; patas de color carne pálido.

Se diferencia de la Fardela de alas grandes, *Pterodroma macroptera*. por el color de pico y patas y por la forma del pico, que en macroptera es grueso y ganchudo; de la Fardela negra. *P. griseus*, por tener las partes inferiores de las alas obscuras y por el color del pico y patas, y de la Fardela negra grande. *Procellaria aequinoctialis*, por ser más pequeña, más café y por el pico que es rosado y no amarillo pálido.

D. En aguas del archipiélago Juan Fernández.

Fardela de Pascua ***Puffinus nativitatis*** Streets
Christmas Shearwater - Weihnachts-St.

L. 38 cm. E. 72 cm. De tamaño mediano y de coloración enteramente café negruzca, con pico y patas obscuros y cola corta y redondeada.

Difiere de la Fardela negra, *P. griseus*, por su tamaño menor y partes inferiores de las alas completamente obscuras, y de la Fardela de patas pálidas, *P. carneipes*, por su tamaño más pequeño y pico y patas obscuros.

D. En aguas de las islas de Pascua y Sala y Gómez, donde anida.

Pingüino rey

Pingüino papúa

Ave del trópico de pico rojo

Garza grande



Fardela atlántica



Fardela negra de patas pálidas



Fardela de Pascua

GOLONDRINAS DE MAR — FAMILIA OCEANITIDAE

Son aves pelágicas, cuya longitud varia entre los 16 y los 25 cm. Vuelan rápida y erráticamente a poca distancia del agua. Se alimentan de pequeños organismos planctónicos que capturan de una manera característica, poniendo las patas en contacto con el agua, dando la impresión de caminar sobre ella. Ponen un solo huevo blanco, relativamente grande para el tamaño del ave.

Golondrina de mar — ***Oceanites oceanicus*** (Kuhl)
Wilson's Storm-Petrel - Buntfuss-Sturmschwalbe

L. 18 cm. E. 41 cm. Partes superiores café negruzcas, con excepción del lomo que es blanco, color que se continúa por los flancos; parte superior de las alas más obscura con banda cafesosa poco conspicua. Partes inferiores café negruzcas, excepto las coberteras subcaudales más externas que son blancas. Cola cuadrada. Pico negro; patas con membranas amarillas que en vuelo sobresalen de la cola.

En Chile se encuentran dos subespecies: Golondrina de mar antartica, *O. o. exasperatus* Mathews, en la Antartica chilena, y Golondrina de mar chilena, *O. o. chilensis* Murphy, desde el cabo de Hornos a Arica.

Golondrina de mar chica — ***Oceanites gracilis*** (Elliot)
Elliot's Storm-Petrel - Elliot-Sturmschwalbe

L. 14 cm. Coloración general negra con lomo y centro del abdomen blancos; resto de las partes inferiores negras. Cola cuadrada. Pico negro; patas largas con membranas amarillas bordeadas de negro.

Se diferencia de la Golondrina de mar, *O. oceanicus*, por tener el vientre blanco; de la Golondrina de mar de vientre blanco. *Fregetta grallaria*, por tener menos blanco en el vientre y partes inferiores de las alas y coberteras subcaudales obscuras.

D. En aguas de la corriente de Humboldt desde Valparaíso hasta Arica.

Golondrina de mar subantártica — ***Garrodia nereis*** (Gould)
Gray-backed Storm-Petrel - Graurücken-St.

L. 18 cm. E. 39 cm. Partes superiores obscuras, vientre blanco y lomo gris. Las partes superiores son gris ceniza, apreciándose negras en el mar; la parte baja de la espalda y lomo son más pálidos; parte superior de las alas gris obscura, con banda gris poco notoria. Parte inferior de las alas blancas, con márgenes negros. Cola cuadrada, con banda terminal más obscura. Pico y patas negros.

Se diferencia de la Golondrina de mar de vientre blanco, *F. grallaria*, y de la Golondrina de mar de vientre negro. *F. tropica*, por no tener el lomo blanco y por el tamaño más pequeño, y de la Golondrina de mar chica, *O. gracilis*, por no tener el lomo blanco y por la cara inferior de las alas que es blanca en su mayor parte.

D. En los mares del cabo de Hornos e islas Diego Ramírez, alcanzando hasta el golfo de Ancud por el norte.



Golondrina de mar

Golondrina de mar chica

Golondrina de mar subantártica

Golondrina de mar de vientre blanco ***Fregetta grallaria*** (Vieillot)
White-bellied Storm-Petrel - Weissbauch-Meerlaüfer

L. 18 cm. E. 44 cm. Color negro con parte inferior del pecho, vientre y lomo blancos. Las partes superiores son de color negro, con excepción del lomo; garganta, parte superior del pecho y coberteras subcaudales negros. Cara inferior de las alas blancas con anchos márgenes negros. Cola cuadrada. Pico y patas negros.

Se diferencia de la Golondrina de mar subantártica, *G. riereis*, por su lomo blanco; de la Golondrina de mar de vientre negro. *F. tropica*, por la parte inferior del pecho y vientre blancos, y de la Golondrina de mar chica. *O. gracilis*, por el blanco de las partes inferiores de las alas y por tener más blanco en la parte inferior del cuerpo.

D. Anida en el archipiélago Juan Fernández y en San Félix y San Ambrosio. Se la encuentra en los mares de esas islas.

Golondrina de mar de vientre negro ***Fregetta tropica*** (Gould)
Black-bellied Storm-Petrel - Schwarzbauch-M.

L. 20 cm. E. 45 cm. Partes superiores café obscuras, que se ven negras en el mar. y con lomo blanco. Parte superior de las alas café obscuro. Las partes inferiores como en la especie precedente, pero con una banda longitudinal negra que se extiende desde la parte superior del pecho hasta las coberteras subcaudales que son negras. Cara inferior de las alas blancas con anchos márgenes negros. Cola cuadrada.

Difiere de la especie precedente por su tamaño mayor, partes superiores uniformemente obscuras y por la banda longitudinal negra en el vientre, y de la Golondrina de mar subantártica, *G riereis*, por su tamaño mayor, lomo blanco y banda ventral.

D. En aguas del cabo de Hornos y en la Antartica chilena.

Golondrina de mar de garganta blanca ***Nesofregetta albigularis*** (Finsch)
White-throated Storm-Petrel - Weisskehl-M.

L. 25,5 cm. E. 51 cm. Partes superiores negras con lomo blanco. Partes inferiores variables. Las aves de fase clara tienen la garganta y el vientre blancos, con una banda pectoral obscura. Las de fase obscura son completamente obscuras. Se han observado todas las gradaciones entre los dos extremos. Patas largas y cola algo ahorquillada.

Difiere de todas las otras golondrinas de mar por su mayor tamaño.

D. En mares circunvecinos de isla Sala y Gómez, donde anida.



Golondrina de mar de vientre blanco



Golondrina de mar de vientre negro

Golondrina de mar de garganta blanca

Golondrina de mar peruana ***Oceanodroma tethys*** (Bonaparte)
Peruvian Storm-Petrel - Galapagos-Wellenlaüfer.

L. 17 cm. Cuerpo completamente negro, excepto el lomo y lados del vientre, que son blancos. Las cubiertas alares son más pálidas. Cola negra apenas ahorquillada. Pico y patas negros.

Se diferencia de la Golondrina de mar chilena, *O. o. chilensis*, por la cola ahorquillada y la membrana de las patas obscuras y de todas las otras que se encuentran en aguas chilenas por sus partes inferiores obscuras.

D. Desde el límite norte hasta Antofagasta.

Golondrina de mar negra ***Oceanodroma markhami*** (Salvin)
Markham's Storm-Petrel - Russ-W.

L. 24 cm. Color enteramente negro y cola ahorquillada, lo que la diferencia del resto de las golondrinas de mar.

D. Desde el extremo norte del país hasta la altura de Valparaíso.

Golondrina de mar de collar ***Oceanodroma hornbyi*** (Gray)
Hornby's Storm-Petrel - Anden-W.

L. 21 cm. Partes superiores grises e inferiores blancas. Cabeza con un capuchón gris, frente blanca. Collar pectoral gris. Cola gris muy ahorquillada. Pico y patas negros.

No se puede confundir con alguna otra golondrina de mar.

D. Desde el extremo norte del país hasta los 32° S.

Golondrina de mar peruana

Golondrina de mar negra





Golondrina de mar de collar

PETRELES ZAMBULLIDORES FAMILIA PELECANOIDIDAE

Son aves muy especializadas de plumaje negro por encima y blanco por debajo. Tienen el pico corto y robusto, terminado en gancho. Las narinas, colocadas en un tubo corto, se abren hacia arriba. El cuello, las alas y la cola son cortos. Vuelan con aleteos muy rápidos y se sumerjen cayendo al agua como una piedra. Nadan bajo el agua impulsándose con las alas y emergen de ella volando. Son coloniales y anidan en pequeñas cuevas o hendiduras de rocas. Ponen un solo huevo blanco.

Yunco ***Pelecanoides garnotii*** (Lesson)
Peruvian Diving-Petrel - Garnot-Sturmvogel.

L. 25 cm. E. 48 cm. Partes superiores negras e inferiores blancas. Alas cortas y redondeadas; cola corta. Pico pequeño de color negro; patas azules con membranas gris obscuras.

D. Desde Arica hasta Corral.

Yunco de Magallanes ***Pelecanoides magellani*** (Mathews)
Magellan Diving-Petrel - Magellan-St.

L. 21,5 cm. Coloración general semejante a la especie anterior, pero de tamaño menor. Un parche blanco falciforme a los lados del cuello.

D. Desde el canal de Chacao hasta el cabo de Hornos.

Yunco de los canales ***Pelecanoides urinatrix*** (Gmelin)
Subantarctic Diving-Petrel - Lummen-St.

L. 18 cm. Muy parecido a la especie anterior, pero sin la mancha blanca a los lados del cuello. Tiene una banda grisácea en la parte superior del pecho.
En el mar muy difícil de distinguir de la especie precedente.

D. Desde el canal de Chacao hasta las islas Diego Ramírez, donde anida.



Yunco



Yunco de Magallanes



Yunco de los canales

PINGÜINOS — FAMILIA SPHENISCIDAE

Los pingüinos son aves marinas no voladoras que viven en el hemisferio sur. Son las mejor adaptadas al medio marino de todas las aves. Su cuerpo está enteramente cubierto de pequeñas plumas y sus alas están reducidas a aletas planas, aptas para la natación, y que no se pliegan: están recubiertas de diminutas plumas semejantes a escamas. Las patas, colocadas muy atrás en el cuerpo, son cortas; los dedos están unidos por una membrana. La cola es corta y está formada por plumas angostas y tiesas. Anidan formando grandes colonias. Ponen 1 ó 2 huevos blancos.

Pingüino rey — *Aptenodytes patagonica* Miller
King Penguin - Königs-Pinguin

L. 100 cm. Partes superiores azul grisáceas; inferiores blancas. Cabeza negra con manchas anaranjadas brillantes a los lados, conectadas por bandas amarillas a manchas anaranjadas de la parte superior del pecho. Pico largo y delgado de color negro, con mancha roja o anaranjada en la base de la mandíbula. Patas negras con tarsos sin plumas. Sexos iguales, aunque el macho en promedio es más grande.

En los juveniles los parches de la cabeza son de color amarillo limón en vez de anaranjado; las plumas de la parte alta de la cabeza tienen las puntas grises; la garganta es blanquecina, y la base de la mandíbula es negra con rayas rosadas.

El pollo sale del huevo casi desnudo, pero a los 10 días está cubierto de un plumón gris claro o cafesoso. con la cara y la garganta gris claras.

D. Circumpolar. Ha sido observado y capturado ocasionalmente en Magallanes. Posiblemente fue exterminado en las Shetland del Sur. Se dice que anidaba en la zona del cabo de Hornos, pero no ha sido comprobado.

Pingüino emperador — *Aptenodytes forsteri* Gray
Emperor Penguin - Kaiser-P.

L. 115 cm. Es el más grande de los pingüinos. Partes superiores de color azul grisáceo claro; inferiores blancas. Mejillas, mentón y garganta negros. Mancha semicircular amarilla a cada lado de la parte alta del cuello, que pasa a blanco en la parte anterior. Pico relativamente largo, pero no tanto como el del Pingüino rey, encorvado hacia abajo en la punta, de color negro azulado, con mancha angosta de color anaranjado, rosado coral, púrpura o lila en la base de la mandíbula. Patas negras con plumas en la parte externa de los tarsos.

El juvenil tiene las manchas de la cabeza y el cuello de color blanco grisáceo y la corona gris azulada. Pico negro.

El pollo está cubierto de un plumón blanquecino en las partes superiores y gris plateado en las inferiores, que a los pocos días se pone gris obscuro. Cara blanca rodeada de plumón negruzco.

D. Circumpolar. En la Antartica chilena anida en el islote Dion (67° 52' S) en bahía Margarita. Ha sido capturado en Base Prat, en isla Greenwich, en las Shetland del Sur en 1956 y en Base O'Higgins, en cabo Legoupil, península Antartica, en 1962.



Pingüino rey

Pingüino emperador



Pingüino papúa ***Pygoscelis papua*** (Forster)
Gentoo Penguin - Esels-Pinguin

L. 76 cm. Se distingue inmediatamente por una mancha blanca en la corona, angosta en el medio y más ancha sobre los ojos. Partes superiores gris pizarra, cafesosa en plumaje gastado; partes inferiores blancas. Pico rojo anaranjado con culminicornio negro. Patas amarillo anaranjadas.

El juvenil tiene la mancha blanca de la cabeza menos definida y la garganta moteada de blanco. El pico es más obscuro.

El pollo recién salido del huevo está cubierto de un plumón gris plateado en el dorso; corona, cara y mejillas gris pizarra; partes inferiores blanco grisáceas a casi café. El segundo plumón es gris encima y blanco debajo.

D. Anida y vive en el sector antartico chileno.

Pingüino de Adelia ***Pygoscelis adeliae*** (Hombron y Jacquinot)
Adélie Penguin - Adelie-P.

L. 71 cm. Cabeza, cuello y partes superiores de color negro; partes inferiores blancas. Pico color ladrillo obscuro y patas blancas con tinte rosado. Anillo periocular blanco.

El juvenil tiene pico y anillo periocular negro, y las mejillas y el cuello gris o blanco.

El pollo recién salido del cascarón está cubierto de un plumón gris plateado con la cabeza gris obscura. El segundo plumón es café grisáceo y es más largo.

D. Es una especie circumpolar y anida en la Antartica chilena.

Pingüino antártico ***Pygoscelis antarctica*** (Forster)
Chinstrap Penguin - Kehlstreif-P.

L. 76 cm. Cabeza negruzca; garganta, lados de la cabeza y cuello blancos. Una línea delgada negra atraviesa la garganta de oído a oído. Partes superiores negras e inferiores blancas. Pico negro y patas de color carne.

El juvenil es similar al adulto pero es más pequeño y tiene algunas manchas obscuras en el mentón y mejillas.

El pollo está cubierto de un plumón blanco plateado. El segundo plumón es gris, ligeramente más claro en la cabeza y mejillas y más obscuro en el mentón y garganta. Las partes inferiores son de color blanco puro a gris pálido.

D. Vive y anida en la Antartica chilena y en las islas del cabo de Hornos.

Pingüino papúa



Pingüino de Adelia



Pingüino antártico

Pingüino de penacho amarillo ***Eudyptes crestatus*** (Miller)
Rockhopper Penguin - Felsen-Pinguin

L. 61 cm. Partes superiores y cuello de color azul pizarra obscuro: partes inferiores blancas. Plumas de la corona algo alargadas y a cada lado una línea de plumas eréctiles de color amarillo pálido, que nace cerca del pico y no se junta sobre la frente. El límite negro de la garganta es casi recto y no en forma de V como en el Pingüino macaroni. Pico corto y grueso de color naranja, rojo o rosado. Patas color carne. Se desplaza en tierra saltando con las patas juntas.

El juvenil se diferencia del adulto por no tener las plumas amarillas de la cabeza, las que están apenas esbozadas como dos líneas de color crema sobre los ojos y por tener la garganta y el mentón moteados de blanco.

El plumón de los pollos es café negruzco en la cabeza, cuello y partes superiores y blanco en las inferiores. El margen inferior de la obscura garganta es casi recto.

D. Circumpolar en aguas subantárticas En nuestro país en costas y canales de la zona austral, desde el grupo Notables (48º 54'S) hasta islas Diego Ramírez.

Pingüino macaroni ***Eudyptes chrysolophus*** (Brandt)
Macaroni Penguin - Goldschopf-P.

L. 70 cm. Similar al Pingüino de penacho amarillo, pero de mayor tamaño y con penachos de color amarillo anaranjado, que tienen su origen en un parche colocado sobre la frente. El margen inferior de la garganta tiene forma de V. no es recto como en la especie precedente. Base de la cola con mancha blanca, que no está presente en *E. crestatus*. Pico café rojizo, con comisuras rosadas notorias. Patas rosadas.

En los juveniles las plumas amarillo anaranjadas de la cabeza están reducidas a unas pocas plumas cortas amarillas detrás de los ojos y la frente, que no forman una línea definida como en la especie precedente. La garganta es gris obscura y el parche blanco de la base de la cola está ausente.

El pollo es similar al del Pingüino de penacho amarillo, pero el borde de la garganta termina en V.

D. En la Antártica chilena anida y vive en la península Antartica e islas Shetland del Sur; en Chile sudamericano en cabo Pilar, isla Desolación (52° 44'S: 74° 41'W), islas Diego Ramírez y probablemente en islas Noir y Deceit.

Pingüino de Humboldt ***Spheniscus humboldti*** Meyen
Humboldt Penguin - Humboldt-P.

L. 70 cm. Partes dorsales gris pizarra o gris pardusco; cabeza negra con banda blanca que nace de la base de la maxila y se curva hacia abajo y se une con banda blanca más ancha de la parte interior del cuello. Parte ventral blanca cruzada en la parte superior del pecho por una banda obscura en forma de herradura que baja a ambos lados del cuerpo hasta las patas y separada del dorso por una banda blanca angosta. Pico grueso, gris negruzco; patas negras cafesosas con manchas blancas en las membranas.

El juvenil tiene los lados de la cara de color gris, sin la banda blanca; tampoco está presente la banda oscura del pecho.

Los pollos están cubiertos de un plumón gris cafesoso obscuro.

D. Endémico de la corriente de Humboldt. En Chile desde Arica hasta Chiloé (isla Puñihuil. 41º 55'S: 74º 02' W aprox.).



Pingüino de penacho amarillo

Pingüino macaroni



Pingüino de Humboldt

Pingüino de Magallanes ***Spheniscus magellanicus*** (Forster)
Magellanic Penguin - Magellan-Pinguin

L. 70 cm. Parecido al Pingüino de Humboldt, pero de color negro por encima y con otra banda adicional negra en la parte anterior del cuello, entre el negro de la garganta y la herradura negra del pecho. Pico más corto que el de *S. humboldti* y de color negruzco.

Los juveniles y pollos son indistinguibles de los de la especie precedente.

D. Desde islas Diego Ramírez y Tierra del Fuego hasta isla Chañaral (29° 01' S) donde anidan en escaso número. Ocasionalmente en el archipiélago Juan Fernández.

Pingüino de Magallanes

Son de coloración general negra y blanca, con las plumas centrales de la cola muy largas. El pico es moderadamente largo, macizo, algo curvado y terminado en una punta aguzada. La cabeza es grande y el cuello corto y las alas largas y puntiagudas.

Viven en aguas tropicales. Se alimentan principalmente de peces y cefalópodos que capturan lanzándose en picada al mar desde cierta altura. Anidan en pequeñas cuevas o hendiduras de las rocas poniendo un solo huevo blanco.

Ave del trópico de pico rojo ***Phaethon aethereus*** Linné
Red-billed Tropicbird - Rotschnabel-Tropikvogel

L. 61 cm. Con plumas centrales de la cola 100 cm. E. 110 cm. De coloración general blanca, con vermiculaciones negras en la espalda y mancha del mismo color a través del ojo. Plumas centrales de la cola largas, de color blanco. Pico rojo.

Los inmaduros tienen el pico amarillo y las plumas centrales de la cola son más cortas o pueden faltar completamente. Tienen manchas negras sobre la cabeza.

D. Existe un registro en Taltal y otros dudosos en alta mar, entre Valparaíso y el archipiélago Juan Fernández, y cerca de Huasco.

Ave del trópico de cola roja ***Phaethon rubricauda*** Boddaert
Red-tailed Tropicbird - Rotschwanz-Tr.

L. 46 cm. Con plumas centrales de la cola 91 cm. Plumaje blanco, a veces con un tinte rosado, especialmente en la espalda. Ceja negra delante y sobre el ojo. Plumas centrales de la cola de color rojo. Pico rojo.

Los inmaduros son blancos, sin tinte rosado, y con barras negras en las partes superiores. Las plumas largas de la cola son más cortas o faltan. La mancha del ojo apenas se nota. El pico es negruzco en aves muy jóvenes, después amarillo y luego anaranjado.

D. En islas de Pascua y Sala y Gómez y en alta mar frente a las costas del centro y norte del país.

Ave del trópico de cola blanca ***Phaethon lepturus*** Daudin
White-tailed Tropicbird - Weisschwanz-Tr.

L. 41 cm. Con plumas centrales de la cola 81 cm. E. 93 cm. Es más pequeña que las especies precedentes. Su coloración general es blanca, con línea superciliar negra y manchas del mismo color en las alas. Plumas centrales de la cola de color blanco. Pico de color amarillo verdoso a naranja rojizo.

Los inmaduros no tienen las plumas largas centrales de la cola y las vermiculaciones de las partes superiores no son tan pronunciadas como en las otras dos especies. La línea superciliar negra está bien marcada.

D. En isla de Pascua y frente a las costas de Chile.



Ave del trópico de pico rojo

Ave del trópico de cola roja



Ave del trópico de cola blanca

PIQUEROS — FAMILIA SULIDAE

Son aves de cuerpo esbelto, alas largas, pico fuerte de forma cónica y cola larga cuneada. Vuelan con aleteos vigorosos mezclados con planeos formando líneas de uno detrás de otro. Obtienen su alimento lanzándose en picada a veces de unos 30 m de altura para perseguir sus presas debajo del agua.

Anidan en forma colonial, usualmente en acantilados frente al mar. Ponen de 1 a 3 huevos blancos.

Piquero de patas azules — ***Sula nebouxii*** Milne-Edwards
Blue-footed Booby - Blaufuss-Tölpel

L. 85 cm. Parte superior del cuello blanco con estrías café. Dorso café moteado de blanco con zona blanca a la altura del comienzo del cuello; lomo blanco. Partes inferiores blancas. Alas y cola café, esta última más larga que la de los otros piqueros. Pico azul obscuro y patas azul brillantes.

El juvenil es pardusco, identificable por su cola larga.

D. En las costas de la región de Antofagasta, entre punta Paquica y Mejillones. Visitante casual.

Piquero — ***Sula variegata*** (Tschudi)
Peruvian Booby - Guano-T.

L. 73 cm. E. 138 cm. Cabeza, cuello y partes inferiores blancos; dorso café con vermiculaciones blancas; cola larga terminada en punta; alas café con coberteras marginadas de blanco. Pico gris azulado; patas celeste grisáceas.

Los juveniles son enteramente café con algo de blanco.

D. Desde Arica hasta Chiloé.

Piquero blanco — ***Sula dactylatra*** Lesson
Masked Booby - Masken-T.

L. 75 cm. E. 150 cm. De color blanco, con excepción de las primarias, secundarias y cola que son negras. El pico es amarillo, la piel desnuda de la cara es gris negruzca y las patas gris verdosas.

Los inmaduros son moteados de café, en diversos grados, hasta el subadulto que es casi similar al adulto, pero con algunas plumas café en la espalda, alas y cuello.

D. En mares circunvecinos a islas San Félix y San Ambrosio e isla Sala y Gómez, donde anidan, y en las vecindades de isla de Pascua.



Piquero de patas azules

Piquero

Piquero blanco

Piquero café ***Sula leucogaster*** (Boddaert)
Brown Booby - Braun-Tölpel.

L. 71 cm. E. 137 cm. Partes superiores, cuello, cabeza y superior del pecho de color café chocolate; parte inferior del pecho y abdomen blancos. Pico amarillo y patas verde pálido. En el juvenil las partes blancas del adulto son café claro, contrastando con el café obscuro del resto del cuerpo.

D. En el puerto de Pisagua, en isla Sala y Gómez y frente a las costas del norte de nuestro país, entre Arica y Antofagasta.



Piquero café

PELICANOS — FAMILIA PELECANIDAE

Aves de gran tamaño con alas largas y redondeadas. Pico largo, recto, terminado en gancho. Poseen una bolsa guiar grande. Las piernas son cortas y robustas, con patas grandes con los dedos unidos por una membrana. Anidan en forma colonial en islas, islotes y puntas. Ponen 2 a 3 huevos de color blanco.

Pelícano — ***Pelecanus thagus*** Molina
Chilean Pelican - Braun-Pelikan.

L. 127 cm. E. 248 cm. Inconfundible por su gran tamaño, su pico largo y bolsa guiar distensible bajo la mandíbula.

Coloración general parda. Cabeza y cuello de color amarillento; nuca, parte dorsal del cuello y dorso color castaño.

Los inmaduros son de coloración pardusca con vientre blanquecino.

D. Arica a Chiloé. Accidental en Tierra del Fuego.



Pelícano

CORMORANES FAMILIA PHALACROCORACIDAE

Los cormoranes son aves que se encuentran en las riberas de ríos, costas marinas e islas costeras. Algunas especies son importantes como productoras de guano. Los ojos, pico y piel desnuda de la cara tienen usualmente colores brillantes. El pico es largo, delgado y terminado en gancho. El cuello y cuerpo son alargados y la cola es larga y tiesa. Las piernas son cortas y las patas tienen los dedos unidos por una membrana. Ambos sexos tienen plumajes similares. Son aves gregarias que anidan formando colonias. Ponen 2 a 4 huevos blancos y calcáreos.

Yeco ***Phalacrocorax olivaceus*** (Humboldt)
Olivaceous Cormorant - Bigua-Scharbe.

L. 73 cm. E. 115 cm. Es enteramente negro. En plumaje nupcial tiene plumas filamentosas blancas en los lados de la cara, garganta y cuello; piel desnuda de la garganta amarilla obscura. Pico café; patas negras.

Los inmaduros son café oscuros y los más jóvenes tienen las partes inferiores blanquecinas.

Vive en la costa, lagos y ríos.

D. Desde Arica hasta el cabo de Hornos.

En nuestro país se encuentran dos subespecies; el Yeco, *P. o. olivaceus*, desde Arica hasta el estrecho de Magallanes, y el Yeco austral, *P. o. hornensis* Murphy, al sur del canal Beagle e islas del cabo de Hornos, que se diferencia de la otra subespecie por tener el pico mucho más corto y todas sus dimensiones menores, excepto la cola.

Cormorán de las rocas ***Phalacrocorax magellanicus*** (Gmelin)
Magellan Cormorant - Felsen-K

L. 68 cm. Cabeza, cuello y lomo de color negro con brillo azul; resto de la parte dorsal y alas de color verde tornasol; partes inferiores, desde la parte media del pecho, blancas. Partes desnudas de la cara anaranjadas. Pequeña zona blanca en la región auricular. En la época prenupcial tiene un moño de plumas satinadas en la corona.

Los juveniles son negro parduscos, con moteado obscuro en la parte ventral.

En plumaje juvenil se puede confundir con el Yeco. *P. olivaceus*, de la misma edad. Los ojos y cuerpo de aquella especie son más grandes.

Habita en las costas y canales.

D. Desde Corral hasta las islas Diego Ramírez. Casualmente en Talcahuano y Valparaíso.

Guanay ***Phalacrocorax bougainvillii*** (Lesson)
Guanay Cormorant - Guano-K.

L. 68 cm. Es negro, con garganta, pecho y vientre blancos. En plumaje nupcial tiene un moño en la corona y plumas filamentosas blancas debajo del ojo y en el cuello. Piel desnuda de la cara roja, con anillo verde alrededor del ojo. Pico color cuerno con base rojiza; patas rosado carne.

El juvenil es de color pardusco, con el vientre blanco sucio.

Se le encuentra en la costa e islas cercanas.

D. Desde el límite con el Perú hasta Magallanes.

Yeco



Cormorán de las rocas



Guanay

Lile ***Phalacrocorax gaimardi*** (Lesson y Garnot)
Red-legged Cormorant - Buntscharbe

L. 60 cm. De coloración general gris, más clara en las partes inferiores. A ambos lados del cuello una mancha blanca alargada. Partes desnudas de la cara rojo anaranjadas. Pico amarillo, con base anaranjada; patas rojo anaranjadas.

Los juveniles son de coloración general café obscura con manchas blancas apenas esbozadas a los lados del cuello.

Es habitante de costas rocosas e islas adyacentes.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego.

Cormorán imperial ***Phalacrocorax atriceps*** King
Blue-eyed Cormorant - Blauaugen-Kormoran

L. 75 cm. Partes superiores de color negro con brillo verde, azul y violeta; partes inferiores blancas; banda blanca en el ala y parche del mismo color en el centro de la espalda. El blanco de los lados de la cara formando un arco detrás del ojo. Carúnculas nasales amarillas a anaranjadas y párpados azul cobalto. Pico color córneo. Patas rosadas o naranja.

Vive en costas e islas, también en aguas interiores.

D. En Chile dos subespecies: el Cormorán imperial, *P. a. atriceps*, desde la isla Santa María (Lat. 37°S) hasta las islas Diego Ramírez, y el Cormorán antartico, *P. a. bransfield-densis* Murphy, en la Antártica chilena hasta los 65° S.

Cormorán de las Malvinas ***Phalacrocorax albiventer*** (Lesson)
King Cormorant - Königs-K.

L. 75 cm. Muy similar en tamaño y colorido a la especie precedente, de la que se diferencia porque el blanco de la cara no forma un arco, sino que. saliendo de la comisura, sigue rectamente hacia atrás; carece de la mancha blanca en el centro de la espalda. Algunos autores opinan que ésta y la especie precedente son una sola.

Habita en la costa, en los canales y aguas interiores.

D. Desde el estrecho de Magallanes hasta el cabo de Hornos.



Lile

Cormorán imperial

Cormorán de las Malvinas

AVES FRAGATA — FAMILIA FREGATIDAE

Aves marinas grandes, con alas largas y angostas y cola muy ahorquillada que abre y cierra mientras vuela. El pico es largo, terminado en gancho. Las patas son pequeñas y están unidas por una membrana sólo en la base. Viven en islas oceánicas y mares adyacentes, anidando en árboles, arbustos y rocas. Ponen uno o dos huevos blancos. Capturan su alimento mientras vuelan, en la superfície del mar o pirateando a otras aves. En la época de reproducción los machos inflan la piel de la garganta, que es de colores brillantes.

Ave fragata — ***Fregata magnificens*** Mathews

Magnificent Frigatebird - Pracht-Fregattvogel

L. 100 cm. E. 244 cm. El macho es enteramente negro con brillo violeta y bolsa guiar inflable roja en época nupcial. La hembra tiene la cabeza, parte posterior del vientre y coberteras subcaudales negras; resto de las partes inferiores blancas. El inmaduro se diferencia de la hembra por ser de coloración café obscura y por tener la cabeza completamente blanca y banda pectoral obscura.

D. En Chile (lat. 26° 10' S) hay registros en Iquique e isla Pan de Azúcar.

Ave fragata grande — ***Fregata minor*** (Gmelin)

Great Frigatebird - Binden-Fr.

L. 102 cm. E. 213 cm. El macho es igual al de la especie precedente, con la excepción que ésta tiene una banda cafesosa en la superficie superior de las alas; la hembra es muy parecida a la de magnificens, pero tiene la garganta y parte superior del cuello blanco sucio o gris ceniza. El inmaduro es como el de la especie anterior.

D. En aguas de la isla de Pascua, e isla Sala y Gómez, donde nidifica.



Ave fragata

Ave fragata grande



GARZAS Y HUAIRAVOS — FAMILIA ARDE1DAE

Tienen el pico, cuello y patas muy largos. Las alas son largas y anchas. Vuelan con el cuello retraído y las patas extendidas, que sobresalen de la cola. Anidan en forma colonial poniendo 3 a 6 huevos celestes o verdes claros. Viven en pantanos, lagunas, ríos y esteros.

Garza cuca
White-necked Heron - Sokoi-Reiher A*rdea* ***cocoi*** Linné

L. 120 cm. La más grande de todas las garzas que se encuentran en nuestro país y no se la puede confundir con alguna otra. La corona y la nuca son negras; resto de la cabeza, cuello y partes inferiores blancas. Dorso y coberteras gris azulados; alas y cola negra. Pico y patas amarillos.

Se encuentra en orillas de ríos y lagunas. Solitaria.

D. Desde Paposo (Antofagasta) hasta Magallanes.

Garza grande ***Casmerodius albus*** (Linné)
Great Egret - Silber-R.

L. 85 cm. E. 140 cm. Es completamente blanca, con el pico amarillo y las patas y piernas negras. Su tamaño grande y un cuello largo y delgado permiten reconocerla.

Vive en lagos, lagunas, ríos, esteros y vegas. Gregaria.

D. Desde Arica a Tierra del Fuego.

Garza chica ***Egretta thula*** (Molina)
Snowy Egret - Schmuck-R.

L. 58 cm. E. 100 cm. Igual que la anterior, es de coloración completamente blanca. En época de reproducción tiene un moño en la nuca y plumas largas y finas en el pecho y lomo. El pico es negro, amarillo en la base. Tibia y tarsos negros, amarillo verdosos por detrás: palas amarillas.

Vive en un ambiente similar a la especie anterior. También es gregaria.

D. Desde Arica hasta Chiloé. Accidental en el estrecho de Magallanes.

Garza cuca

Garza grande

Garza chica

Garza azul ***Egretta caerulea*** (Linné)
Little Blue Heron - Blau-Reiher.

L. 56 cm. E. 104 cm. El adulto es de color azul pizarra con cabeza y cuello de color castaño; el pico es azulado con punta negra; patas verde azuladas. El inmaduro es blanco, usualmente con las puntas de las primarias negras y se distingue de la garza chica por la coloración del pico y patas, y por carecer del moño y de las plumas largas del pecho y lomo.

Vive en lagunas y zonas pantanosas. En Chile se presenta en la costa.

D. En el extremo norte del país, en la provincia de Arica.

Garcita azulada ***Butorides striatus*** (Linné)
Striated Heron - Mangroven-R.

L. 36 cm. E. 64 cm. Es una garza pequeña de coloración general azul verdosa con manchas y líneas café amarillentas. La cabeza y cuello son castaños, con la corona negra con un moño del mismo color. El cuello es más corto que el de las otras garzas. Las patas son amarillas a naranja brillante. Los inmaduros son de coloración café estriada, gris y blanco por debajo, con manchas blancas en las alas. Cara amarillo verdosa. Pico negro por encima y amarillo por debajo.

Vive entre totorales en los bordes de lagos, lagunas y ríos.

D. Se ha observado en Chile en dos ocasiones: en Casablanca (Valparaíso) y en la desembocadura del río Lluta (Arica).

Garza boyera ***Bubulcus ibis*** (Linné)
Cattle Egret - Kuh-R.

L. 51 cm. E. 94 cm. De coloración blanca, tiene el pico amarillo a anaranjado y el cuello más corto y grueso que el de las demás garzas. En plumaje nupcial tienen el moño, pecho y parte superior del lomo de color anaranjado opaco. Patas negruzcas hasta amarillo anaranjadas. El inmaduro es blanco con las patas negruzcas.

Vive en praderas y potreros, generalmente asociada a ganado vacuno.

D. Desde Arica hasta isla Navarino. Errante en Antartica chilena.

Garza azul

Garcita azulada

Garza boyera

Huairavo ***Nycticorax nicticorax*** (Linné)
Black-crowned Night Heron - Nachtreiher

L. 56,5 cm. E. 112 cm. Tiene el dorso y lomo negros con brillo verdoso metálico y partes inferiores gris pálida o blanquecina. Alas grises. Pico largo y amarillo obscuro. Patas relativamente cortas de color amarillo. Tienen 2 ó 3 plumas blancas que salen de la parte posterior de la cabeza. El inmaduro es pardo grisáceo y listado de leonado.

Frecuenta ríos, esteros, vegas y costas marinas.

D. En Chile tenemos dos subespecies: el Huairavo, *N. n. obscurus* Bonaparte, desde Atacama hasta islas Diego Ramírez, y el Huairavo del Norte, *N. n. hoactli* (Gmelin), que vive en la costa, oasis y cordillera de Tarapacá. Se diferencia de la otra subespecie por tener la frente, las bridas y la garganta de un blanco crema. El pecho y centro del abdomen son blanquecinos.

Huairavillo ***Ixobrychus involucris*** (Vieillot)
Stripe-backed Bittern - Streifen-Dommel

L. 33 cm. Es entero de color leonado, con franja negra en la cabeza y nuca, más otras en el dorso; primarias y secundarias gris obscuras con banda terminal café amarillenta; doblez del ala café amarillento. Pico y patas amarillo verdosos.

Vive entre totorales en el borde de ríos, lagunas y pantanos.

D. Entre Coquimbo y Chiloé.



Huairavo

Huairavillo



BANDURRIAS, CUERVOS DE PANTANO Y ESPATULAS — FAMILIA THRESKIORNITHIDAE

BANDURRIAS Y CUERVOS DE PANTANO — SUBFAMILIA THRESKIORNITHINAE

Se parecen a las garzas y cigüeñas. Se distinguen de ellas por tener el pico más delgado y curvado. Vuelan con el cuello extendido como las cigüeñas. Viven y anidan especialmente en bosques pantanosos y terrenos anegadizos. Son gregarios. Ponen 2 a 3 huevos blancos con pintas café y azul opaco.

Bandurria — ***Theristicus caudatus*** (Boddaert)
Buff-necked Ibis - Weisshals-Ibis

L. 74 cm. Aves de colores llamativos, de pico largo y encorvado. Cabeza y cuello de color ocráceo; con frente, corona y nuca de color café castaño. Partes desnudas alrededor del ojo, bridas y garganta negras. El vientre es negro o blanquecino y las alas grises con primarias y secundarias negras. Pico negro con punta color cuerno; patas rojas.

Vive en praderas y nidifica en acantilados costeros, lacustres y sobre árboles.

D. En Chile viven dos subespecies: la Bandurria, *T. c. melanopis* (Gmelin), desde Paposo (Antofagasta) hasta Tierra del Fuego, y la Bandurria de la puna, *T. c. branicki* Berlepsch y Stolzmann, en Parinacota, cordillera de Arica. Es similar a la otra subespecie, pero tiene el abdomen blanquecino en lugar de negro.

Cuervo de pantano — ***Plegadis chihi*** (Vieillot)
White-faced Ibis - Brillen-Sichler

L. 56 cm. E. 94 cm. De apariencia similar a la Bandurria, es más pequeño y de coloración completamente diferente. La cabeza, cuello y partes inferiores son de color castaño púrpura brillante; dorso del mismo color con reflejos metálicos. Alas y cola pardas con reflejo bronceado. Tiene una banda de color blanco alrededor de la base del pico y que pasa detrás del ojo. Pico largo y encorvado. Los jóvenes tienen las partes superiores verde obscuras y las inferiores blanquecinas, con algo de pardo en el cuello.

Se le encuentra en lagunas y pantanos.

D. Desde Antofagasta hasta Valdivia.

Cuervo de pantano de la puna — ***Plegadis ridgwayi*** (Allen)
Puna Ibis - Schmalschnabel-Sichler

L. 60 cm. Un poco más grande que la especie precedente y más obscura, de color negro con brillo metálico verde y púrpura. No tiene la banda blanca alrededor del pico. El juvenil tiene líneas negruzcas y blancas en cabeza y cuello.

Vive en lagunas y pantanos.

D. Ha sido observado en los bofedales de Parinacota y a orillas del lago Chungará, al interior de Arica.

Bandurria

Cuervo de pantano



Cuervo de pantano de la puna

ESPATULAS — SUBFAMILIA PLATALEINAE

Espátula — ***Ajaia ajaja*** (Linné)

Roseate Spoonbill - Rosa-Löffler

L. 81 cm. E. 130 cm. Inconfundible, con su coloración rosado brillante, con el cuello y la espalda blancos. Tiene el pico largo, recto, aplanado en la punta, semejante a una espátula. Los juveniles son completamente blancos, con pico y patas amarillas.

Vive en pantanos y terrenos bajos anegados.

D. Es casual en Chile y ha sido observado en las provincias de Valparaíso. Colchagua y en la región Metropolitana.

Espátula

CIGÜEÑAS — FAMILIA CICONIIDAE

Son aves parecidas a las garzas, pero no dependen tanto de las cercanías del agua para vivir como aquéllas. Vuelan con el cuello extendido y las patas sobresaliendo de la cola. Son gregarias y se alimentan de insectos, pequeños reptiles y peces. Anidan en árboles, acantilados y edificios, poniendo 3 a 5 huevos blancos.

Cigüeña de cabeza pelada — ***Mycteria americana*** Linné
Wood Stork - Waldstorch

L. 107 cm. E. 150 cm. Cabeza y cuello desnudos de color gris pizarra. Las primarias, secundarias y la cola son negras, y contrastan con el resto del plumaje que es blanco. Pico negro, largo, robusto, curvado hacia abajo. Piernas negras y patas de color amarillo rosado. Los juveniles tienen el pico amarillo, el cuello y garganta con pequeñas manchas parduscas y las patas negras.

Vive en pantanos, lagunas y terrenos bajos anegados.

D. Hay un solo registro en Chile: en la desembocadura del río Lluta (Arica).

Pillo — ***Euxenura maguan*** (Gmelin)
Maguan Stork - Maguari-Storch

L. 110 cm. Es de color blanco, con las alas y la cola negras con brillo verde metálico. Pico, piernas y patas de color rojo. Los inmaduros son enteramente negros, sin brillo, con un número variable de plumas blancas.

Frecuenta esteros y terrenos anegados.

D. En nuestro país es visitante casual, desde Santiago a Magallanes.

Cigüeña de cabeza pelada

Pillo

FLAMENCOS — FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

Aves de cuello y patas muy largas, que llevan extendidos durante el vuelo. El pico es grueso y encorvado; está provisto de lamelas que le sirven para filtrar su alimento, formado por pequeños moluscos y crustáceos y por algas y diatomeas. Anidan formando grandes colonias. Sus nidos están hechos de barro y tienen la forma de un cono truncado. Ponen 1 ó 2 huevos de color blanco.

Flamenco chileno — ***Phoenicopterus chilensis*** Molina
Chilean Flamingo - Chile-Flamingo

L. 100 cm. Coloración general del cuerpo blanco rosado; coberteras alares y algunas plumas del dorso rojo pálido. El negro de las alas es poco visible, salvo cuando vuela. El pico en la mitad basal es amarillo pálido y el resto negro. Patas azul pálido con articulaciones, dedos y membranas rojos. Los inmaduros tienen la cabeza, cuello y pecho gris pardusco; abdomen blanco; dorso y coberteras alares con manchas pardas; cola blanca.

Vive en lagunas de agua salobre, en estuarios y alta cordillera.

D. Desde el lago Chungará (interior de Arica) hasta Tierra del Fuego.

Parina grande — ***Phoenicoparrus andinus*** (Philippi)
Andean Flamingo - Gelbfuss-Fl.

L. 115 cm. Se distingue de la especie anterior por su tamaño mayor, por su plumaje más blanco y por ser visible el negro de las alas. Parte anterior del cuello y pecho de color rojo vinoso. El pico tiene punta negra y el resto es amarillo con una mancha roja. Las patas son de color amarillo pálido.

Vive en lagos y lagunas de salares.

D. En la zona de la puna, desde el límite con Perú hasta la laguna Santa Rosa, al sur del salar de Maricunga (provincia de Chañaral)

Parina chica — ***Phoenicoparrus jamesi*** (Sclater)
Puna Flamingo - Kurzschnabel-Fl.

L. 90 cm. Esta especie, más pequeña, es fácil de confundir con ejemplares inmaduros de las otras especies. Se distingue por el pico que es amarillo, con la punta negra y una zona roja en la parte basal; las patas son de color ladrillo obscuro.

Vive en lagos y lagunas salobres.

D. En la zona de la puna de Tarapacá, Antofagasta y Atacama hasta el salar de Pedernales (provincia de Chañaral).



Flamenco chileno



Parina grande

Parina chica

CISNES, GANSOS Y PATOS — FAMILIA ANATIDAE

Esta gran familia de aves acuáticas se caracteriza por tener un pico ancho, plano con lamelas y redondeado en la punta. Muchas especies tienen una zona brillantemente coloreada en las alas, llamada espéculo. En la mayoría las alas son angostas y terminadas en punta y la cola es corta. Los dedos están unidos por una membrana. Gran número de especies presentan dimorfismo sexual, teniendo el macho una coloración más vistosa que la hembra. Se alimentan de una gran variedad de animales y plantas acuáticas que capturan en la superficie o zambulléndose. Otras especies se alimentan de pasto, como algunas del género Chloephaga.

Ponen muchos huevos (2 a 16) por nidada y los pollos son nidífugos.

PATOS SILBONES, CISNES Y GANSOS — SUBFAMILIA ANSERINAE

Pato silbón — ***Dendrocygna bicolor*** (Vieillot)
Whistling Duck - Gelbe Baumente

L. 49 cm. Tiene la cabeza, cuello y todas las partes inferiores de color ocre rojizo obscuro, más claro en la base del cuello. Por encima es negro, con las plumas marginadas de café amarillento. El pico es negro azulado; las patas son largas de color gris pizarra. La corona café rojiza, algo aplanada; su vuelo lento con sus alas cortas y con la cabeza gacha son característicos; su voz es un silbido.

Habita en pastizales abiertos cerca de lagos y lagunas.

D. En Chile es visitante muy accidental de las provincias de Cachapoal, Colchagua y región Metropolitana.

Cisne coscoroba — ***Coscoroba coscoroba*** (Molina)
Coscoroba Swan - Cascoroba-Schwan

L. 120 cm. Es totalmente blanco, excepto las puntas de las primarias que son negras. Iris rojo; pico rojo y patas rosadas.

Vive en lagunas, canales y fiordos australes.

D. De Chiloé hasta el cabo de Hornos. En invierno, raro hasta la provincia de Cachapoal.

Cisne de cuello negro — ***Cygnus melancoryphus*** (Molina)
Black-necked Swan - Schwarzhals-S.

L. 122 cm. Es completamente blanco, con excepción de los dos primeros tercios del cuello que son de color negro. Pico plomo con la base y curúncula rojas. Patas color carne claro.

Vive en lagunas con abundantes totorales, generalmente cercanas a la costa.

D. Desde el valle del Huasco (Atacama) hasta Tierra del Fuego. Casualmente en el archipiélago Juan Fernández.

Pato silbón

Cisne coscoroba





Cisne de cuello negro

Piuquén ***Chloephaga melanoptera*** (Eyton)
Andean Goose - Anden-Gans

L. 76 cm. Este ganso es enteramente blanco, excepto las alas y la cola que son negras. Pico y patas rojos.

Vive en orillas de lagunas y praderas pantanosas en la cordillera.

D. Desde Arica hasta la provincia de Ñuble. En invierno baja al valle central.

Canquén ***Chloephaga poliocephala*** Sclater
Ashy-headed Goose - Graukopf-G

L. 60 cm. Cabeza y cuello gris; pecho y parte superior de la espalda castaño. Lados del cuerpo con barras negras y blancas; centro del abdomen blanco. Cola y primarias negras. Pico negro.

Habita áreas abiertas, pastizales, orillas de ríos, lagunas y estuarios.

D. Desde la provincia de Nuble hasta Tierra del Fuego.

Canquén colorado ***Chloephaga rubidiceps*** Sclater
Ruddy-headed Goose - Rotkopf-G.

L. 60 cm. Cabeza y cuello pardo acanelado; cuerpo obscuro con barritas café rojizas, gris y negro. Cola negra; espéculo verde tornasolado brillante. Pico corto y fino, negro.

Vive en vegas esteparias y matorrales.

D. En la región de Magallanes, en las provincias de Ultima Esperanza, Magallanes centro oriental y Tierra del Fuego.



Piuquén



Canquén



Canquén colorado

Caiquén ***Chloephaga picta*** (Gmelin)
Upland Goose - Magellan-Gans

L. 66 cm. Cabeza, lomo y secundarias blancos; el resto del plumaje con barras negras y blancas o en la fase blanca, cabeza, cuello y partes inferiores blancas, con los flancos con barras negras. La hembra es parecida al Canquén colorado, pero es más grande, más obscura y con las barras más gruesas, especialmente en los flancos. El centro de las partes inferiores es con barras y no liso.

Vive en planicies abiertas semiáridas.

D. En Chile hay dos razas: *C. p. picta* y *C. p. leucoptera* Gmelin, la primera, el Caiquén de Magallanes, la más abundante, desde Colchagua hasta el cabo de Hornos; y la segunda, el Caiquén de las Malvinas, más escaso, en algunas localidades de Tierra del Fuego y Patagonia austral. Esta se distingue de la otra subespecie por ser más grande y porque el macho tiene siempre el pecho blanco, sin barras.

Caranca ***Chloephaga hybrida*** (Molina)
Kelp Goose - Kelp-G.

L. 60 cm. Presentan un marcado dimorfismo sexual. Macho: completamente blanco, pico negro con mancha carnosa alrededor de las fosas nasales; patas amarillas. Hembra; coloración general negra pardusca con gruesas barras blancas en el pecho, flancos y mitad anterior del abdomen; parte baja del dorso, lomo, cola y mitad posterior del abdomen blancos. Corona y nuca pardas; frente, cara, garganta y cuello pardo negruzcos. Espéculo verde; pico rosado y patas amarillas.

Vive en la costa marina.

D. Desde Zapallar (provincia de Petorca) hasta Tierra del Fuego.



Caiquén





Caranca

Pato juarjual
Crested Duck - Schopfente ***Lophonetta specularioides*** (King)

L. 50 cm. a 60 cm. Es un pato con cola larga y puntiaguda y con un moño o cresta de color obscuro, que a veces no se nota por estar pegado a la parte posterior del cuello. Coloración general gris y café. El espéculo es rojo cobrizo con brillo verde, limitado hacia atrás por banda negra con brillo púrpura.

Habita en lagos, lagunas y ríos.

D. En Chile viven dos subespecies: el pato juarjual, *L. s. specularioides*, desde la laguna del Maule hasta el cabo de Hornos, más pequeño que la otra raza y con el iris rojo, y el Pato juarjual del norte, *L. s. alticola* (Ménégaux), más grande, con el iris amarillo y que habita la alta cordillera, desde Arica hasta Curicó.

Quetru no volador ***Tachyeres pteneres*** (Forster)
Magellanic Flightless Steamer Duck - Magellan-Dampfschiffente

L. 78 a 83 cm. Es de coloración general gris, moteado en la espalda, pecho y flancos con gris azuloso; garganta con tono ladrillo; parte posterior del pecho y abdomen blancos; alas muy cortas con espéculo blanco. Pico amarillo anaranjado, con punta negra y carúncula en la base, de color anaranjado. Se impulsan ruidosamente sobre la superficie del agua con patas y alas.

Es ave exclusivamente marina y no se interna en lagunas del interior, debido naturalmente a que es incapaz de volar.

D. En costas e islas desde Valdivia al cabo de Hornos.

Quetru volador ***Tachyeres patachonicus*** (King)
Flying Steamer Duck - Langflügel-Dampfschiffente

L. 65 a 70 cm. Es de coloración similar a la especie precedente. Tamaño y peso bastante menores. Alas y colas mayores, en términos relativos y absolutos. Tiene, en general, una mayor tendencia al café rojizo en las partes superiores y en los flancos. Espéculo blanco. Pico grande y robusto, amarillo anaranjado con zonas azuladas cerca de las narinas y gancho negro. El macho puede presentar en ciertas épocas del año la cabeza blanca. La hembra tiene más café rojizo en la cabeza y cuello.

Al igual que el Quetru no volador, se impulsa sobre el agua con patas y alas. Vuela con facilidad en verano y de malas ganas en invierno, cuando convive en el mar con la otra especie.

Vive en la costa marina y en lagos interiores.

D. Desde la provincia de Nuble hasta Tierra del Fuego.



Palo juarjual

Quetru no volador





Quetru volador

Pato anteojillo ***Anas specularis*** King
Bronze-winged Duck - Augenbrauenente

L. 53 cm. Es de coloración general negra pardusca encima y pardusca rojiza por debajo. Tiene una mancha blanca ovalada a los lados de la cara; mentón, centro de la garganta y lados del cuello blancos. Las alas son negras con brillo verde y el espéculo es rojo cobrizo, limitado atrás por banda negra y blanca. Pico negro y patas amarillas.

Vive en ríos de caudal rápido de zonas forestadas y en lagunas cordilleranas.

D. Desde Valparaíso hasta Tierra del Fuego. Más abundante de Cautín al sur. En la parte más septentrional de su distribución, sólo como visitante de invierno.

Pato jergón chico ***Anas flavirostris*** Vieillot
Chilean Teal - Andenente

L. 38 a 43 cm. Cabeza y cuello moteados de negro y café. Cuerpo de coloración general pardo grisácea; pecho y vientre blanquecinos con manchas negras. Espéculo negro con parte superior verde metálico y banda anterior y posterior café claro. Pico amarillo con culmen y gancho negros. Patas gris azules.

Vive en charcos de agua dulce y en la desembocadura de los ríos.

D. En Chile tenemos dos subespecies: el Pato jergón chico, *A. f. flavirostris*, desde Coquimbo hasta Tierra del Fuego, y el Pato jergón chico del norte, *A. f. oxyplera Meyen*, desde Arica hasta Atacama; es de mayor tamaño que la otra raza, con pico más largo y dorso más pálido.

Pato real ***Anas sibilatrix*** Poeppig
Chiloe Wigeon - Chile-Pfeifente

L. 51 cm. De colores llamativos y de aspecto general blanco y negro. Se le reconoce fácilmente por su frente y mejillas blancas, con el resto de la cabeza y cuello negros. Al volar muestra franjas blancas en las cubiertas alares. Pico y patas negros.

Tiene la costumbre de silbar mientras vuela.

Habita de preferencia zonas húmedas y lagunas.

D. Desde la desembocadura del río Huasco (Atacama) hasta Tierra del Fuego. Casual en la Antartica chilena.



Pato anteojillo

Pato jergón chico





Pato real

Pato gargantillo *Anas bahamensis* Linné
Bahama Pintail - Bahamaente

L. 49 cm. Se parece a la especie que sigue, de la que se diferencia por tener una gran mancha blanca que ocupa los lados de la cara y la garganta y por la parte anterior del cuello que es amarillenta. Esto resalta del resto del plumaje, cuya coloración general es café. El espéculo es verde brillante, con banda café con leche adelante y negra aterciopelada atrás El pico es negro azulado con dos manchas rojas o amarillo anaranjadas en la base de la maxila.

Vive en la costa y prefiere lagos salobres.

D. En nuestro país es visitante desde Arica a Magallanes.

Pato de alas azules *Anas discors* Linné
Blue-winged Teal - Blauflügelente

L. 38 cm. El macho tiene la cabeza gris con una mancha blanca en forma de medialuna delante del ojo; la coloración general es parda clara con manchas más obscuras. El espéculo es verde y tiene una zona celeste en el ala formada por las coberteras y separada del espéculo por una banda blanca. La hembra tiene las partes superiores café obscuras con las plumas marginadas de café anaranjado; partes inferiores café amarillentas claras. con manchas café; plumaje de reposo del macho es similar al de la hembra.

Vive en lagunas y remansos de ríos.

D. En Chile hay un solo registro: cerca de Los Vilos (provincia de Choapa).

Pato colorado *Anas cyanoptera* Vieillot
Cinnamon Teal - Zimtente

L. 44 a 48 cm. El macho es de color café rojizo intenso en todo el cuerpo, menos en el lomo, que es negro; las alas y espéculo como en el Pato de alas azules. Pico negro y patas amarillas. La hembra es similar a la del Pato de alas azules, pero tiene un tono más ocráceo y el pico más largo; muy difíciles de distinguir en el terreno.

Vive entre la vegetación tupida de las orillas de lagunas y ríos.

D. En Chile hay dos subespecies: el Pato colorado, *A. c. cyanoptera*, desde Copiapó hasta el estrecho de Magallanes, y el Pato colorado de la puna, *A. c. orinomus* Oberholser, que es muy similar a la subespecie anterior, pero con las alas y tarsos más largos; la hembra tiene más pardo ocráceo en los lados de la cara y cuello. Se le encuentra en las cordilleras de Tarapacá y Antofagasta.



Pato gargantillo



Pato de alas azules



Pato colorado



Pato cuchara *Anas platalea* Vieillot
Red Shoveler - Fuchs-Löffelente

L. 51 cm. Muy parecido, en general, en tamaño y plumaje al Pato jergón grande, del que se distingue por el pico. En esta especie es de gran tamaño, de color negro y ensanchado en su extremo. El espéculo es verde brillante con banda blanca que la separa de las cubiertas alares que son celestes. El macho es café moteado con la cabeza más clara; la hembra es de coloración más pálida. Por el tamaño y forma del pico son inconfundibles.

Es habitante de pantanos, esteros, estuarios y lagunas barrosas.

D. Desde Coquimbo hasta el estrecho de Magallanes.

Pato cortacorrientes *Merganetta armata* Gould
Torrent Duck - Sturzbachente

L. 40 cm. El macho tiene la cabeza y cuello blancos con rayas negras; partes superiores con rayas longitudinales blancas y negras. El pecho y abdomen color café amarillento. Ambos sexos tienen espéculo verde limitado adelante y atrás por banda blanca. Pico rojo y patas rojizas. Cola larga y tiesa y espolón en las alas. La hembra es gris por encima y café por debajo.

Habita en ríos correntosos de aguas claras.

D. En nuestro país viven dos subespecies: el Pato cortacorrientes, *M. a. armata*, desde Atacama hasta Tierra del Fuego y en ríos de la cordillera de Nahuelbuta, en las provincias de Arauco y Malleco, y el Pato cortacorrientes del norte, *M. a. turneri* Sclater y Salvin, en la provincia de Parinacota, región de Tarapacá. El macho de esta subespecie se diferencia por tener el cuello blanco y el dorso negro sin rayas blancas. La hembra es indistinguible.

Pato negro *Netta peposaca* (Vieillot)
Rosy-billed Pochard - Peposaka-Ente

L. 55 cm. Un pato de gran tamaño que presenta dimorfismo sexual. El macho tiene el pico rosado intenso con carúncula basal del mismo color y punta negra. Cabeza, cuello y pecho negros con brillo purpúreo; el resto del cuerpo es de coloración predominantemente negra y finamente estriada de gris. Patas amarillas. La hembra es de color café relativamente uniforme con subcaudales más claras y una banda blanco grisácea en el ala. Pico pardo azulado y patas amarillas. Sería difícil confundirlos con otros patos, salvo la hembra que se parece algo a la del Pato castaño, pero no frecuentan los mismos lugares.

Habita en lagunas, esteros y ríos.

D. Desde Vallenar (Atacama) hasta Magallanes.



Pato cuchara



Pato cortacorrientes



Pato negro

Pato castaño ***Netta erythrophthalma*** (Wied)
South American Pochard - Rotaugenente

L. 43 cm. Un pato de color café obscuro con brillo púrpura. Manto y escapulares con finas pintas pardas; flancos con tinte pardo rojizo. Espéculo blanco limitado hacia atrás por ancha banda negra; cola café. Patas negras, pico gris azulado e iris rojo guinda. Hembra de coloración general café pardo con banda blanca en el ala y unas manchas blanquecinas en las mejillas, detrás del ojo y cuello.

Habita en la alta cordillera en ríos y lagunas, bajando en invierno a la costa.

D. Capturado en Chile una sola vez, en Arica, probablemente en el valle de Lluta

Pato jergón grande **Anas *georgica*** Gmelin
Brown Pintail - Spitzschwanzente

L. 51 cm. Se reconoce por su coloración parda salpicada de puntos más obscuros, con la garganta blanca sucia a veces con puntos negros, por el espéculo negro bronceado con bandas anteriores y posterior color café amarillento. Pico amarillo con culmen y punta negros y cola terminada en punta aguda.

Vive en ríos, lagunas y pantanos.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego. Accidental en las islas Shetland del Sur. Antartica chilena.

Pato capuchino ***Anas versicolor*** Vieillot
Silver Teal - Silberente

L. 40 a 43 cm. Parecido al Pato jergón chico. Parte superior de la cabeza, hasta debajo del ojo. café negruzca; resto de la cabeza y garganta de color ocre blanquecino; partes inferiores con fino rayado blanco y negro, similar al dorso y lomo. Espéculo verde brillante con una banda blanca adelante y otra atrás. Pico azul, con mancha anaranjada a cada lado de la maxila.

Vive en terrenos pantanosos al borde de ríos y lagunas.

D. En nuestro país habitan dos subespecies: el Pato capuchino. *A. v. versicolor*, desde Santiago hasta la provincia de Chiloé. y el Pato capuchino austral. *A. v. fretensis* King, desde Valdivia hasta Tierra del Fuego, de mayor tamaño y con las rayas negras transversales más obscuras y gruesas en el abdomen, supra y subcaudales y flancos.



Pato castaño





Pato jergón grande



Pato capuchino

Pato puna ***Anas puna*** Tschudi
Puna Teal - Punaente

L. 48 cm. Muy parecido al Palo capuchino, del que se diferencia por tener la parte superior de la cabeza más obscura, parte inferior de la espalda café grisácea y los lados del cuerpo con finas barras negras y blancas. Pico más grande enteramente azul jacinto. La hembra difiere del macho por tener más café en partes inferiores y la cola y coberteras caudales sin barras o apenas perceptibles.

Habita en lagunas y ríos de la alta cordillera.

D. Alta cordillera de Tarapacá y Antofagasta.

Pato criollo ***Cairina moschata*** (Linné)
Muscovy Duck - Moschusente

L. Macho 84 cm. Hembra 66 cm. Este es el pato doméstico común en nuestro país, que en algunas partes ha vuelto a su estado silvestre. Es de gran tamaño, sobre todo el macho, con coloración general verde obscura, brillante, con mancha blanca en el ala; el macho posee una carúncula roja en la base del pico, que es gris obscuro; patas grises. Este plumaje es diferente al que presenta la especie doméstica, que puede ser verde, gris, café o blanco, o una mezcla de estos colores.

Vive en lagunas, tranques y embalses.

D. En Chile se conocen dos casos de asilvestramiento: en tranque de Huencuecho, Pelarco (provincia de Talca) y fundo "Los Quillayes" (provincia de Curicó).

Pato rana de pico ancho ***Oxyura jamaicensis*** (Gmelin)
Ruddy Duck - Schwarzkopf-Ruderente

L. 47 cm. Cabeza y cuello negros con mentón blanco y mejillas con manchas dispersas blancas. Espalda, parte anterior del cuello, pecho y abdomen moteados de café grisáceo y negro. Cola negra, rígida. Pico grande y ancho de color azul. La hembra es café por arriba con manchas y barras negras. Partes inferiores café rojizas; zona más clara en la cara. Pico plomo.

Vive en lagunas y esteros.

D. En lagos andinos desde Arica hasta Tierra del Fuego. Desde Valparaíso al sur se le encuentra en lagunas del valle central y de la costa.



Pato puna

Pato criollo





Pato rana de pico ancho



Pato rana de pico delgado ***Oxyura vittata*** (Philippi)
Lake Duck - Binden-Ruderente

L. 39 cm. Es parecida a la especie anterior, pero es más pequeña. Carece de blanco en las mejillas y el negro de la cabeza se extiende más atrás, hacia la espalda; pico azul más pequeño y menos ancho. La hembra es parecida a la del Pato rana de pico ancho, pero tiene una raya que parte de las bridas, pasa debajo del ojo y termina en la nuca.

Vive en lagunas del valle central y cerca de la costa.

D. Desde el río Huasco (Atacama) hasta Tierra del Fuego.

Pato rinconero ***Heteronetta atricapilla*** (Merrem)
Black-headed Duck - Kuckucksente

L. 42 cm. Un pato de coloración general café, con cabeza negra y mentón blanco; el pico durante la época de la reproducción es azul, con base roja y culminicornio y unguicornio negros; en otras épocas del año es negro. El pecho y abdomen es color blanco sucio. La hembra se parece algo a la hembra del Pato colorado, pero no tiene espéculo iridiscente.

Frecuenta lagunas con abundantes totorales.

D. Desde Valparaíso hasta Osorno.

Pelícano

Cormorán imperial

Flamenco chileno

Parina grande



Pato rana de pico delgado



Pato rinconero

CONDORES Y JOTES — FAMILIA CATHARTIDAE

Estas aves se alimentan casi exclusivamente de cadáveres de animales. Una adaptación para este hábito es el de tener la cabeza y el cuello desprovistos de plumas, ya que deben introducirlos en las cavidades de los animales, a veces en estado de putrefacción. El pico está provisto de gancho y las garras son poco fuertes. Las alas son largas y anchas y planean muy bien sirviéndose de las corrientes termales ascendentes. Anidan en cuevas naturales o en el suelo bajo matorrales poniendo 1 a 3 huevos blancos manchados de rojizo o con coloración general gris verdosa pálida.

Cóndor — ***Vultur gryphus*** Linné
Andean Condor - Kondor

L. 110 cm. E. 315 cm. Es la más grande de todas las aves de rapiña. Tiene la cabeza y cuello desnudos de color rojizo, con cresta en la cabeza; collar blanco en la base del cuello. Resto del plumaje negro, con un parche dorsal grande blanquecino en las alas. La hembra es similar al macho, pero no tiene cresta. Los juveniles son de color café obscuro, el collar es café y no tienen blanco en las alas.

Vive en las cordilleras, bajando a la costa.

D. Desde Arica hasta el cabo de Hornos.

Jote de cabeza negra — ***Coragyps atratus*** (Bechstein)
Black Vulture - Rabengeier

L. 65 cm. Cabeza y parte del cuello desnudos de color negruzco. Coloración uniformemente negra con brillo metálico por encima. Cuando vuela se le nota una mancha brillante en la parte inferior y dorsal de las alas. Es gregario.

Vive en todos los ambientes donde haya carroña, tanto en el campo como en las ciudades.

D. Desde Arica hasta Aysen.

Jote de cabeza colorada — ***Cathartes aura*** (Linné)
Turkey Vulture - Truthahngeier

L. 71 cm. Un poco más grande que la especie precedente, de la que se diferencia por tener las partes desnudas de la cabeza y cuello de color rojizo. La cola es más larga y angosta y presenta área translúcida en las alas.

Vive en terrenos abiertos, especialmente cerca del litoral marino.

D. Desde Arica hasta el cabo de Hornos.

Cóndor

Jote de cabeza negra

Jote de cabeza colorada

Jote de cabeza amarilla ***Cathartes burrovianus*** Cassin
Yellow-headed Vulture - Kl. Gelbkopf-Geier

L. 69 cm. La coloración general es negra; la cabeza desnuda tiene la corona verde azulada y el resto anaranjado a amarillo, a veces con verdoso.

Vive en terrenos abiertos y pantanos.

D. Hay un solo registro en Chile; en Vallenar (Atacama).

Jote de cabeza amarilla

AGUILAS, AGUILUCHOS, PEUCOS Y BAILARINES — FAMILIA ACCIPITRIDAE

Estas aves de rapiña están provistas de garras fuertes y afiladas. El pico es corto y curvado y en su base tiene una cubierta llamada cera, que a veces está coloreada conspicuamente.

Sus alas son anchas y redondeadas y al volar planean frecuentemente. En la mayoría de los casos la hembra es de mayor tamaño que el macho. Exhiben una gran variedad de fases de coloración y las aves inmaduras son bastante diferentes a las adultas. Anidan en árboles o riscos con nidadas de 1 a 6 huevos blancos o celestes con manchas café.

Aguila pescadora — ***Pandion haliaetus*** (Linné)
Osprey - Fischadler

L. 59 cm. Cabeza, cuello, pecho y abdomen blancos; en la corona tiene un moño blanco con rayas obscuras y una banda café obscura que va del ojo al cuello. Partes superiores café; la cola tiene barras obscuras. El inmaduro es similar al adulto, pero tiene el pecho más manchado y las plumas de las partes superiores tienen bordes pálidos.

Vive en las costas, ríos y lagos.

D. Es un visitante regular poco común. En nuestro país ha sido observado desde Tarapacá a Valdivia.



Aguila pescadora

AGUILUCHOS, PEUCOS Y BAILARINES — SUBFAMILIA ACCIPITRINAE

Bailarín — ***Elanus leucurus*** (Vieillot)
White-tailed Kite - Gleitaar

L. 38 cm. Por encima, incluyendo las plumas centrales de la cola, gris pálido. Frente, lados de la cabeza y partes inferiores de color blanco. Gran mancha negra encima de las alas y otra más pequeña por debajo; raya superciliar negra. Iris rojo y patas amarillas. La hembra es igual, pero de mayor tamaño. El inmaduro es cafesoso moteado de blanco por encima; por debajo es blanco con las plumas bordeadas de café acanelado. La cola es blanca con una delgada faja subterminal obscura.

Vive en terrenos abiertos, pastizales y pantanos.

D. En nuestro país desde Copiapó hasta Llanquihue.

Peuquito — ***Accipiter bicolor*** (Vieillot)
Bicolored Hawk - Zweifarbensperber

L. Macho 37 a 38 cm.; hembra 41 a 42 cm. Sexos iguales. Es de cuerpo muy esbelto, alas cortas y redondeadas; cola muy larga y plumaje gris listado. Por encima es gris obscuro y por debajo es gris con bandas transversales angostas de color blanco. Cola gris con seis barras más obscuras y punta blanquecina. Calzones café rojizos. Párpados e iris amarillos. Patas amarillo verdosas.

El inmaduro es por encima gris obscuro, con una especie de collar nucal de color café rojizo claro; las partes inferiores son de un color blanquizco cremoso con rayas longitudinales negras. Calzones gris cafesosos con fajas transversales negras. Cola como en adulto, destacándose más las barras obscuras.

Vive en terrenos abiertos entremezclados con bosques espesos.

D. Desde la región de Valparaíso hasta Tierra del Fuego.

Aguila — ***Geranoaetus melanoleucus*** (Vieillot)
Black-chested Buzzard-Eagle - Aguja

L. 70 cm. Es el representante más grande de esta subfamilia en Chile y se caracteriza por tener las alas anchas y la cola corta y ancha. Los adultos tienen el pecho negro; la garganta, abdomen y calzones blancos con finas rayitas negruzcas; partes superiores negras con zona blanca cenicienta en las alas, que se ve blanca plateada desde lejos. La hembra se diferencia del macho por tener en las coberteras secundarias y supracaudales un teñido café rojizo y por ser de mayor tamaño. El inmaduro es de coloración obscura, café, casi negra, con pecho café amarillento manchado de negro; partes inferiores con barras transversales negras y blanquecinas; calzones café amarillentos con barras negras.

Se la encuentra en casi todos los hábitats secos.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego.



Bailarín

Peuquito





Aguila

Aguilucho ***Buteo polyosoma*** (Quoy y Gaimard)
Red-backed Hawk - Rotrückenbussard

L. 48 cm. Presenta varias fases de plumaje. En el plumaje normal o típico, toda la cara inferior, desde la garganta hasta los supracaudales, incluyendo los calzones, es blanca; por encima es gris pizarra, con alas más obscuras; la cola es blanca con finas rayas transversales grises, con banda subterminal negra. La hembra es igual al macho, pero tiene un área café rojiza en el dorso. En las otras fases el melanismo (negro) se combina con eritrismo (café rojizo), pero la manera más segura de identificarlo es por la cola, que es blanca y tiene siempre la banda subterminal negra. Esto también permite diferenciarlo del Peuco y del Aguilucho de cola rojiza. El inmaduro es manchado pardo y ocráceo, parte inferior ocre clara y puntas de las alas negras.

Vive en toda clase de ambientes.

D. En Chile viven dos subespecies: el Aguilucho, *B. p. polyosoma*, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y el Aguilucho de Más Afuera, *B. p. exsul* Salvin, en la isla Alejandro Selkirk (archipiélago Juan Fernández), que se diferencia de la raza continental por ser de mayor tamaño, por tener el plumaje más obscuro por encima y por carecer la hembra de la mancha café rojiza en el dorso.

Aguilucho de la puna ***Buteo poecilochrous*** Gurney
Puna Hawk - Puna B.

L. 56 cm. Similar a la especie anterior, de la que se diferencia por ser más grande. Presenta también varias fases de coloración.

Vive en la alta cordillera y no llega a la costa.

D. Un solo registro en Chile: en el tranque de Caritaya, región de Tarapacá.

Aguilucho de cola rojiza ***Buteo ventralis*** Gould
Rufous-tailed Hawk - Magellan-B.

L. 57 cm. Por encima es de coloración negruzca y el abdomenes blanco, con estrías pardo castañas; pecho café rojizo intenso. La cabeza es parda con cara rojiza y garganta blanca; se le reconoce por la cola rojiza con ocho franjas negras angostas. El ejemplar joven es negro por encima con algunas plumas blancas; por debajo es blanco con lados de la cabeza y flancos con estrías negras. La cola es gris cenicienta con barras grises angostas y la punta es blanco sucio.

Frecuenta bosques y renovales.

D. Desde la provincia de Choapa hasta Tierra del Fuego.



Aguilucho

Aguilucho de la puna

Aguilucho de la cola rojiza

Aguilucho chico ***Buteo albigula*** Philippi
White-throated Hawk - Weisskehl-B.

L. 44 cm. Por encima es café negruzco y por debajo blanco; lados del cuello y pecho café castaño. Lados del cuerpo y vientre con estrías café. Calzones blancos con barras café rojizas. Pico negro con cera amarilla. Cola café obscura con numerosas barras negras no muy visibles. El inmaduro es similar al adulto, pero tiene las plumas de las cubiertas alares finamente bordeadas de café rojizo pálido y los calzones son amarillo pálidos con barras negras. Los lados del pecho y los flancos son en gran parte negros y carecen de tinte café rojizo.

Vive en los bosques.

D. Ha sido capturado en Valdivia, en la cordillera de Nahuelbuta (provincia de Malleco). costa de la provincia Cardenal Caro y en Vallenar (provincia de Huasco).

Peuco ***Parabuteo unicinctus*** (Temminck)
Bay-winged Hawk - Wüsten-B.

L. 53 cm. Por encima es gris obscuro con algunas plumas café rojizas y mancha del mismo color en las alas; por debajo es gris cafesoso con algunas plumas con bordes café amarillentos o blancos. Garganta blanca con líneas transversales obscuras. Calzones café amarillentos con franjas transversales café rojizas. Cola gris obscura con base y banda terminal blanca. Pico azulado, con cera amarilla. Patas amarillas. El inmaduro es amarillento ocre con rayas longitudinales negras por debajo. Dorsalmente es gris obscuro con manchas café amarillentas; cola gris con base blanca y barras transversales más obscuras y punta blanquecina. Calzones amarillentos ocráceos con barras transversales café.

Vive desde la precordillera hasta la costa.

D. Desde Arica hasta Aysen.

Vari ***Circus cinereus*** Vieillot
Cinereous Harrier - Grauweihe

L. Macho 40 cm.; hembra 50 cm. Es de forma esbelta y alas largas. El macho es de color gris azulado en todo el cuerpo, excepto el abdomen y flancos, que tienen un rayado transversal blanco y café rojizo claro. La hembra es negra en las partes superiores y el rayado blanco y café rojizo claro se extiende por toda la parte inferior del cuerpo. Ambos sexos tienen un collarín blanquizco alrededor del cuello, que cuando lo erizan le dan aspecto de lechuza. El inmaduro es similar a la hembra, pero tiene más café rojizo claro en la parte ventral. Se distingue por su vuelo lento y tambaleante, con frecuentes bailes aéreos en que el ave permanece en un mismo sitio.

Vive en terrenos bajos y pantanosos, en totorales.

D. Desde Tarapacá hasta Tierra del Fuego.



Aguilucho chico



Peuco juv.



Vari

Vari huevetero ***Circus buffoni*** (Gmelin)
Long-winged Harrier - Weissbrauenweihe

L. 52 cm. Es más grande que la especie precedente. El macho tiene todas las partes superiores negras con tinte purpúreo; la frente y collarín blancos; cuello negro, garganta, pecho y abdomen blancos. La hembra tiene la cabeza y el cuerpo de color castaño obscuro, con el collarín, subcaudales y piernas rojizas.

Vive en campos abiertos, lejos de las habitaciones humanas.

D. Ave rara en nuestro país. Ha sido capturada solamente en Zapallar (provincia de Petorca), Peñaflor (región Metropolitana) y en la provincia de Cachapoal. Hay un registro visual en Porvenir (Tierra del Fuego).

Vari huevetero

HALCONES, TIUQUES Y TRAROS FAMILIA FALCONIDAE

Los miembros de esta familia se caracterizan por tener alas largas y angostas terminadas en punta. Tienen un vuelo remado vigoroso y raramente planean. Se alimentan de pequeños mamíferos, aves, culebras, anfibios, crustáceos, moluscos e insectos. Anidan en árboles o en grietas de acantilados poniendo 2 a 6 huevos de color blanco cremoso con manchas rojizas.

Tiuque ***Milvago chimango*** (Vieillot)
Chimango Caracara - Chimango

L. 40 cm. Por encima es café amarillento, con alas café obscuras; por debajo más claro, teñido de café rojizo en el pecho. Abdomen más blanquecino. Tiene manchas blancas arenosas en alas y lomo. Cola blanquecina jaspeada de café, con banda ancha subterminal café. El inmaduro tiene más café claro y carece de la banda subterminal café.

Vive en casi todos los ambientes; en campos cultivados sigue el arado.

D. En Chile tenemos tres subespecies: *M. ch. chimango*, el Tiuque, desde Atacama a Concepción y áreas continentales de Aysen y Magallanes; *M. ch. lemucoensis* W. L. Sclater, el Tiuque del Sur, desde la provincia de Nuble hasta la de Chiloé y áreas costeras de Aysen y Magallanes. Es el que tiene las partes superiores más obscuras entre las 3 subespecies, más café ocráceo en el pecho y con las barras del pecho y del abdomen más pronunciadas, y *M. ch. fuegiensis* A. W. Johnson y F. Behn, el Tiuque de Tierra del Fuego, que vive en las regiones forestadas de la isla de Tierra del Fuego y es más grande que las otras dos subespecies. Introducido en isla de Pascua, posiblemente M. ch. chimango.

Carancho cordillerano ***Phalcoboenus megalopterus*** (Meyen)
Mountain Caracara - Berg-Karakara

L. 52 cm. Negro reluciente en la cabeza, dorso y pecho; resto de las partes inferiores blancas. Cola negra, con base y punta blancas. Partes desnudas de la cabeza rojizas y patas amarillo anaranjadas. El inmaduro es todo café rojizo con supracaudales blanco crema.

Vive casi exclusivamente en las cordilleras, pero en la región norte de su zona de distribución alcanza hasta la costa.

D. Desde Arica hasta la provincia de Colchagua.

Carancho cordillerano del sur ***Phalcoboenus albogularis*** Gould
White-throated Caracara - Weisskehl-Karakara

L. 52 cm. Bastante parecido a la especie anterior, de la que se diferencia por tener todas las partes inferiores blancas; partes desnudas de la cara amarillas. El inmaduro es indistinguible del de la especie anterior.

Vive en la cordillera de los Andes.

D. Desde Ñuble hasta Tierra del Fuego.



Tiuque

Carancho cordillerano





Carancho cordillerano del sur

Carancho negro ***Phalcoboenus australis*** (Gmelin)
Striated Caracara - Falkland-Karakara

L. 62 cm. Coloración general café negruzca, con estriaciones pálidas en la nuca, garganta, cuello y pecho; calzones y parte baja del abdomen café rojizo; cola negra con banda terminal blanca; partes desnudas de la cara y patas amarillo naranja. El inmaduro es de color café ahumado con pintas amarillentas; cola café ocre. Cara y patas gris claro.

Vive en costas rocosas.

D. En canales y costas exteriores de Magallanes y en islas al sur del canal de Beagle.

Traro ***Polyborus plancus*** (Miller)
Crested Caracara - Karakara

L. 56 cm. De coloración general pardo obscura, con partes superiores de la cabeza negra, con plumas en forma de moño; zonas cremosas en la garganta y mejillas. Dorso y pecho pardo obscuro con estrías crema. La cola es blanquecina con barras café y banda terminal del mismo color. Zonas desnudas de la cara rojizas; pico amarillo con base azulada y cera naranja. Patas amarillas pálidas.

Los inmaduros son más claros por encima y con numerosas rayas longitudinales por debajo; cara y tarsos como en el adulto, pero de colores más apagados.

Vive en campos abiertos o bosques.

D. Desde Arica al cabo de Hornos. Mucho más abundante en el extremo austral de Chile.

Halcón peregrino ***Falco peregrinus*** Tunstall
Peregrine Falcon - Wanderfalke

L. Macho 41 cm.; hembra 47 cm. De coloración general blanca y negra; alas largas y puntiagudas. Cabeza, parte posterior del cuello, parte alta del dorso y alas de color negro. Frente, garganta, centro del cuello, pecho y parte del abdomen blanco cremoso con barras transversales gris obscuras. Pico azulado, cera y párpados amarillos; patas amarillas. El inmaduro es por encima de color negro sucio, con plumas ribeteadas de café rojizo claro en la parte posterior del cuello a modo de collar. Por debajo es amarillento sucio, que es puro en la garganta y el resto tiene gruesos flecos centrales negros; la cola es más obscura que la del adulto.

Se le encuentra en todo tipo de ambientes.

D. En nuestro país se encuentran dos subespecies; el Halcón peregrino boreal, *F. p. anatum* Bonaparte, visitante de verano desde Arica hasta Valdivia, casual en el archipiélago de Juan Fernández, y el Halcón peregrino austral, *F. p. cassini* Sharpe, desde Vallenar hasta Tierra del Fuego. Se diferencia de la otra raza por no tener la mancha auricular blanquecina y la mancha frontal blanca amarillenta. En general, de coloración más obscura, con las barras más gruesas.

Carancho negro

Traro

Halcón peregrino

Halcón pálido ***Falco kreyenborgi*** Kleinschmidt
Pallid Falcon -Kreyenbor-Falke

L. 41,5 cm. Es similar al Halcón peregrino, pero más pálido. Cabeza café pálida estriada, bañada de gris obscuro en la corona; dorso gris claro con finas barras negras a los lados del abdomen. Cola con barras negras y gris cafesosas y punta blanca. La hembra tiene la superficie dorsal ocrácea. Los inmaduros tienen la corona café amarillenta con estrías negras; dorso negro pardusco con barras café amarillentas y ocráceas. Supracaudales con bandas anchas blancas; las partes inferiores, incluidas las mejillas, blanco cremosas, con banda mostachal negra. Parte inferior del pecho con estrías negruzcas; cola negruzca con puntos de color café amarillento formando alrededor de diez bandas disparejas.

Vive en campos planos y en acantilados.

D. En la región de Magallanes, por el norte hasta Puerto Natales.

Halcón perdiguero ***Falco femoralis*** Temminck
Aplomado Falcon - Aplomado-Falke

L. 40 cm. Se distingue por tener las partes inferiores de color café amarillento más claro en el pecho, y más obscuro, con tintes más rojizos, en el abdomen y calzones y con zonas de igual color en la cabeza y mejillas. Por encima es gris pardo obscuro; la cola con seis o siete bandas blancas. Pico gris obscuro.

Vive en campos abiertos.

D. En Chile viven dos subespecies; el Halcón perdiguero. *F. f. pichinchae* Chapman, desde Arica hasta Curicó, y el Halcón perdiguero austral, *F. f. femoralis*, solamente en Magallanes y que se distingue de la otra subespecie por ser de menor tamaño y de coloración más pálida.

Cernícalo ***Falco sparverius*** Linné
American Kestrel - Buntfalke

L. 27 cm. Se reconoce por su tamaño pequeño. Centro de la corona color castaño rodeado de gris; garganta y lados de la cabeza blancos. Cabeza con dos franjas negras verticales; dorso café rojizo con estrías transversales negras. Cola café rojiza con banda subterminal negra. La hembra se diferencia del macho por ser más grande, por tener la cola con barras delgadas negras y partes inferiores con rayas longitudinales café rojizas. El inmaduro es como la hembra.

Vive en campos abiertos.

D. En Chile tenemos tres subespecies: el Cernícalo, *F. s. cinnamominus* Swainson, desde Atacama hasta Tierra del Fuego; el Cernícalo del norte, *F. s. peruvianus* (Cory), en valles y oasis de la región de Tarapacá, y el Cernícalo de Juan Fernández, *F. s. fernandensis* (Chapman), que se encuentra en las islas Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe (archipiélago Juan Fernández) y posiblemente en islas San Félix y San Ambrosio.



Halcón pálido



Halcón perdiguero



Cernícalo

Halcón reidor ***Herpetotheres cachinnans*** (Linné)
Laughing Falcon - Lachfalke

L. 46-56 cm. Cabeza blanca amarillenta con mancha negra lateral que se prolonga formando un anillo nucal; corona con líneas negras finas. La coloración general es ocre amarillenta, con alas, dorso y lomo pardos. Cola redondeada con barras negras y ocráceas. Pico negro con cera amarilla. La hembra es igual al macho, pero más grande.

Vive en los bordes de bosques, cerca de ríos, lagunas, plantaciones y carreteras.

D. Un solo registro en Chile: en quebrada de Camarones (región de Tarapacá).

Halcón reidor

FAISANES Y CODORNICES — FAMILIA PHASIANIDAE

Las dos especies que se encuentran en Chile son introducidas. Los representantes de esta familia tienen su mayor desarrollo en Asia. Sus alas son cortas y redondeadas. La cola puede ser muy larga como en los faisanes o muy corta como en las codornices. Las patas son cortas y fuertes, algunas con espolón. Anidan en el suelo poniendo de 2 a 22 huevos blancos manchados de café. Son muy importantes como aves de caza.

Faisán — ***Phasianus colchicus*** Linné
Common Pheasant - Fasan

L. Macho 65 cm.; hembra 55 cm. La cabeza y cuello son verdosos con iridiscencia púrpura. Anillo blanco alrededor del cuello. Pecho rojizo bronceado con las plumas marginadas de negro purpúreo. Lomo amarillo grisáceo; flancos cafesosos claros, con las plumas marginadas de negro azulado. Lado de la cabeza rojo. La cola es larga o más larga que el cuerpo. La hembra es cafesosa, con manchas negras, más clara en las partes inferiores y la cola más corta que la del macho.

D. Introducida en nuestro país, se la encuentra en áreas bien restringidas de las provincias de Cautín y Valdivia. Aparentemente en las cercanías de Illapel, provincia de Choapa

Codorniz — ***Callipepla californica*** (Shaw)
California Quail - Schopfwachtel

L. 25 cm. El macho tiene el pecho gris azulado; abdomen amarillento moteado de rojizo; cara y garganta negras; la frente es amarilla y presenta un moño negro prominente, de punta redondeada. La hembra es de colores apagados y de moño corto.

Se la encuentra de preferencia en terrenos secos, en faldeos y quebradas de la precordillera y en cualquier terreno con matorrales.

D. Introducida en nuestro país, actualmente desde Atacama a Cautín. También fue introducida en la isla Robinson Crusoe (archipiélago Juan Fernández).



Faisán

Codorniz

TAGUAS Y PIDENES — FAMILIA RALLIDAE

Tienen el cuerpo comprimido lateralmente. Las alas son cortas y redondeadas y la cola es corta. Las patas son grandes y los dedos largos, lobulados en las taguas. Viven en lugares húmedos. Muchas especies son solitarias y de hábitos crepusculares. Se alimentan de una gran variedad de materia vegetal y animal. Anidan en el suelo o en nidos flotantes poniendo de 2 a 16 huevos blanco cremoso con manchas café rojizas.

Pidén — ***Rallus sanguinolentus*** Swainson

Plumbeous Rail - Grauralle

L. 39 cm. Partes superiores café oliváceas; partes inferiores y frente de la cabeza gris plúmbeo. Pico largo, rojo sangre en la base, azulado en la parte media y verdoso en el extremo. Tarsos y patas rojas; iris rojo púrpura.

Vive en vegas, orillas de lagunas, ríos y esteros.

D. En Chile viven tres subespecies: el Pidén, *R. s. landbecki* (Hellmayr), desde Atacama hasta Aysen; el Pidén del norte, *R. s. simonsi* (Chubb), en los valles húmedos de Arica y en Pica, en la región de Tarapacá, y en Quillagua, región de Antofagasta, y que se diferencia de la subespecie precedente por ser de menor tamaño y más oliváceo que cafesoso por encima, y el Pidén de Magallanes, *R. s. luridus* (Peale), en la zona del estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, de mayor tamaño que las subespecies precedentes. Pico más grueso y partes superiores teñidas de café rojizo.

Pidén austral — ***Rallus antarcticus*** King

Austral Rail - Magellanralle

L. 22 cm. Partes superiores café amarillentas con estrías negras. Garganta gris clara; pecho y abdomen de color plomo; flancos y lados del abdomen rayado transversalmente de negro y blanco. Cubiertas alares café rojizas. Maxila roja obscura y mandíbula rojo brillante. Iris amarillo anaranjado.

Vive en vegas y terrenos húmedos.

D. Es escaso y sólo hay registros en el área Metropolitana y en las provincias de Llanquihue y Magallanes.

Pidén moteado — ***Rallus maculatus*** Boddaert

Spotted Rail - Pardelralle

L. 25,5 cm. Partes superiores café obscuras con rayas blancas; partes inferiores blancas con rayas negras en el cuello y barras del mismo color en el vientre. Pico verde amarillento brillante con base de la mandíbula rojo anaranjada. Patas rojizas.

Vive en lugares pantanosos con totoras.

D. Un solo registro accidental en Chile, en isla Robinson Crusoe (archipiélago Juan Fernández).



Pidén

Pidén austral





Pidén moteado

Pidencito ***Laterallus jamaicensis*** (Gmelin)
Black Crake - Schieferralle

L. 16 cm. Cabeza y partes inferiores de color gris plúmbeo. Nuca, parte posterior y lateral del cuello y parte superior del dorso de un pardo oliváceo; flancos con barras blancas. Alas y resto de las partes superiores y rectrices más obscuras con manchitas transversales blancas. Pico corto, pardo verdoso; patas verdosas; iris rojo.

Vive en pantanos y fangales.

D. Desde el valle del Huasco (Atacama) hasta Angol (provincia de Malleco).

Tagüita ***Porphyriops melanops*** (Vieillot)
Spot-flanked Gallinule - Maskenpfuhlhuhn

L. 29 cm. Frente y corona negras; resto de la cabeza, garganta, parte anterior y lateral del cuello y pecho gris claro, que pasa al blanquecino en el abdomen. Flancos pardo aceitunados con manchas blancas redondas; resto del dorso, lomo, supracaudales y alas pardo oliváceo, con tinte castaño en las cubiertas alares. Pico y escudo frontal verde obscuro. Iris rojo.

Vive en vegas, esteros y orillas de ríos y lagunas con pajonales.

D. Desde el valle de Copiapó (Atacama) hasta la provincia de Aysen.

Tagüita del norte ***Gallinula chloropus*** (Linné)
Common Gallinule - Teichralle

L. 36 cm. Coloración general gris obscura, más clara en las partes inferiores; banda blanca en los lados del cuerpo; subcaudales blancas. Escudo frontal de color rojo escarlata; pico rojo con punta amarilla.

Vive en lagunas de la alta cordillera.

D. Alta cordillera de Tarapacá.



Pidencito

Tagüita





Tagüita del norte

Tagüita purpúrea ***Porphyrula martinica*** (Linné)
Purple Gallinule - Zwergsultanshuhn

L. 30 cm. Cabeza, cuello y partes inferiores de color azul violeta; dorso y cubiertas alares azul verdoso con brillo tornasolado. Punta de las alas y cola castaño verdosas. Escudo azul lila. Pico rojo obscuro en la base y amarillo verdoso en la punta.

Vive en terrenos húmedos.

D. Un solo registro en Chile: en Pica (Tarapacá).

Tagua americana ***Fulica americana*** Gmelin
American Coot - Indianerblässhuhn

L. 46 cm. Coloración general gris pizarra; cabeza y cuello negros. Pico blanco con los lados amarillos; escudo frontal castaño.

Vive en lagunas y pantanos.

D. Zona de la puna de Tarapacá y Antofagasta. También en Chacance, río Loa (provincia de Tocopilla).

Tagua ***Fulica armillata*** Vieillot
Red-gartered Coot - Armillata-Huhn

L. 50 cm. Coloración general pizarra con cabeza y cuello negros. Pico amarillo con manchas rojas sobre las narinas y base de maxila y mandíbula; escudo frontal amarillo bordeado a veces de rojo. Patas oliváceas.

Habita lagunas y ríos.

D. Desde Coquimbo hasta Tierra del Fuego.



Tagüita purpúrea

Tagua americana





Tagua

Tagua chica ***Fulica leucoptera*** Vieillot
White-winged Coot - Weissflügelblässhuhn

L. 43 cm. Coloración general gris pizarra. Pico y escudo frontal, redondeado y sobresaliente, de color amarillo limón o naranja.

Vive en lagunas con o sin pajonales, en la alta cordillera y en terrenos bajos.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego.

Tagua de frente roja ***Fulica rufifrons*** Philippi y Landbeck
Red-fronted Coot - Rotstirnblässhuhn

L. 47 cm. Cabeza y cuello negros; cuerpo de coloración general cenicienta obscura, más clara en las partes inferiores. Pico amarillo limón, rojo en la base, con escudo frontal alargado rojo obscuro, terminado en punta hacia arriba.

Habita lagunas y pantanos.

D. Desde el río Copiapó (Atacama) hasta Magallanes. Accidental en isla Robinson Crusoe (arch. de Juan Fernández).

Tagua gigante ***Fulica gigantea*** Eydoux y Souleyet
Giant Coot - Riesenblässhuhn

L. 64 cm. Cabeza y cuello negros; resto del cuerpo de color gris apizarrado obscuro. Pico rojo obscuro con punta amarilla; escudo frontal amarillo limón con línea mediana blanca.

Vive en lagunas de la alta cordillera.

D. En la región de Tarapacá. hasta los 20° S.

Cisne coscoroba

Pato real



Caiquén colorado



Piuquén



Tagua chica

Tagua de frente roja





Tagua gigante

Tagua cornuda ***Fulica cornuta*** Bonaparte
Horned Coot - Rüsselblässhuhn

L. 62 cm. Cabeza y cuello negros; resto del plumaje negro apizarrado. Pico de color verde amarillento. No tiene escudo frontal. Posee una carúncula alargada de color negro.

Vive en lagunas de la alta cordillera.

D. Desde Tarapacá hasta Atacama, entre latitudes 19° y 28° 46' S.



Tagua cornuda

CHORLOS CABEZONES — FAMILIA BURHINIDAE

Como su nombre vulgar lo indica, tienen la cabeza grande y ancha y los ojos muy grandes. Las piernas son moderadamente largas y la articulación tibiotarsal está engrosada, por lo que en los países de habla inglesa se les conoce como "thick-knee". Las alas son medianamente largas y terminadas en punta; la cola es más bien larga y graduada. Ponen en el suelo 2, raramente 3 huevos, blancos o café claros con manchas. Son de hábitos crepusculares y nocturnos.

Chorlo cabezón — ***Burhinus superciliaris*** (Tschudi)

Peruvian Thick-knee - Peru-Triel

L. 40 cm. Es un chorlo grande, macizo, de cabeza grande; ojos igualmente grandes y patas gruesas y fuertes. Las partes superiores son gris ceniza con barritas más obscuras. Garganta, parte inferior del pecho y abdomen blancos; parte anterior del cuello y alta del pecho gris ceniciento; mancha negra a los lados de la parte posterior de la corona; ceja blanca que casi se une en la nuca.

Vive en terrenos áridos.

D. Dos registros en Chile: ambos en Arica, en 1851 y 1971.

Chorlo cabezón

CHORLOS Y QUELTEHUES — FAMILIA CHARADRIIDAE

Aves de cabeza grande, redonda y cuello corto y grueso. Las alas son puntiagudas y a veces con espolón; cola corta. Los ojos están colocados muy lateralmente, lo que les da una campo visual muy amplio. Viven a orillas del mar, en lagos, lagunas y ríos, como también en pantanos y campos. Ponen 2 a 5 huevos verdes opacos con manchas negras.

Queltehue — ***Vanellus chilensis*** (Molina)
Southern Lapwing - Tero-Tero

L. 36 cm. Frente, parte anterior del cuello, pecho y remeras externas de color negro; resto de la cabeza y cuello grises. Partes superiores gris verdosas con brillo metálico, broncea-do en las cubiertas menores y verde en las medianas. Vientre, flancos y subcaudales blancos. Cola negra, blanca en la base y en la punta. Pico rojo claro en la base y negro en la punta; patas rosadas.

Vive en praderas y campos húmedos.

D. En nuestro país viven dos subespecies: el Queltehue, *V. ch. chilensis*, desde Atacama hasta Chiloé y accidental en las islas Juan Fernández, y el Queltehue austral, *V. ch. fretensis* (Brodkorb), desde Aysen a Tierra del Fuego. Se diferencia de la subespecie anterior por ser más pequeña.

Queltehue de la puna — ***Vanellus resplendens*** (Tschudi)
Andean Lapwing - Anden-Kiebitz

L. 32 cm. Se diferencia de la especie anterior por ser más pequeño y por no tener la parte anterior del cuello y pecho negros. El pico es amarillo en la base y negro en la punta.

Vive en campos húmedos y riberas de lagos y lagunas.

D. En la zona de la puna de Tarapacá y Antofagasta. Dos ejemplares fueron observados en la desembocadura del río Lluta (Arica).

Chorlo ártico — ***Pluvialis squatarola*** (Linné)
Black-bellied Plover - Kiebitz-Regenpfeifer

L. 28 cm. En plumaje invernal, el que presenta cuando llega a nuestro país, es finamente manchado con blanco y pardusco; garganta, vientre y lomo blancos; en plumaje de reproducción tiene las partes inferiores negras. Se le reconoce por tener una mancha negra bajo las alas. La cola es blanca con barras obscuras.

Vive en fangales y playas arenosas.

D. Es visitante de verano, desde Arica hasta Concepción.



Queltehue

Queltehue de la puna



Chorlo ártico

Chorlo dorado ***Pluvialis dominica*** (Müller)
Golden Plover - Wander-Regenpfeifer

L. 26 cm. Muy parecido a la especie anterior, de la que se diferencia, en plumaje de invierno, por tener las partes inferiores manchadas de amarillo. Lomo obscuro y partes inferiores de las alas pardo claro. En plumaje de reproducción las partes superiores son negras con manchas amarillas pálidas.

Se le encuentra en playas arenosas, fangales y en la pampa.

D. Visitante raro de verano, ha sido capturado en Arica, en Huara (provincia de Iquique) y en Bucalemu (provincia de Colchagua).

Chorlo semipalmado ***Charadrius semipalmatus*** Bonaparte
Semipalmated Plover - Sand-R.

L. 16,5 cm. Frente blanca, seguida de una banda negra; resto de la cabeza, dorso y alas de color gris ceniciento. Banda negra que, partiendo del pico, pasa el ojo y se pierde a los lados de la cabeza; banda negra ancha en el pecho. Garganta blanca y resto de las partes inferiores del mismo color. Pico anaranjado con punta negra; patas anaranjadas.

Vive en playas, fangales y lagunas interiores.

D. Es un raro visitante de verano y ha sido capturado en Arica, Coquimbo, desembocadura del río Ligua (en la provincia de Petorca) y en Calbuco (provincia de Llanquihue).

Chorlo nevado ***Charadrius alexandrinus*** Linné
Snowy Plover - See-R.

L. 15 cm. Parecido a la especie anterior, pero con el collar pectoral negro incompleto, no cerrado en el pecho; pico y patas negros. En invierno el negro del pecho es grisáceo.

Vive en playas y en las riberas de lagunas vecinas.

D. Desde Arica hasta las provincias de Llanquihue y Chiloé.



Chorlo dorado

Chorlo semipalmado





Chorlo nevado

Chorlo de la puna ***Charadrius alticola*** (Berlepsch y Stolzmann)
Puna Plover - Puna-R.

L. 18 cm. Tiene la cabeza redonda; frente blanca con banda negra más atrás. Color café amarillento en la corona y nuca. Partes superiores gris cafesosas claras e inferiores blancas, con dos bandas pectorales del color del dorso poco conspicuas. Pico corto, de color negro y patas negras.

Vive en lugares pantanosos y orillas de lagunas en la región de la puna.

D. Regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Chorlo de doble collar ***Charadrius falklandicus*** (Latham)
Two-banded Plover - Falkland-R.

L. 19 cm. Frente blanca con barra negra a través de la parte anterior de la corona; parte posterior de ésta y lados de la cabeza con tinte café amarillento. Pecho con dos bandas negras, la inferior más ancha; partes superiores gris cafesosas. Pico y patas negros. El plumaje de invierno es similar, pero no presenta la banda negra en la cabeza y las bandas pectorales están poco definidas.

Vive en las costas y en las vecindades de vegas y lagunas del interior.

D. Desde Antofagasta hasta el cabo de Hornos.

Chorlo de collar ***Charadrius collaris*** Vieillot
Collared Plover - Azara-R.

L. 16 cm. Frente blanca; bridas y corona negras, esta última bordeada posteriormente con café amarillento. Partes superiores gris cafesosas con marginaciones café amarillentas; partes inferiores blancas con collar pectoral negro. Patas anaranjadas o café claras; pico negro.

Se parece al Chorlo nevado, *Ch. alexandrinus*, del que se diferencia por tener el collar pectoral completo y visos café amarillentos en el dorso.

Visitante de invierno en costas y estuarios.

D. Desde la provincia de Valparaíso hasta Valdivia. Algunas parejas se quedan durante el verano. Se los ha encontrado anidando a orillas del río Nuble, cerca de Chillan.



Chorlo de la puna



Chorlo de doble collar



Chorlo de collar

Chorlo gritón ***Charadrius vociferus*** Linné
Killdeer - Schrei-R.

L. 25 cm. Se parece al Chorlo de doble collar, pero es más grande y con la cola más larga; tiene el lomo y las coberteras caudales superiores de color café amarillento. La cola está moteada de café amarillento, negro y blanco. Pico negro y patas color carne.

Vive en riberas, praderas húmedas, pastizales y campos cultivados; más raro en playas arenosas.

D. En Chile, sólo en Arica.

Chorlo chileno ***Zonibyx modestus*** (Lichtenstein)
Rufous-chested Dotterel - Rotbrust-R.

L. 22 cm. Frente y ceja blancas. Partes superiores café. Garganta gris; pecho color castaño con banda posterior negra. Resto de las partes inferiores y plumas externas de la cola blancas. En plumaje de invierno es de color café obscuro con el vientre blanco.

Vive en la costa, ciénagas, pampas, lagos y en zonas montañosas del interior en Tierra del Fuego.

D. Desde Llanquihue hasta el cabo de Hornos. Visitante de invierno desde Antofagasta hasta Valdivia.

Chorlo de campo ***Oreopholus ruficollis*** (Wagler)
Tawny-throated Dotterel - Klippen-R.

L. 25 cm. Se reconoce por su coloración gris cafesosa pálida, su pico largo, dedos cortos, garganta café rojiza clara y mancha negra que se destaca en el abdomen blanquecino. Pico negro y patas rosadas.

Vive de preferencia en zonas esteparias.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego.



Chorlo gritón



Chorlo chileno

Chorlo de campo

Chorlo de Magallanes ***Pluvianellus socialis*** Gray
Magellanic Plover - Magellan-Regenpfeifer

L. 20 cm. Partes superiores gris claras e inferiores blancas; pico negro y patas rosadas brillantes; iris rosado.

Vive en las riberas de lagos y lagunas poco profundas.

D. En zona del estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.

Chorlito cordillerano ***Phegornis mitchellii*** (Fraser)

Diademed Sandpiper Plover - Bänder-R.

L. 19 cm. Partes superiores pardo grisáceas con algo de brillo bronceado. Cabeza negra con raya blanca que rodea la corona; semicollar castaño rojizo a los lados y atrás del cuello, que se prolonga hasta los hombros. Pecho y flancos blancos, con rayas finas negras; pechera bajo el cuello y centro del abdomen blancos. Pico negro y patas amarillas.

Vive en partes húmedas de la alta cordillera.

D. Desde Arica hasta Curicó.



Chorlo de Magallanes

Chorlito cordillerano

PILPILENES — FAMILIA HAEMATOPODIDAE

Son habitantes de las costas marinas. Se caracterizan por el pico largo, recto y fuerte, comprimido lateralmente. Las alas son largas y puntiagudas y la cola es corta. Las piernas y patas son fuertes, con dedos unidos por una membrana en su base. Se alimentan principalmente de moluscos. Ponen 2 a 3 huevos blanco grisáceos con manchas negras, en una depresión en la arena.

Pilpilén ***Haematopus palliatus*** Temminck
American Oystercatcher - Braunmantel-Austernfischer

L. 43 cm. Cabeza, cuello y parte del pecho negro apizarrado; resto de las partes inferiores blancas, partes superiores café; cola negruzca. Pico rojo carmín, amarillento en la punta. Patas rosadas.

Vive en playas e islotes rocosos.

D. Desde Arica hasta Chiloé.

Pilpilén austral ***Haematopus leucopodus*** Garnot
Magellanic Oystercatcher - Magellan-A.

L. 44 cm. Se diferencia de la especie anterior por ser mucho más obscuro, ya que el negro apizarrado y el café está reemplazado por un negro metálico reluciente. Pico rojo escarlata o rojo anaranjado. Patas blancas o rosado pálidas.

Vive en los mismos ambientes que la especie anterior: en Tierra del Fuego y Magallanes, en llanos y campos semihúmedos del interior.

D. Desde Chiloé hasta el cabo de Hornos. Casualmente hasta Valdivia.

Pipilén negro ***Haematopus ater*** Vieillot y Oudart
Black Oystercatcher - Russ-A.

L. 52 cm. Cabeza, cuello y partes inferiores de color negro; partes superiores, alas y cola de color café. Pico rojo anaranjado y patas color carne o blanquecinas.

Vive en playas e islotes rocosos.

D. Desde Arica hasta el cabo de Hornos.



Pilpilén



Pilpilén austral



Pilpilén negro

PERRITOS Y CAITIS — FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Aves que se caracterizan por su pico largo, delgado, curvado hacia arriba en el Caití o recto en el Perrito. Las patas son muy largas. Viven en playas marinas cerca de las desembocaduras de ríos y en lagunas y salares de la alta cordillera. Ponen de 2 a 5 huevos verdes opacos con manchas negras o café rojizas.

Perrito — ***Himantopus mexicanus*** (Müller)
Common Stilt - Stelzenläufer

L. 42 cm. Es inconfundible. Tiene las partes superiores negras, las inferiores blancas; patas rojas muy largas y pico negro.

Vive en terrenos anegadizos, lagos y desembocaduras de ríos y esteros.

D. Desde la provincia de Huasco hasta la provincia de Llanquihue.

Caití — ***Recurvirostra andina*** Philippi y Landbeck
Andean Avocet - Anden-Säbelschnäbler

L. 45 cm. Pico encorvado hacia arriba. Alas, cola y parte media del dorso negras; todo el resto del cuerpo blanco. Pico y patas gris obscuros.

Vive en la zona de la puna, en salares y lagunas salobres.

D. Desde el límite norte del país hasta la laguna del Negro Francisco (provincia de Copiapó).



Perrito

Caití



JACANAS — FAMILIA JACANIDAE

Se caracterizan por tener las patas largas, con los dedos y las uñas muy largas, lo que les permite caminar sobre la vegetación flotante. Las alas son anchas y están provistas de un espolón. Viven en los bordes de lagunas y lagos y se alimentan de insectos, caracoles, peces y semillas de plantas acuáticas. Anidan en pajonales o construyen nidos flotantes y la postura es de 3 a 6 (usualmente 4) huevos café, con o sin manchas café obscuras o negras.

Jacana — ***Jacana*** — ***jacana*** (Linné)
Wattled Jacana - Rotstirn-Jacana

L. 25 cm. Cabeza, cuello, parte superior del manto y partes inferiores negro purpúreo. Alas y dorso de color castaño vivo; primarias y secundarias amarillo verdosas. Cola castaña. Pico amarillo con escudo frontal rojo intenso.

Vive en pantanos, riberas de ríos y lagos.

D. Un solo registro en Chile: en Quillota.



Jacana

BECACINAS PINTADAS — FAMILIA ROSTRATULIDAE

Son aves que tienen una coloración críptica por encima, en que dominan el café, el gris, el negro y el blanco. El pico es largo y ligeramente curvado. Las alas son anchas y la cola corta. Las patas son moderadamente largas y los dedos son largos. Viven en terrenos húmedos, donde se alimentan de insectos, moluscos, gusanos y semillas. Anidan en el suelo poniendo 2 a 5 huevos blancos con manchas obscuras.

Becacina pintada — *Nycticryphes semicollaris* (Vieillot)

South American Painted Snipe - Weissflecken-Goldschnepfe

L. 22 cm. Corona negruzca con línea central pálida; espalda café grisácea moteada con castaño y negro; a cada lado de la espalda una línea ocrácea; rémiges con manchas redondas blancas; cuello y pecho café, con marca semilunar a los lados del pecho; resto de las partes inferiores blancas. Pico y patas verdosas.

Vive en ambientes pantanosos y terrenos bajos.

D. Desde la región de Coquimbo hasta la provincia de Osorno.



Becacina pintada

PLAYEROS, POLLITOS DE MAR, etc. FAMILIA SCOLOPACIDAE

Se distinguen por su cuerpo fusiforme, su cabeza angosta, comprimida lateralmente y frente alta. Los ojos son grandes y colocados hacia arriba y atrás en la cabeza. El pico es largo. Las alas son anchas y puntiagudas y la cola es corta. Las patas son delgadas, largas o medianas. Habitan en las costas marinas y en lugares húmedos y pantanosos. Ponen 2 a 4 huevos de color verde oliváceo con pintas café.

PLAYEROS, BECACINAS, ZARAPITOS, etc. SUBFAMILIA SCOLOPACINAE

Pitotoy solitario ***Tringa solitaria*** Wilson
Solitary Sandpiper - Einsamer Wasserläufer

L. 18 cm. Partes superiores de color café oliváceo obscuro, con estrías blancas en la cabeza, cuello y manchas del mismo color en la espalda. Por debajo blanco. Plumas externas de la cola con barras blancas y negras. Patas largas, verdes obscuras. En plumaje de invierno es más gris, con menos estriaciones.

Vive en ciénagas y ríos.

D. Un solo registro en Chile: en el valle de Azapa, Arica.

Pitotoy chico ***Tringa flavipes*** (Gmelin)
Lesser Yellowlegs - Gelbschenkel

L. 24 cm. Parecida a la especie anterior, pero más grande. Por encima es café obscura con manchas blancas; lomo y cola blanca, esta última con algunas barras pardo grisáceo poco notorias. Partes inferiores blancas con estrías gris negruzcas. Patas amarillas. En invierno se notan menos las manchas y estrías.

Vive en orillas de lagunas, desembocaduras de ríos y lugares pantanosos, en la costa y en la cordillera. Es visitante de verano.

D. Desde Arica hasta Magallanes.

Pitotoy grande ***Tringa melanoleuca*** (Gmelin)
Greater Yellowlegs - Grosser G.

L. 34 cm. Similar a la especie anterior, pero de mayor tamaño y con las patas amarillas muy largas.

Se le encuentra en desembocaduras de ríos, vegas, orillas de lagunas, tanto en la costa como en la cordillera. Es visitante de verano.

D. Desde Arica a Magallanes.



Pitotoy solitario



Pitotoy chico



Pitotoy grande

Playero vuelvepiedras ***Arenaria interpres*** (Linné)
Ruddy Turnstone - Steinwälzer

L. 23 cm. La coloración general es pardusca; vientre y garganta blancos y con marcas blancas en alas; lomo y cola; las supracaudales forman una "V", bien visible en vuelo; patas naranja amarillentas. En el verano boreal tiene el dorso negro y café rojizo; bandas negras en la cara.

Vive en playas arenosas con piedrecillas.

D. Desde Arica hasta Magallanes.

Playero manchado ***Actitis macularia*** (Linné)
Spotted Sandpiper - Drosseluferläufer

L. 17 cm. Por encima es de color oliváceo con tinte bronceado; ceja blanca. Partes inferiores blancas. El pico tiene la maxila negra con borde amarillo; mandíbula amarilla; patas amarillentas. En plumaje de verano boreal tiene manchas redondas obscuras en las partes inferiores.

Vive en costas marinas y riberas de lagos.

D. Ha sido capturado ocasionalmente en Arica, Tocopilla. bahía Salada (Atacama) y lago Calbutué (Llanquihue).

Playero gris ***Heteroscelus incanus*** (Gmelin)
Wandering Tattler - Wanderwasserläufer

L. 24,5 cm. Partes superiores gris obscuras e inferiores blancas, con el pecho gris pálido. Banda blanca sobre el ojo. Patas amarillentas. En plumaje de verano boreal tiene las partes inferiores con barritas gris obscuras.

Prefiere costas rocosas y playas pedregosas.

D. Un solo registro: en punta Abtao (Antofagasta).



Playero vuelvepiedras

Playero manchado





Playero gris

Playero grande ***Catoptrophorus semipalmatus*** (Gmelin)
Willet - Schlammtreter

L. 40 cm. Las partes superiores son de color gris pardusco homogéneo. Partes inferiores blancas, con baño gris pálido en la parte anterior del cuello. Alas con banda blanca. Grandes coberteras alares y puntas de las remeras negras; cola blanca con banda gris en su parte terminal. Pico largo, negruzco; patas grisáceas. En el verano boreal tiene estrías obscuras en la cabeza y cuello, y barras en la espalda; las partes inferiores blancas con manchas y barras obscuras.

Vive en la costa.

D. Visitante de verano. Escaso. Ha sido capturado en Arica e Iquique (Tarapacá) y en Concón (Valparaíso). Ha sido observado en Tongoy (provincia de Elqui).

Playero de las rompientes ***Aphriza virgata*** (Gmelin)
Surf-bird - Gischtläufer

L. 25 cm. Partes superiores pardo grisáceo obscuro; banda blanca sobre el ojo. Cola blanca con banda subterminal negra. Garganta blanquecina; pecho gris ceniza; resto de las partes inferiores blancas con algunas manchas gris obscuras. Pico negro y patas amarillo verdosas. En el verano boreal tiene las partes superiores, garganta y pecho variegadas de negro y color arena.

Habita en costas rocosas.

D. Visitante de verano desde Arica hasta Magallanes. Algunos ejemplares se quedan durante nuestro invierno.

Playero ártico ***Calidris canutus*** (Linné)
Red Knot - Knutt

L. 26 cm. Tiene el cuerpo redondeado, con cuello y piernas relativamente cortos. Partes superiores grises, con rayitas parduscas; supracaudales blancas con bandas pardas. Partes inferiores blancas, con pecho y flancos con manchas y vermiculaciones gris parduscas. A veces con algo de café rojizo en el pecho. Pico y patas negros. En plumaje de verano boreal tiene manchas negras, blancas y ocres por encima; pecho café rojizo y abdomen blanco.

Se encuentra en costas rocosas y planicies cenagosas.

D. Raro visitante de verano en nuestro país. Ha sido observado y capturado en Arica, desembocadura del río Huasco, desembocadura del río Maipo y del estero Yali, y en Tierra del Fuego. Fue observado recientemente en Montemar, Valparaíso, a fines de septiembre de 1979.



Playero grande

Playero de las rompientes





Playero ártico

Playero enano ***Calidris minutilla*** (Vieillot)
Least Sandpiper - Wiesenstrandläufer

L. 15 cm. Partes superiores café grisáceo obscuro. Lomo negro. Partes inferiores blancas, con el pecho estriado de café obscuro. Plumas externas de la cola grises. Patas verdes amarillentas. En verano boreal, las plumas de las partes superiores están bordeadas de café rojizo.

Vive en las costas y en aguas interiores.

D. Un solo registro en Chile: en caleta Vitor, 20 km. al sur de Arica.

Playero de Baird ***Calidris bairdii*** (Coues)
Baird's Sandpiper - Baird-Str.

L. 18 cm. Partes superiores café obscuras con estrías más claras. Mentón y parte alta del cuello blanco sucio; pecho café estriado. Abdomen y flancos blanco sucio. Pico y patas negros.

Migra por la costa y el interior.

D. Visitante de verano, desde Arica hasta Tierra del Fuego.

Playero de lomo blanco ***Calidris fuscicollis*** (Vieillot)
White-rumped Sandpiper - Weissbürzel-Str.

L. 18 cm Muy difícil de distinguir en el terreno de la especie precedente. Por arriba es de color arenoso grisáceo, con algunas plumas negras o descoloridas. Partes inferiores blancas; lomo blanco y no café como en C. bairdii. Pico y patas negros.

Se le encuentra en el litoral marino.

D. Visitante de verano desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego. Un registro en isla Livingstone, Shetland del Sur, Antartica.



Playero enano



Playero de Baird



Playero de lomo blanco

Playero pectoral ***Calidris melanotos*** (Vieillot)
Pectoral Sandpiper - Graubrust-Str.

L. 24 cm. Parecido a C. bairdii, pero de mayor tamaño. La cabeza y partes superiores del cuerpo de color pardusco, con las plumas rayadas de negro y bordeadas de canela claro; garganta blanca; parte anterior del cuello y del pecho blanco sucio con rayas longitudinales negras; abdomen y subcaudales blancos. Pico y patas amarillo verdosas.

Se le encuentra en la cordillera y en la costa.

D. De Tarapacá a Osorno.

Playero occidental ***Calidris mauri*** (Cabanis)
Western Sandpiper - Bergstrandläufer

L. 14 cm. Muy parecido a C. melanotos, pero más pequeño. El pico negro es más largo que la cabeza y es ligeramente curvado en la punta. Patas negras.

Habita en playas y riberas pantanosas.

D. Un solo registro en Chile; en la bahía de Coquimbo.

Playero semipalmado ***Calidris pusilla*** (Linné)
Semipalmated Sandpiper - Sand-Str.

L. 15 cm. Partes superiores grisáceas, moteadas de pardusco en la cabeza y plumas bordeadas de pardo y blanco en el dorso; garganta blanca y pecho lavado de grisáceo. Resto de las partes inferiores blancas. Patas negras con membrana que une la base de los dedos. Muy parecido al Playero de Baird. es casi imposible identificarlo sin capturar ejemplares.

Habita las costas marinas y de aguas dulces.

D. En Chile ha sido observado en Chacalluta y en caleta Vitor, ambas localidades cercanas a Arica en Coquimbo y Santo Domingo (Provincia de San Antonio).



Playero pectoral

Playero occidental



Playero semipalmado

Playero blanco ***Calidris alba*** (Pallas)
Sanderling - Sanderling

L. 17 cm. Partes superiores gris ceniza con rayas finas parduscas; frente, lados de la cabeza y partes inferiores blancas; banda blanca en el ala. Pico negro, algo grueso; patas negras. Vuela en bandadas muy compactas.

Vive en la costa, ocasionalmente en el interior.

D. Visitante abundante y regular de verano desde Arica hasta Magallanes.

Playero de patas largas ***Calidris himantopus*** (Bonaparte)
Stilt Sandpiper - Bindenstrandläufer

L. 22 cm. Del tamaño del Playero vuelvepiedras, con el pico y las patas largas. Las partes superiores son gris pálidas con plumas bordeadas de blanco; partes inferiores blancas con el pecho lavado de ocre pálido ligeramente moteado de obscuro. Pico negro y patas verde oliva.

Vive en lagunas y playas lacustres.

D. Un solo registro en Chile: en Arica en 1851.

Batitú ***Bartramia longicauda*** (Bechstein)
Upland Sandpiper - Prärie-Str.

L. 30 cm. De coloración general café con estrías claras. La garganta es blanca y el pecho ocráceo con estriaciones parduscas; la cabeza es relativamente pequeña, con el pico corto. Patas amarillas, largas.

Vive en terrenos abiertos.

D. Hay tres registros en Chile: en la cordillera de Santiago, en 1888, en la isla Decepción, Antártica chilena, en 1923 y en salar de Pedernales, Atacama, en 1987.



Playero blanco

Playero de patas largas



Batitú

Zarapito ***Numenius phaeopus*** (Linné)
Whimbrel - Regenbrachvogel

L. 42 cm. Es de coloración general café y café amarillento, con mentón y garganta blancos, al igual que el abdomen; reconocible fácilmente por el pico negro, largo y encorvado hacia abajo.

Se le encuentra en playas, estuarios y desembocaduras de ríos; muy raramente en el interior.

D. Visitante regular del Hemisferio Norte, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Algunos ejemplares se quedan durante el invierno.

Zarapito boreal ***Numenius borealis*** (Forster)
Eskimo Curlew - Eskimo-Brachvogel

L. 34 cm. Muy parecido a la especie anterior, pero de menor tamaño.
Hábitat similar a *N. phaeopus*.

D. Visitante de verano, posiblemente extinguido. En Chile se lo encontraba desde Arica hasta Chiloé.

Zarapito de pico recto ***Limosa haemastica*** (Linné)
Hudsonian Godwit - Hudsonschnepfe

L. 37 cm. Partes superiores gris obscuras con las plumas bordeadas de pardo obscuro. Garganta blanquecina, pecho gris pálido y abdomen leonado grisáceo o blanco sucio; lomo blanco y cola negra. Pico largo y ligeramente encorvado hacia arriba, basalmente rosado y distalmente negro. En verano boreal las partes superiores son pardo obscuras con manchitas café rojizas; cuello y partes inferiores café rojizas pálidas.

Vive en costas, lagos, lagunas, vegas y riberas de ríos.

D. Visitante de verano, aunque es posible encontrar ejemplares durante la mayor parte del año. Desde Arica hasta Tierra del Fuego.



Zarapito



Zarapito boreal



Zarapito de pico recto

Zarapito moteado ***Limosa fedoa*** (Linné)
Marbled Godwit - Marmorschnepfe

L. 43 cm. Similar a la especie precedente, con pico igualmente largo y algo encorvado hacia arriba; con partes inferiores ante rosado y con finas barras negras; no tiene el lomo blanco. Cola con barras café rojizas y negras. Pico con base rojiza y resto negro.

Se le encuentra en la costa.

D. Visitante esporádico de verano. Existen sólo tres registros en Chile: en Arica en 1852, y en playa Punta de Piedra, un poco al norte de la desembocadura del río Aconcagua, en noviembre de 1977 y en enero de 1978; en esta última localidad entre una bandada de *N. phaeopus*.

Becacina ***Gallinago gallinago*** (Linné)
Common Snipe - Bekassine

L. 30 cm. Raya sobre la cabeza y bajo el ojo de color negro; resto de la cabeza color café amarillento. Partes superiores negras variegadas de café amarillento pálido. Coberteras supracaudales con barras negras y café amarillentas. Garganta y abdomen blancos. Pecho variegado con café amarillento. Pico amarillo verdoso con punta negra; patas amarillo verdosas.

Vive en vegas, pantanos y potreros húmedos.

D. Desde Atacama al cabo de Hornos.

Becacina de la puna ***Gallinago andina*** (Taczanowski)
Puna Snipe - Puna-Bekassine

L. 23 cm. Muy parecida a la especie precedente, pero de tamaño menor y con el pico más corto y delgado.

Vive en las planicies y bofedadas de la alta cordillera.

D. Regiones de Tarapacá y Antofagasta.



Zarapito moteado

Becacina





Becacina de la puna

Becacina grande ***Gallinago stricklandii*** (Gray)
Cordilleran Snipe - Cordilleren-Bekassine

L. 35 cm. Coloración general como en las otras becacinas, pero de mayor tamaño y más obscura que la Becacina de la puna.

Vive en zonas boscosas y terrenos turbosos.

D. Desde el cabo de Hornos hasta la provincia de Cautín. Ocasionalmente hasta Concepción. Extinguida en su distribución septentrional.



Becacina grande

POLLITOS DE MAR SUBFAMILIA PHALAROPODINAE

Son aves pequeñas de 19 a 25 cm. de longitud. Las alas son largas y terminadas en punta, la cola es de tamaño moderado y los tarsos moderadamente largos. Los dedos están unidos por una membrana sólo en la parte basal y están provistos de lóbulos. Durante la época de reproducción las hembras tienen un plumaje más vistoso que los machos. Anidan en el suelo, poniendo 4. raramente 3 ó 5 huevos de coloración café verdosa clara con manchas cafés y negras.

Pollito de mar rojizo ***Phalaropus fulicaria*** (Linné)
Red Phalarope - Thorshühnchen

L. 20 cm. Cabeza, cuello y partes inferiores blancas; mancha obscura por delante y debajo del ojo. que se extiende a las mejillas. Partes superiores grises, con algunas plumas más obscuras; alas y cola gris cafesosas; banda blanca en ala poco conspicua. Algunos ejemplares presentan coloración rojo ladrillo en las partes inferiores. Pico corto negro con base amarilla. En plumaje de verano boreal tienen una coloración brillante rojo ladrillo en las partes inferiores.

Es ave esencialmente pelágica, aunque se acerca a las costas en algunas ocasiones.

D. Visitante de verano desde Arica hasta Chiloé. También en las islas Juan Fernández. Un ejemplar capturado en isla Anvers, archipiélago de Palmer. Antartica chilena.

Pollito de mar boreal ***Phalaropus lobatus*** (Linné)
Northern Phalarope - Odinshühnchen

L. 18 cm. Muy parecida a la especie precedente, de la que se distingue por tener el pico largo y delgado y por presentar algo de blanco en las partes superiores. Tiene una banda conspicua en el ala. Es ave pelágica, encontrándose también en playas y riberas de lagos y ríos.

D. Visitante de verano desde Arica hasta Magallanes.

Pollito de mar tricolor ***Phalaropus tricolor*** (Vieillot)
Wilson's Phalarope - Wilsons-Wassertreter

L. 23 cm Parecido a las especies precedentes, de las que se distingue por tener el lomo blanco y por carecer de banda blanca alar; su pico es largo y delgado.

Se le encuentra en la costa y en el interior, sobre todo en lagunas.

D. Es visitante escaso de verano. Observado en Arica, tranque de Caritaya (en la cordillera de Tarapacá). alta cordillera de Antofagasta, Valparaíso, lagos Pirihueico y Ranco y en Magallanes.



Pollito de mar rojizo



Pollito de mar boreal



Pollito de mar tricolor

PERDICITAS — FAMILIA THINOCORIDAE

Son aves de plumaje críptico por encima, de coloración café y amarillo pálido. Tienen las alas largas y puntiagudas y la cola corta. Las patas son muy cortas. Se alimentan principalmente de vegetales e insectos. La nidada es de 3 a 4 huevos de color verde opaco con pintas café.

Perdicita cordillerana — ***Attagis gayi*** Lesson
Rufous-bellied Seedsnipe - Cordillerenläufer

L. 30 cm. Partes superiores gris cafesosas con vermiculaciones negras y blancas y zonas café amarillentas. Por debajo la garganta es amarillo pálida, el pecho café rojizo con vermiculaciones negras concéntricas y vientre café amarillento pálido a obscuro.

Vive en la zona de la puna, en terrenos pantanosos y vegas del fondo de quebradas.

D. Dos subespecies en Chile: la Perdicita cordillerana, *A. g. gayi*, en la zona cordillerana de Antofagasta a Magallanes, y *A. g. simonsi* Chubb, Perdicita cordillerana de Tarapacá. con las partes superiores más obscuras y las vermiculaciones pálidas más restringidas; en la misma zona en Tarapacá

Perdicita cordillerana austral — ***Attagis malouinus*** (Boddaert)
White-bellied Seedsnipe - Magellanläufer

L. 28 cm. Lados de la cabeza, garganta y parte anterior del cuello y pecho blanquecinos, estos últimos manchados de negro. Partes superiores de color café amarillento, con las plumas manchadas y bordeadas de negro. Abdomen blanco. Pico de color café obscuro.

Vive en planicies altas, con turbales y pastos.

D. En cordilleras de Magallanes y Tierra del Fuego.

Perdicita cojón — ***Thinocorus orbignyianus*** (Lesson)
Gray-breasted Seedsnipe - Graukehl-Höhenläufer

L. 20-23 cm. Corona, nuca y partes superiores manchadas de negro, café y amarillo pálido. Lados de la cabeza, cuello y pecho gris; garganta blanca con banda negra en los bordes. Abdomen blanco separado del pecho por banda negra. La hembra es parecida al macho, pero tiene gris en la cabeza; lados del cuello y pecho amarillo pálido con estrías café.

Vive en la alta cordillera. En la parte sur de su distribución en planicies bajas, en terrenos abiertos y matorrales.

D. En nuestro país viven dos subespecies: el Cojón *T. o. orbignyianus*, desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego, y el Cojón del norte, *T. o. ingae* Tschudi, algo más pequeño que la otra subespecie y restringido a la región de Tarapacá.



Perdicita cordillerana

Perdicita cordillerana austral





Perdicita cojón

Perdicita ***Thinocorus rumicivorus*** Eschscholtz
Least Seedsnipe - Zwerghöhenläufer

L. 18.5 cm. Muy parecida a la especie anterior, pero más pequeña y con una banda negra en el centro del pecho. La hembra también es parecida a la del Cojón, pero es más pequeña y más pálida.

Vive en dunas, vegas costeras, desembocaduras de ríos y en pampas áridas del interior y cordillera.

D. En Chile viven tres subespecies: La Perdicita. *T. r. rumicivorus*. desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego; la Perdicita del norte. *T. r. cuneicauda* (Peale), en Tarapacá y Atacama, y la Perdicita boliviana, *T. r. bolivianus Lowe*, en la cordillera de Tarapacá y Atacama y probablemente en la misma zona en Antofagasta.



Perdicita

PALOMAS ANTARTICAS — FAMILIA CHIONIDIDAE

Tienen un parecido superficial con las palomas (Columbidae). Son de plumaje blanco, con la cara parcialmente desnuda, de color carne, con carúncula. Tiene un estuche que cubre la maxila Las alas son moderadamente largas y la cola es corta y algo redondeada. Las patas son cortas y fuertes y los dedos están unidos sólo en la base por una membrana. Son de hábitos alimentarios omnívoros: come pequeños peces, moluscos, crustáceos, huevos y polluelos de aves, algas, líquenes, carroña y fecas. Ponen 2 a 3 huevos blancos manchados de café o negro, en hendiduras de las rocas.

Paloma antártica ***Chionis alba*** (Gmelin)
Snowy Sheathbill - Scheidenschnabel

L. 40 cm. De plumaje enteramente blanco, con la cara desnuda y pico color carne, con punta café y base amarilla. Presenta una especie de estuche que cubre los orificios nasales; patas grises.

Vive en zonas costeras.

D. Desde el estrecho de Magallanes, costas de Tierra del Fuego e islas adyacentes hasta la Antartica chilena, llegando a los 65°S. Migra casualmente hasta Chiloé y Llanquihue



Paloma antartica

SALTEADORES, GAVIOTAS, GAVIOTINES Y RAYADORES — FAMILIA LARIDAE

SALTEADORES — SUBFAMILIA STERCORARIINAE

Tienen hábitos de aves de rapiña, con cuerpo robusto y pico terminado en gancho. Las alas son largas y puntiagudas y la cola es mediana a larga, de forma cuneada, con las plumas centrales alargadas en el género Stercorarius. Las patas son cortas y los dedos, terminados en fuertes garras, están unidos por una membrana. Se alimentan de pequeños mamíferos, huevos, pollos y aves adultas, peces, crustáceos, moluscos y carroña. También piratean su alimento a otras aves. Ponen 2 a 4 huevos café grisáceos con manchas más obscuras.

Salteador chileno — ***Catharacta chilensis*** (Bonaparte)
Chilean Skua - Chilenische - Skua

L. 59 cm. Partes superiores de coloración café grisácea, con pequeñas manchas blanquecinas y ocráceas. Cuello con estrías amarillentas o blanquecinas. Partes inferiores del cuerpo y de las alas de color café amarillento. Mancha blanca en las alas; pico y patas negros.

Vive en la costa; en el extremo sur de su zona de distribución penetra unos pocos kilómetros tierra adentro.

D. Desde Arica hasta islas Diego Ramírez.

Salteador pardo - — ***Catharacta lonnbergi*** (Mathews)
Brown Skua - Braun - Skua

L. 64 cm. Similar a la especie precedente, de coloración general gris cafesosa obscura. En la época reproductiva tiene estrías doradas en el cuello. Mancha blanca en las alas. Pico y patas negros.

Vive en la costa, pero en época no reproductiva es pelágica.

D. En la Antartica chilena, con seguridad hasta los 65° de latitud sur, posiblemente alcanzando los 68º de latitud sur. Migra al norte por las costas de Chile continental.

Salteador polar — ***Catharacta maccormicki*** (Saunders)
South Polar Skua - Mac Cormick - Skua

L. 53 cm. Presenta dos fases de coloración, una clara y otra obscura. La primera tiene las partes superiores café obscuras y las inferiores gris cafesosas pálidas con estrías doradas prominentes en el cuello. En la fase obscura las partes superiores son iguales a la de la otra fase; las partes inferiores son más obscuras, de color café, con las plumas doradas del cuello menos prominentes. Ambas fases con mancha blanca en las alas. Pico y patas negros; estas últimas a veces con algo de blanco.

Vive en zonas costeras y fuera de la época de reproducción migra a aguas subtropicales, incluyendo a Chile continental.

D. En la Artártica chilena, anida hasta la isla Rey Jorge, Shetland del Sur, por el norte.

Salteador chileno

Salteador pardo





Salteador polar

Salteador pomarino ***Stercorarius pomarinus*** (Temminck)
Pomarine Jaeger - Spatelraubmöwe

L. 56 cm. Se caracteriza por tener las plumas centrales de la cola más largas torcidas, con borde redondeado. Presenta dos fases de coloración: una obscura en la cual el ave es enteramente gris obscura, y una clara en que la cara y las partes inferiores son blancas y las partes superiores, banda pectoral y cara inferior de las alas son café obscuras. En ambas fases la corona es negra, el pico café amarillento obscuro y las patas negras.

Es ave casi exclusivamente pelágica.

D. Raro visitante en la Antartica chilena y frente a las costas de Chile.

Salteador chico ***Stercorarius parasiticus*** (Linné)
Parasitic Jaeger - Schmarotzer-Raubmöwe

L. 46 cm. Parecido a la especie precedente, pero más pequeño. Las partes superiores son más pálidas y la banda pectoral es menos notoria; las plumas centrales de la cola, más largas, son puntiagudas. También presenta dos fases de coloración, una obscura y una clara.

Se la encuentra en zonas costeras.

D. Visitante regular de verano desde Arica hasta Tierra del Fuego.

Salteador de cola larga ***Stercorarius longicaudus*** (Vieillot)
Long - tailed Jaeger - Falken-Raubmöwe

L. 50 cm. Similar a la especie anterior. Partes superiores más pálidas. Carece de banda pectoral. Las rectrices centrales son más largas, sobresaliendo bastante del resto de la cola. La fase obscura es rara. Difícil de distinguir de la especie anterior, ya que en la época en que nos visita las plumas centrales de la cola no están alargadas.

D. Visitante raro de verano. Hay unos pocos registros en las cercanías de Valparaíso y en el mar entre este puerto y el archipiélago Juan Fernández.



Salteador pomarino

Salteador chico



Salteador de cola larga

GAVIOTAS — SUBFAMILIA LARINAE

Las gaviotas son de coloración general negra, gris y blanca, con picos y patas de colores más vistosos. Las alas son moderadamente largas y la cola es generalmente cuadrada. Algunas adquieren un capuchón obscuro en la cabeza durante la época de reproducción. El plumaje de los juveniles es diferente al de los adultos, presentando estrias y manchas de color café y gris, con picos obscuros y bandas en la cola. Se alimentan de peces, crustáceos, moluscos y carroña. Ponen 1 a 4 huevos de color generalmente verdosos con manchas caté o negras.

Gaviota austral — ***Larus scoresbii*** Traill
Dolphin Gull - Blutschnabelmöwe

L. 44 cm. De coloración general gris perla, con manto y alas gris obscuras; cola blanca. Pico corto, grueso, de color rojo; patas rojas. En invierno la cabeza se pone obscura. El inmaduro tiene el manto café obscuro; cabeza, cuello y parte alta del pecho café pálido. Partes inferiores blanco amarillentas. Cola con barra subterminal negra. Pico café con punta negra; patas parduscas.

Vive en las costas; a veces en lagunas interiores.

D. Desde el extremo sur hasta Chiloé; casualmente hasta la isla Mocha.

Gaviota garuma — ***Larus modestus*** Tschudi
Grey Gull - Graumöwe

L. 44 cm. De coloración general gris obscura. Primarias negras; punta de las secundarias blancas, formando una banda. Cabeza blanca en verano y café pálido en invierno. Cola gris obscura con ancha banda subterminal negra. Pico y patas negros.

Frecuenta playas arenosas; anida en el desierto, en el norte del país.

D. Desde el extremo norte del país hasta Chiloé. Casualmente hasta el golfo de Penas.

Gaviota peruana — ***Larus belcheri*** Vigors
Simeon Gull - Simeonsmöwe

L. 48,5 cm. Es parecida a la Gaviota dominicana, pero más pequeña. Tiene banda subterminal negra en la cola; patas amarillas y pico amarillo con banda negra y mancha roja en la punta. En plumaje de invierno tiene la cabeza negruzca y el cuello gris claro.

Vive en playas de todo tipo.

D. Desde el límite norte del país hasta Coquimbo.



Gaviota austral

Gaviota garuma





Gaviota peruana

Gaviota dominicana ***Larus dominicanus*** Lichtenstein
Kelp Gull - Dominikaner-M.

L. 58.5 cm. La más grande de nuestras gaviotas, de coloración general blanca, con alas y dorso negros; cola completamente blanca. Pico amarillo con mancha roja cerca de la punta de la mandíbula; patas amarillo verdosas. Los juveniles son gris pardos, manchados con cafesoso, blanco y ocráceo.

Vive en las costas y lagos del interior.

D. En Chile viven dos subespecies: *L. d. dominicanus*, la Gaviota dominicana, desde Arica hasta el cabo de Hornos, y *L. d. austrinus* (Fleming), la Gaviota dominicana antartica, en la Antártica chilena, hasta bahía Margarita por el sur.

Gaviota andina ***Larus serranus*** Tschudi
Andean Gull - Anden-M.

L. 45 cm. Coloración general del cuerpo gris pálida y blanca: cabeza negra. Primarias externas blancas con puntas y barbas internas negras, que forman un área blanca en la punta del ala. Pico y patas carmesí obscuro. En plumaje invernal la cabeza es casi blanca, quedando algunas plumas negras alrededor y detrás del ojo. El joven es pardusco por encima con banda negruzca en la cola.

Vive en las lagunas de la alta cordillera, alcanzando hasta la costa en invierno.

D. Desde Arica hasta Aysen.

Gaviota de Franklin ***Larus pipixcan*** Wagler
Franklin's Gull - Franklin-M.

L. 37 cm. Parecida a la Gaviota andina, pero de menor tamaño. Coloración general blanca y gris perla obscuro en el dorso, con tinte rosado en el pecho y abdomen. La cabeza, que es negra en el verano boreal, es gris cuando nos visita, a excepción de la corona que es negruzca. Las puntas de las primarias y secundarias son blancas; mancha negra en las puntas de las alas. Pico negruzco y patas rojizas obscuras.

Visita la costa y lagos del interior.

D. Desde el extremo norte del país hasta el estrecho de Magallanes.



Gaviota dominicana

Gaviota andina





Gaviota de Franklin

Gaviota cahuil ***Larus maculipennis*** Lichtenstein
Brown - hooded Gull - Patagonien-Möwe

L. 42 cm. De coloración general gris perla y blanca. En verano tiene la cabeza de color café-obscuro y en invierno es blanca con grisáceo en la nuca. Manto gris perla y partes inferiores blancas con tinte rosado. Las coberteras externas del ala y las primarias externas son blancas, alguna de éstas con barbas internas parcialmente negras. Pico rojo obscuro y patas rojizas más obscuras en invierno.

Vive en la costa y en lagunas cercanas al mar.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego.

Gaviota de Sabine ***Xema sabini*** (Sabine)
Sabine's Gull - Schwalben-M.

L. 33 cm. Es la más pequeña de las gaviotas que nos visita. La cabeza es gris pizarra, con un delgado collar negro alrededor del cuello. Cuello y partes inferiores blancas. Manto y coberteras alares gris perla, primarias negras con punta blanca; triángulo blanco en alas desplegadas. Cola ahorquillada blanca. Pico negruzco con punta amarilla. En nuestro verano tiene sólo la nuca obscura. El juvenil tiene las partes superiores cafesosas y cola blanca ahorquillada con banda terminal cafesosa.

Se le encuentra cerca y lejos de la costa.

D. Desde Arica hasta Talcahuano

Gaviota de las Galápagos. ***Creagrus furcatus*** (Néboux)
Swallow-tailed Gull - Gabelschwanz-M.

L. 51 cm. Una gaviota grande, con cabeza gris obscura y un parche blanco en la base del pico. Partes superiores gris claras. Triángulo negro en la punta de las alas. Partes inferiores blancas. Cola ahorquillada blanca; pico gris verdoso con punta pálida. Patas rosadas. En el verano nuestro la cabeza es blanquecina con anillo grisáceo alrededor del ojo y cuello.

Se la encuentra en alta mar.

D. Mar afuera desde Arica hasta frente a Algarrobo (región de Valparaíso).



Gaviota cahuil

Gaviota de Sabine





Gaviota de las Galápagos

GAVIOTINES — SUBFAMILIA STERNINAE

Los gaviotines son de cuerpo esbelto con alas largas y terminadas en punta y cola ahorquillada. Las patas son cortas. Se alimentan de pequeños peces y crustáceos. También comen insectos. Anidan en sitios muy diversos. La nidada varía entre 2 y 3 huevos, en algunos casos uno solo. Son de color gris a café con manchas café obscuras y gris claras.

Gaviotín negro — ***Chlidonias niger*** (Linné)
Black Tern - Trauerseeschwalbe

L. 25,5 cm. Cabeza y cuerpo blancos; alas, dorso y cola gris obscuros. Nuca gris y raya negra detrás del ojo. En el verano boreal, cabeza y cuerpo negros, con las subcaudales blancas.

Vive en la costa y en el interior, en lagunas, lagos y ríos.

D. En Chile un solo registro: en una laguna cercana a Santiago.

Gaviotín sudamericano — ***Sterna hirundinacea*** Lesson
South American Tern - Falkland-Seeschwalbe

L. 43 cm. Es el más común en nuestras costas. Las partes superiores son gris pálidas y las inferiores blancas; corona y nuca negras. Cola muy ahorquillada, más larga que las alas cuando están plegadas. Pico y patas rojo coral. En invierno es similar, pero sólo la nuca es negra.

Vive en costas y estuarios.

D. Desde Arica hasta el cabo de Hornos.

Gaviotín boreal — ***Sterna hirundo*** Linné
Common Tern - Fluss-S.

L. 41 cm. Muy parecida a la especie precedente, pero algo más pequeña. Pico rojo coral. Cola más corta que las alas plegadas. En nuestro verano tiene la frente y la parte anterior de la corona blanca y pico negruzco con la base a veces rojiza; patas anaranjadas.

En costas de todo tipo.

D. Casual en todo Chile.



Gaviotín negro

pr.

Gaviotín sudamericano



pr.



Gaviotín boreal

pr.

Gaviotín ártico ***Sterna paradisaea*** Pontoppidan
Artic Tern - Küsten-S.

L. 38 cm. Visitante regular de verano. Partes superiores e inferiores gris pálidas. Lomo blanco. Cabeza con región ocular y nuca negras. Pico negro y patas rojo coral. Cola muy ahorquillada, ligeramente más larga que las alas cerradas. En plumaje de verano, cuando está en el Hemisferio Norte, tiene la frente, corona y nuca negras; pico rojo sangre.

Se le encuentra en las costas y en alta mar.

D. En toda la costa chilena. También en Juan Fernández. En la Antartica chilena es común en verano.

Gaviotín antártico ***Sterna vittata*** Gmelin
Antarctic Tern - Antipoden-S.

L. 38 cm. Partes superiores e inferiores grises. Lomo blanco. Frente, corona y nuca negras. Cola muy ahorquillada, casi completamente blanca, lo que la diferencia del Gaviotín ártico, que tiene las barbas externas de las restrices exteriores grises. Pico bermellón y patas rojo anaranjadas. En la Antartica se diferencia de paradisaea, porque ésta tiene la frente blanca.

Vive en las costas.

D. En la Antártica chilena, hasta a lo menos los 68° de latitud sur. Posiblemente en las costas del extremo sur de Chile continental.

Gaviotín piquerito
Snowy-crowned Tern - Weisskopf-S. ***Sterna trudeaui*** Audubon

L. 36 cm. Coloración general gris clara, con cabeza blanca y línea negra a través del ojo. Lomo blanco. Pico amarillo con banda subterminal negra; patas anaranjadas. En invierno tiene el manto moteado con café.

En la costa y en lagunas interiores; también en ríos.

D. Desde Tarapacá hasta el estrecho de Magallanes.



Gaviotín ártico



Gaviotín antártico



Gaviotín piquerito

Gaviotín de bridas ***Sterna anaethetus*** Scopoli
Bridled Tern - Zügel-S.

L. 35,5 cm. Frente y ceja sobre el ojo blancas; bridas, corona, nuca y auriculares negras. Parte posterior del cuello blanquecina y resto de las partes superiores gris cafesoso ahumado. Partes inferiores blanca; cola muy ahorquillada, con las rectrices externas blancas. Las centrales del mismo color de la espalda. Pico y patas negros.

Vive cerca de la costa y en alta mar.

D. Un solo registro en Chile: a 75 millas al sur del cabo de Hornos.

Gaviotín apizarrado ***Sterna fuscata*** Linné
Sooty Tern - Russ-S.

L. 40 cm. Parecida a la especie precedente, de la que se diferencia por tener coloración café más obscura en las partes superiores y la zona blanca llega sólo hasta sobre el ojo. La parte posterior del cuello es obscura. Pico y patas negros.

Son principalmente aves pelágicas.

D. Aguas vecinas a las islas de Pascua, San Félix y San Ambrosio y archipiélago Juan Fernández. Además en Caldera, Coquimbo, Corral y frente a Valparaíso.

Gaviotín pascuense ***Sterna lunata*** Peale
Gray-backed Tern - Brillen-S.

L. 35,5 cm. Parecido al Gaviotín de bridas. Las partes superiores son grisáceas y las inferiores blancas. Pico y patas negros.

Frecuenta aguas costeras y pelágicas.

D. En aguas de la isla de Pascua y posiblemente en isla Sala y Gómez.

Pato anteojillo

Perrito

Paloma antártica

Salteador de cola larga



Gaviotín de bridas



Gaviotín apizarrado



Gaviotín pascuense

Gaviotín chico ***Sterna lorata*** Philippi y Landbeck
Peruvian Tern - Peru-S.

L. 24 cm. Es el más pequeño de los gaviotines que se encuentran en Chile. Es de coloración general gris, con parte media de la corona y nuca negra. Pico amarillo con la punta y el culmen negros y patas amarillo anaranjadas.

Vive en aguas costeras.

D. Desde Arica hasta Antofagasta.

Gaviotín elegante ***Sterna elegans*** Gambel
Elegant Tern - Schmuck-S.

L. 40 cm. Se podría confundir con el gaviotín sudamericano, pero es de mayor tamaño y con un moño negro en la cabeza aun en plumaje de invierno. Pico largo, anaranjado y patas negras. En nuestro verano la frente y la corona son blancas.

En aguas costeras.

D. Visitante del Hemisferio Norte, desde Arica hasta Puerto Montt.

Gaviotín de Sandwich ***Sterna sandvicensis*** Latham
Sandwich Tern - Brand-S.

L. 40 cm. Es muy parecido a la especie precedente, pero se le identifica por el pico negro con punta amarilla.

Vive en aguas costeras.

D. Dos registros en Chile: en playa La Lisera, Arica y en península de Tumbas, Región del Biobío.



Gaviotín chico

Gaviotín elegante





Gaviotín de Sandwich

Gaviotín monja ***Larosterna inca*** (Lesson y Garnot)
Inca Tern - Inka-S

L. 40 cm. Es de coloración general gris pizarra azulada, con pico y patas rojas. A ambos lados de la cabeza tiene una franja de plumas blancas que empieza en la comisura y se dirige hacia atrás y abajo, formando una especie de mostacho. En los juveniles esta franja es gris. Sólo puede ser confundida en invierno con la Gaviota gamma, que no tiene el mostacho y cuyo pico y patas son negros.

Vive en aguas costeras.

D. Desde Arica hasta Corral.

Gaviotín de San Félix ***Anous stolidus*** (Linné)
Brown Noddy - Noddi-S.

L. 38 cm. Coloración general café apizarrada obscura. Frente y región superciliar blancas, que pasa al grisáceo en la corona. Raya negra que va del pico al ojo. Primarias y cola gris obscuras, casi negras. Pico negro y patas negro parduscas con membrana amarilla. Cola graduada, no ahorquillada.

En aguas costeras y pelágicas.

D. En las islas de Pascua, San Félix y San Ambrosio y Sala y Gómez, en las que nidifica.

Gaviotín albo ***Gygis alba*** (Sparrman)
White Tern - Feen-S.

L. 31 cm. Completamente blanco, con un anillo periocular negro; pico y patas negros

Se encuentra en aguas costeras y pelágicas.

D. En isla de Pascua y posiblemente en la isla Sala y Gómez.



Gaviotín monja



Gaviotín de San Félix



Gaviotín albo

Gaviotín de San Ambrosio ***Procelsterna cerulea*** (Bennett)
Gray Ternlet - Blau-Noddi

L. 29 cm. Es de coloración general gris azulada; anillo periocular negro por delante y blanco por detrás. Pico negro y patas negras con membranas amarillas.
En islas y mares adyacentes.

D. Islas de Pascua. San Félix y San Ambrosio. Sala y Gómez y en aguas del archipiélago Juan Fernández.

RAYADORES SUBFAMILIA RYNCHOPINAE

Son de coloración obscura en las partes superiores y blanca o blanquecina en las inferiores. El pico, de coloración vistosa, tiene la maxila y mandíbula comprimidas lateralmente, siendo la maxila mucho más corta. Las alas son largas y puntiagudas y la cola es corta y ahorquillada. Las piernas son muy cortas y las patas pequeñas. Con la mandíbula sumergida en el agua, capturan sus presas mientras vuelan. Se alimentan de peces y pequeños crustáceos. Ponen en una depresión en la arena 2 a 5 huevos blanco cremosos con manchas grises y café.

Rayador ***Rynchops niger*** Linné
Black Skimmer - Schwarzmantel-Scherenschnabel

L. 58 cm. De coloración general blanca y negra; tiene las alas largas y angostas. El pico es aplanado lateralmente; la mandíbula es más larga que la maxila y es de color rojo en la parte proximal, y negro en la distal La cola es algo ahorquillada.
Vive en la costa y en ríos.

D. Visitante regular de verano, desde Arica hasta el estrecho de Magallanes.



Gaviotín de San Ambrosio

Rayador



PALOMAS Y TORTOLAS — FAMILIA COLUMBIDAE

Aves de cabeza pequeña y cuello más bien corto, con alas de dimensiones variables, cola mediana a larga, terminada en punta o truncada. El plumaje tiene reflejos metálicos, especialmente en el cuello y alas. Comen semillas y frutos diversos. Algunas pocas especies comen también gusanos y caracoles. Anidan en árboles o en el suelo y ponen de 1 a 3 huevos blancos.

Paloma — ***Columba livia*** Gmelin
Rock Dove - Felsentaube

L. 36 cm. Es la paloma doméstica, tan común en parques y jardines de nuestras ciudades. Su coloración es muy variada, con iridiscencia en el plumaje. El plumaje típico es gris con lomo blanco y banda negra terminal en la cola.

D. En Chile se la ha encontrado en estado silvestre en la isla Robinson Crusoe (archipiélago Juan Fernández) y en las Vegas de Chañaral Alto (en la provincia de Chañaral).

Torcaza — ***Columba araucana*** Lesson
Chilean Pigeon - Araukaner-T.

L. 37 cm. Es de coloración general vinoso castaña, con semianillo blanco en la nuca y debajo de éste una mancha verde con bronceado metálico; cola gris obscura con ancha banda subterminal negra; ojos anaranjados; pico negro y patas rojo púrpura.

La hembra es de coloración más obscura y menos vistosa.

D. Desde Atacama (Vallenar) hasta la península de Taitao.

Paloma de alas blancas — ***Zenaida asiatica*** (Linné)
White-winged Dove - Weissflügel-T.

L. 31 cm. Es una paloma de coloración general grisácea, con franja blanca en las alas. Pico negro, patas rojas y zona desnuda alrededor del ojo azul cobalto.

Vive en terrenos arbolados, parques y plantaciones.

D. Valles y oasis de Tarapacá, tamarugales del salar de Pintados y Quillagua. También en Copiapó.



Paloma



Torcaza



Palomas de alas blancas

Tórtola ***Zenaida auriculata*** (Des Murs)
Eared Dove - Ohrfleck-T.

L. 26 cm. La más común de las aves de caza de nuestro país. Es de coloración gris pardusca rosada, con manchas negras en la cabeza y alas; la cola es moderadamente larga y tiene las puntas de las plumas externas blancas; pico negro y patas rojo coral.

Vive en la costa, valles y cordilleras hasta 2.000 metros.

D. En Chile se encuentran dos subespecies: la Tórtola, *Z. a. auriculata*, desde Tarapacá hasta Tierra del Fuego, y la Tórtola peruana, *Z. a. hypoleuca* (Bonaparte), algo más pequeña, en quebradas de Arica, Camarones, Chaca, Quillagua y tamarugales del salar de Pintados (Tarapacá).

Tortolita rojiza ***Columbina talpacoti*** (Temminck)
Ruddy Ground-Dove - Rot-Täubchen

L. 17 cm. Las partes superiores son canela rojizas, con corona y nuca plomo azuladas. Las partes inferiores son café amarillentas. Las alas tienen manchas transversales negras; las plumas centrales de la cola amarilla anaranjadas. Patas rosadas carne. La hembra es más plomiza y la corona y nuca son del mismo color del dorso.

Vive en terrenos arbustivos.

D. Accidental en Chile. Un registro en Angol, provincia de Malleco, y otro cerca de Rancagua, provincia de Cachapoal.

Tortolita cuyana ***Columbina picui*** (Temminck)
Picui Ground-Dove - Picui-T.

L. 18 cm. Es de coloración café grisácea por encima y vinoso pálido por debajo, con frente blanquecina y corona gris. Garganta, bajo abdomen y subcaudales blancas. En el ala presenta una banda transversal azul metálica; al volar muestra ribete blanco a los lados y en la punta de la cola, como la Tórtola. Pico negro, patas rosadas e iris lila.

Vive en terrenos planos y faldeos de cerros bajos y en chacras, jardines, huertos frutales y viñas.

D. Desde la provincia de Copiapó hasta la de Malleco, ocasionalmente en Valdivia.

Tórtola

Tortolita rojiza

Tortolita cuyana

Tortolita quiguagua ***Columbina cruziana*** (Knip y Prévost)

Croaking Ground-Dove - Goldschnabel-Täubchen

L. 18 cm. Del mismo tamaño y muy parecida a la especie precedente, de la que se diferencia por ser de coloración más pálida. Barrita en las alas de color escarlata a escarlata anaranjado y manchas negras. Pico amarillo en la base y negro en la punta; patas anaranjado pálido.

Vive en matorrales y jardines.

D. En valles y oasis de Tarapacá.

Tortolita boliviana ***Metriopelia ceciliae*** (Lesson)

Bare-faced Dove - Nacktgesicht-T.

L. 17.5 cm. Partes superiores café grisáceas, con lomo y coberteras alares con manchas blanco sucio; piel desnuda alrededor del ojo rojo anaranjado. Garganta blanca, pecho leonado y resto de las partes inferiores café amarillento pálido. Plumas externas de la cola negruzcas con puntas blancas. Patas rosadas.

Vive en las cordilleras del extremo norte del país, entre 2.000 y 4.000 metros, en campos cultivados y pastizales.

D. En Tarapacá.

Tortolita de la puna ***Metriopelia aymara*** (Knip y Prévost)

Golden-spotted Ground-Dove - Aymara-T.

L. 17.5 cm. De coloración general café grisácea, con un tinte vinoso en las partes interiores. Las coberteras alares presentan manchas de color bronce dorado. Las primarias son negras con café rojizo en la base; patas rosado pálido. Al volar se advierte una mancha cobriza en la cara inferior de las alas.

Vive en la zona de la puna.

D. Tarapacá a los Baños del Toro, en la provincia de Elqui (Coquimbo).



Tortolita quiguagua

Tortolita boliviana





Tortolita de la puna

Tórtola cordillerana ***Metriopelia melanoptera*** (Molina)
Black-winged Ground Dove - Weissbugtäubchen

L. 23 cm. De coloración general pardo grisácea con ligero tinte oliváceo; cola y alas negras y mancha blanca en el doblez del ala; parte desnuda del ojo anaranjada. Pico y patas negros.

Vive en la cordillera.

D. Desde Tarapacá hasta Aysen.



Tórtola cordillerana

LOROS — FAMILIA PSITTACIDAE

Tienen generalmente el plumaje brillante y vistoso. El pico es corto y muy ganchudo. Son de costumbres arbóreas y se ayudan del pico para trepar. Tienen las patas con dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás. Se alimentan de frutos, granos y otros vegetales. Anidan en huecos de troncos o en barrancos, poniendo entre 1 y 12 huevos blancos.

Tricahue — ***Cyanoliseus patagonus*** (Vieillot)
Burrowing Parrot - Felsen-Sittich

L. 45 cm. Partes superiores café oliváceas, lomo amarillo; cabeza café olivácea con línea gris en la base de la frente. Por debajo café grisáceo con banda blanquecina y abdomen amarillo con centro rojo; primarias azules; piernas amarillas. Cola larga del mismo color del dorso. Pico gris obscuro; patas rojizo pálidas.

Vive en regiones boscosas al pie de las cordilleras.

D. Desde Atacama hasta Valdivia. Extinguida en su distribución meridional.

Cachaña — ***Enicognathus ferrugineus*** (Müller)
Austral Parakeet - Smaragd-S.

L. 35 cm. De coloración general verde obscura; alas verdes con tonalidad azul metálica; plumas de la corona y parte superior del cuerpo ribeteadas de negro; frente y bridas pardo rojizo; mancha roja obscura en el centro del abdomen, cola roja obscura.

Vive en zonas boscosas.

D. En Chile dos subespecies: la Cachaña, *E. f. minor* (Chapman). desde Colchagua hasta Aysen. y la Cachaña austral. *E. f. ferrugineus*, de tamaño un poco mayor, en zona del estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.

Choroy — ***Enicognathus leptorhynchus*** (King)
Slender-billed Parakeet - Langschnabel-S.

L. 41 cm. De coloración general verde obscura, muy parecida a la especie precedente, pero de mayor tamaño. Frente, bridas y anillo que rodea la parte desnuda alrededor del ojo de color rojo anaranjado; mancha roja en el abdomen poco conspicua; cola roja obscura.

Vive en zonas boscosas.

D. Desde la región de Valparaíso hasta la región de Aysen.



Tricahue

Cachaña



Choroy

Perico cordillerano ***Bolborhynchus aurifrons*** (Lesson)
Mountain Parakeet - Zitronen-S.

L. 18,5 cm. De coloración general verde clara, con leve tinte azulado o amarillento en garganta, pecho, abdomen y subcaudales. Alas azulejas, cola verde azuleja. Rayita amarillenta en el borde de la frente poco conspicua; pico rosado o córneo claro y patas color carne

Vive en las cordilleras.

D. En nuestro país viven dos subespecies; el Perico cordillerano, *B. a. rubrirostris* Burmeister, en las cordilleras de Santiago, y el Perico cordillerano del norte, *B. a. margaritae* Berlioz y Dorst, con raya amarilla de la frente notable y tinte amarillento en las partes inferiores. Su distribución está restringida a Tarapacá y Antofagasta.

CUCLILLOS — FAMILIA CUCULIDAE

Los cuclillos son aves sudamericanas que viven principalmente en los bosques y matorrales de la zona tropical. La mayoría son de coloración obscura y su cola es casi siempre larga y graduada. En Chile se encuentran sólo dos especies en el extremo norte del país. Ponen de 2 a 6 huevos blancos, azules, verdes, rojos o café, manchados a veces.

Cuclillo de pico negro ***Coccyzus melacoryphus*** Vieillot
Dark-billed Cuckoo - Galapagos-Kuckuck

L. 26,5 cm. Parte superior de la cabeza gris obscura; línea negra a través del ojo. Lados del cuello y pecho gris claro. Partes superiores café grisáceas; partes inferiores color café amarillento claro. Cola larga con plumas centrales como el dorso, las restantes son negras con puntas blancas. Pico negro y patas oliva obscuro.

Vive en valles cultivados.

D. Valles de Lluta y Azapa. Arica.

Matacaballos ***Crotophaga sulcirostris*** Swainson
Groove-billed Ani - Riefenschnabel-Ani

L. 32 cm. Completamente negro, de cola muy larga y pico alto y grueso, con surcos longitudinales.

Vive en totorales, parques y praderas, de preferencia cerca del agua y del ganado.

D. Valles cercanos a Arica. Pica, quebrada de Tarapacá y Peine, al S. E. del salar de Atacama.



Perico cordillerano



Cuclillo de pico negro



Matacaballos

LECHUZAS — FAMILIA TYTONIDAE

Las lechuzas son aves de hábitos nocturnos. Tienen el plumaje suave, la cola corta y la cabeza grande, en la que se destacan los ojos dirigidos hacia adelante y colocados en medio de un disco facial. El pico, con cera en la base, es corto y curvo. Se alimentan de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos. Anidan en edificios, pero a falta de éstos, en cuevas o cavidades de árboles, poniendo de 3 a 11 huevos blancos algo brillosos.

Lechuza — ***Tyto alba*** (Scopoli)

Barn Owl - Schleiereule

L. 38 cm. Disco facial blanco, con borde obscuro. Partes superiores café amarillento claro o café negruzco con manchas blancas. Partes inferiores blancas a café amarillento obscuro, con manchas más obscuras. Primarias y cola con barras café amarillento y negras.

Vive en el campo y en las ciudades.

D. Desde Arica hasta isla Navarino



Lechuza

BUHOS — FAMILIA STRIGIDAE

Son aves nocturnas o crepusculares, con excepción del Pequén. Al igual que las lechuzas, tienen los ojos grandes y dirigidos hacia adelante. Sus hábitos alimentarios son como los de las lechuzas. Anidan en árboles o en cuevas en el suelo, poniendo 1 a 7 huevos blancos.

Tucúquere — ***Bubo virginianus*** (Gmelin)
Great Horned Owl - Virginia-Uhu

L. 49 cm. Reconocible por su gran tamaño y por los penachos de la zona auricular. La coloración general es castaño grisácea, mezclada con gris obscuro por encima y de color amarillo obscuro con bandas transversales negras por debajo. Parche blanco en la parte inferior de la garganta.

Hay ejemplares más claros.

Vive en todos los bosques y renovales, excepto en la zona del desierto, en la que se encuentra en las quebradas aguadas de la cordillera.

D. Desde Arica hasta el cabo de Hornos.

Chuncho del norte — ***Glaucidium brasilianum*** (Gmelin)
Ferruginous Pygmy Owl - Strichelkauz

L. 18 cm. Partes superiores parduscas con manchas y líneas blancas; inferiores blancas con líneas longitudinales pardas. Cola con bandas transversales blancas; manchas negras con borde blanco a cada lado detrás de la cabeza.

Vive en lugares arbolados y en playas y parques.

D. En Tarapacá (hasta caleta Buena).

Chuncho — ***Glaucidium nanum*** (King)
Austral Pygmy Owl - Araukaner-K.

L. 20 cm. Similar a la especie precedente, de la que se diferencia por las bandas transversales de la cola, que son de color castaño en vez de blancas. Pico y patas amarillos.

Vive en bosques y en las cordilleras, hasta 2.000 m.s.n.m.

D. Desde Tarapacá hasta Tierra del Fuego.



Tucúquere

Chuncho del norte



Chuncho

Nuco ***Asio flammeus*** (Pontoppidan)
Short-eared Owl - Sumpfohreule

L. 42 cm. Partes superiores crema y café negruzco e inferiores crema amarillento con estrías longitudinales castaño obscuro. Garganta blanca. Piernas y tarsos crema amarillento Anillo negro alrededor de los ojos; iris amarillo.

Vive en vegas y terrenos bajos, pajonales de lagunas y terrenos pantanosos.

D. Desde Vallenar (provincia de Huasco) hasta Tierra del Fuego. También en isla Robinson Crusoe (archipiélago Juan Fernández).

Pequén ***Athene cunicularia*** (Molina)
Burrowing Owl - Kanincheneule

L. 26 cm. Es de hábitos diurnos y tiene las patas largas. Las partes superiores son de color café con manchas crema. Pecho, abdomen y flancos de color blanco crema con barras café. Calzones y tarsos emplumados de color café claro. Pico amarillo pálido y patas grises.

Vive en terrenos arenosos de la zona de la costa y en faldeos con poca vegetación de la precordillera.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Pequén. *A. c. cunicularia*, desde Pica (Tarapacá) hasta Valdivia (región de los Lagos), extinguido en Magallanes, y el Pequén de Arica. *A. c. nanodes* (Berlepsch y Stolzmann), restringida a los alrededores de Arica. Es un poco más pequeña que la otra subespecie (L. 24 cm).

Concón ***Strix rufipes*** King
Rufous-legged Owl - Rotfusskauz

L. 38 cm. Cabeza negra, garganta blanquecina y collar del cuello acanelado. Partes superiores de color negro pardusco con barras transversales blanco amarillentas. Las inferiores son iguales, pero de tonos más claros, sobre todo en el abdomen, que tiene las barras de un blanco sucio. Calzones de color ocre.

Vive en bosques y selvas.

D. En Chile viven dos subespecies: el Concón. *S. r. rufipes*, desde Santiago hasta Tierra del Fuego, y el Concón de Chiloé. *S. r. sanborni* Wheeler, algo más pequeño, que vive en la isla de Chiloé (L. 35,5 cm).



Nuco

Pequén



Concón

GALLINAS CIEGAS — FAMILIA CAPRIMULGIDAE

Las gallinas ciegas son aves de hábitos nocturnos y crepusculares que se alimentan de insectos que capturan al vuelo. Tienen los ojos grandes. El pico corto, ancho en la base, está provisto de cerdas rictales. Las patas son muy cortas. El plumaje es críptico. Anidan en el suelo poniendo I a 2 huevos blanco sucio.

Gallina ciega peruana ***Chordeiles acutipennis*** (Hermann)
Lesser Nighthawk - Texas-Nachtschwalbe

L. 18,5 cm. Es de color gris arena, manchado de ocre, pardo, gris y blanco. Garganta y mancha alar blanca. Pico negro muy pequeño. La banda alar de la hembra es color café amarillento.

Vive en zonas litorales áridas.

D. Dos registros solamente: uno en Chacalluta, cerca de Arica, y otro en Quillagua, en la provincia de Tocopilla.

Gallina ciega ***Caprimulgus longirostris*** Bonaparte
Band-winged Nightjar - Spiegel-N.

L. 21-25 cm. Se distingue de la especie anterior por su coloración café, más obscura, pico más largo y cerdas largas en la región bucal.

Vive en bosques no muy densos, zonas de matorrales y ciudades.

D. En Chile se encuentran tres subespecies: la Gallina ciega, *C. l. bifasciatus* Gould. desde Atacama hasta las islas Guaitecas. en la provincia de Aysen; la Gallina ciega de la puna, *C. l. atripunctatus* (Chapman). más pequeña que la raza anterior y de plumaje café más obscuro, en la zona de la puna de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, y la Gallina ciega de Tarapacá, *C. l. decussatus* Tschudi, similar en tamaño a atripunctatus y de plumaje mucho más pálido, en Azapa, provincia de Arica, y Quillagua, provincia de Tocopilla.



Gallina ciega peruana

Gallina ciega



VENCEJOS — FAMILIA APODIDAE

Los vencejos son muy buenos voladores, alimentándose de insectos mientras vuelan. El cuerpo es muy compacto, con las alas largas y angostas. El pico es corto y ancho en la base y las patas son extremadamente cortas. Los nidos los construyen con material vegetal unido por saliva. Ponen 1 a 6 huevos blancos.

Vencejo de chimenea — ***Chaetura pelagica*** (Linné)
Chimney Swift - Schornsteinsegler

L. 14 cm. Partes superiores café ahumado obscuro; partes inferiores más claras y garganta aún más clara. Alas largas y angostas de color gris ahumado obscuro. Cola cuadrada con espinas rígidas formadas por los raquis que se proyectan más allá del margen de los vexilos.

Visitante de verano, se lo ve en campos cultivados, en mayor número en la mañana y crepúsculo.

D. En el valle de Lluta, cerca de Arica, y posiblemente en Calama (provincia de El Loa) y Vallenar (provincia de Huasco).

Vencejo chico — ***Aeronautes andecolus*** (d'Orbigny y Lafresnaye)
Andean Swift - Andensegler

L. 13 cm. Partes superiores café con banda blanca detrás de la cabeza y en el lomo. Partes inferiores blancas con banda obscura en el pecho; alas más largas que la de la especie precedente.

Vive en las vertientes andinas y a veces alcanza la costa.

D. En Arica, quebrada de Camarones, y en Chusmisa, cordillera de Tarapacá.

Vencejo de chimenea

Vencejo chico



PICAFLORES FAMILIA TROCHILIDAE

Estas aves se caracterizan por el brillante colorido e iridiscencia del plumaje. Son excelentes voladores y mueven las alas a gran velocidad, sobre todo cuando permanecen inmóviles frente a una flor. Pueden volar hacia atrás y en cualesquiera dirección, cambiando de rumbo con toda facilidad y extremada rapidez. Viven en toda clase de ambientes: en desiertos, bosques y terrenos abiertos, desde el nivel del mar hasta la línea de las nieves en la cordillera. Ponen 1 ó 2 huevos blancos.

Picaflor de la puna ***Oreotrochilus estella*** (d'Orbigny y Lafresnaye)
Andean Hillstar - Anden-Kolibri

L. 13 cm. Partes superiores de color gris obscuro oliváceo con suave brillo verdoso. Garganta y parte anterior del cuello de un verde claro con brillo fuerte y banda negra con brillo azulado en la parte inferior. Pecho y abdomen blancos, con banda longitudinal angosta de color café. La cola es verde obscura en el centro y el resto blanca en su mayor parte. Pico negro y apenas encorvado. La hembra tiene las partes superiores igual al macho y por debajo es de color café claro; la garganta es blanquecina con pequeñas manchas café.

Vive en laderas rocosas a alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m.

D. Cordilleras de la zona de Tarapacá y Antofagasta hasta Toconao, provincia de El Loa.

Picaflor cordillerano ***Oreotrochilus leucopleurus*** Gould
White-sided Hillstar - Weissflanken-K.

L. 13 cm. Muy parecido a la especie precedente. La zona verde de la garganta y parte anterior del cuello es menos extensa que en O. estella; la banda longitudinal del pecho y abdomen es azul. La hembra es también parecida a la de estella. La garganta tiene pequeñas manchas redondas de color verde brillante.

Vive en las cordilleras, entre alturas de 1.500 a 3.500 m.s.n.m.

D. Desde el sur de la provincia de Antofagasta hasta la laguna del Laja, provincia de Biobío y en Aysen. Debe encontrarse en localidades intermedias.

Picaflor gigante ***Patagona gigas*** (Vieillot)
Giant Hummingbird - Riesen-K.

L. 21-24 cm. Partes superiores gris verdosas con brillo metálico, con algo de blanco en el lomo; partes inferiores rojizas. Ambos sexos muy parecidos, pero el macho es más grande.

Vive en terrenos arbolados o arbustivos.

D. En Chile tenemos dos subespecies: el Picaflor gigante, *P. g. gigas*, desde Atacama hasta Arauco y ocasionalmente hasta Valdivia, y el Picaflor gigante del Norte, *P. g. peruviana* Boucard, en la cordillera de Tarapacá, algo más grande que la otra raza y con la coloración inferior rojo ladrillo.



Picaflor de la puna

Picaflor cordillerano





Picaflor gigante



Picaflor ***Sephanoides galeritus*** (Molina)
Green-backed Firecrown - Chile-K.

L. 11 cm. Partes superiores verdes con brillo bronceado. Por debajo es gris cafesoso con pecas cafesosas y con verde bronceado en los flancos. Parte superior de la cabeza rojo anaranjado iridiscente. La hembra es algo más pequeña que el macho y carece de iridiscencia en la parte superior de la cabeza, que es del mismo color del dorso y es menos manchada en las partes inferiores. Sólo podría confundirse con el Picaflor cordillerano, el que no tiene la mancha brillante sobre la cabeza.

Vive en bosques y parques.

D. Desde el valle del río Huasco hasta Tierra del Fuego. También en la isla Robinson Crusoe, del archipiélago Juan Fernández.

Picaflor de Juan Fernández ***Sepnanoides fernandensis*** (King)
Juan Fernández Firecrown - Juan Fernández-K.

L. 13 cm. De coloración general ladrillo obscuro, con la parte superior de la cabeza de color rojo dorado brillante. La hembra tiene las partes superiores verde brillante, con la parte de encima de la cabeza verde azulado metálico. Partes inferiores blancas, con garganta y flancos moteados con pecas verdes brillantes, más densas en la garganta.

Vive en jardines y matorrales.

D. Hay dos subespecies: el Picaflor de Juan Fernández. *S. f. fernandensis*, en la isla Robinson Crusoe. del archipiélago Juan Fernández, y el Picaflor de Más Afuera, *S. f. leyboldi* (Gould), en la isla Alejandro Selkirk. del mismo archipiélago. Este último se diferencia de la otra subespecie porque en el macho el rojo dorado brillante de la cabeza llega hasta la parte posterior del cuello y en la hembra las partes superiores y las manchitas de la parte inferior son de color verde dorado.

Picaflor del norte ***Rhodopis vesper*** (Lesson)
Oasis Hummingbird - Atacama-K.

L. 13,5 cm. Por encima es verde oliva brillante, con mancha café rojiza en el lomo. Garganta rojo rosa con brillo amatista y brillo azul en partes laterales e inferiores. Por debajo es de un blanco sucio. El pico es largo y algo curvado y la cola es ahorquillada. La hembra no tiene la iridiscencia en la garganta. Las partes inferiores son de color café blanquecino y las rectrices externas tienen una banda subterminal negro azulado, que contrasta con las puntas blancas.

Vive en los oasis de la región desértica.

D. Dos razas en nuestro país: el Picaflor del Norte. *R. v. vesper*, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta (Calama) hasta los 3.500 m.s.n.m., y el Picaflor de Atacama, *R. v. atacamensis* (Leybold), en Caldera, valle del río Copiapó y en Las Bombas y Barquito, en la provincia de Chañaral. Es más pequeño que la otra subespecie (L. 12 cm.).

Aguilucho

Pilpilén negro

Gaviotín monja



Loica



Picaflor

Picaflor de Juan Fernández





Picaflor del norte

Picaflor de Cora ***Thaumastura cora*** (Lesson y Garnot)
Peruvian Sheartail - Cora-K.

L. 13 cm. Partes superiores verde brillante; garganta violeta rosácea brillante. Partes inferiores con pecho blanco y el resto grisáceo con verde en los flancos. Cola muy larga. La hembra es más pequeña. Por encima de coloración igual al macho; partes inferiores blancas, con cola normal con puntas blancas.

Vive en oasis y quebradas con vegetación en zonas desérticas.

D. Un solo registro en Chile: en Azapa. Arica.

Picaflor de Arica ***Eulidia yarrellii*** (Bourcier)
Chilean Woodstar - Yarrel-K.

L. 8 cm. Partes superiores de color verde oliva metálica; garganta rojo púrpura. Resto de la parte inferior blanco acanelado. La parte central de la cola es del color del dorso y las externas café negruzcas La hembra es como el macho por encima, blanco acanelado por debajo, más obscura en los flancos y coberteras subcaudales. Plumas laterales de la cola con punta blanca.

Vive en jardines de parajes áridos.

D. Arica y valles de los alrededores. Ocasionalmente por la costa hasta Antofagasta.



Picaflor de Cora

Picaflor de Arica



MARTIN PESCADORES — FAMILIA ALCEDINIDAE

Son aves de cabeza grande, cuello corto y cuerpo compacto, con alas cortas y redondeadas. El pico es grande, recto y macizo. Las patas son cortas. Se alimentan preferentemente de peces que capturan lanzándose al agua desde una rama o poste. También pueden mantenerse en el aire sin avanzar para lanzarse sobre su presa. Anidan en cuevas hechas en los barrancos, poniendo entre 2 a 7 huevos blancos.

Martín pescador — ***Ceryle torquata*** (Linné)
Ringed Kingfisher - Riesen-Fischer

L. 44 cm. Cresta y panes superiores gris azuladas, con pintas blancas. Pecho y vientre castaño; banda blanca en el cuello. La hembra es similar al macho, pero con banda gris con margen inferior blanco en el pecho.

Vive en las riberas de lagos, ríos y esteros, como asimismo en ensenadas, canales y fiordos

D. Desde el río Biobío hasta las riberas del canal Beagle. Ocasionalmente hasta la provincia de Colchagua.

Martín pescador chico — ***Chloroceryle americana*** (Gmelin)
Green Kingfisher - Grünfischer

L. 21 cm. Por encima es de color verdoso con puntos blancos y por debajo blanco, con manchas verdes en los lados del vientre. El macho tiene el pecho castaño y la hembra dos fajas transversales verdes.

Vive en riberas de ríos, lagos y en la costa.

D. En valles vecinos a Arica y casualmente hasta caleta Buena, en la costa de Tarapacá.



Martín pescador

Martín pescador chico

CARPINTEROS — FAMILIA PICIDAE

Los carpinteros son aves trepadoras con sorprendentes adaptaciones para ese género de vida. Las patas tienen dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás, y las plumas de la cola son tiesas y puntiagudas, sirviéndoles de apoyo al trepar en los troncos de los árboles. El pico es fuerte y en forma de cincel y con él perfora la madera en busca de sus presas, insectos y sus larvas, que atrapa con su lengua muy larga y cilindrica. Anidan en huecos de árboles o en cuevas de barrancos, poniendo 2 a 8 huevos blancos brillosos.

Pitío del norte — ***Colaptes rupicola*** d´Orbigny
Andean Flicker - Andenspecht

L. 33 cm. Frente, corona y nuca de color gris apizarrado; gran banda negra azulada en la mejilla, con punta roja en el macho. La coloración general del dorso es café negruzca con barras más claras, de color café arenoso. Lomo amarillento. Lados de la cara y partes inferiores leonado pálido. Puntos y barritas negras en el pecho; iris amarillo.

Vive en planicies altas.

D. En la alta cordillera de Tarapacá.

Pitío — ***Colaptes pitius*** (Molina)
Chilean Flicker - Bänder-Specht

L. 33 cm. Frente, corona y nuca gris pizarra; lados de la cara y garganta de color leonado. Coloración general del cuerpo con barras café negruzcas y café amarillento por encima y blanco sucio con barras pardas por debajo. Lomo y abdomen teñidos de amarillento. Iris amarillo.

Vive en faldeos o campos escasamente arbolados.

D. Dos subespecies en Chile: el Pitío. *C. p. pitius*, desde Freirina. en el valle del Huasco, hasta la provincia de Llanquihue. y el Pitío austral. *C. p. cachinnans* Wetmore y Peters. que es más grande y con las barras del pecho y flancos más anchas y aceitunadas, desde Chiloé hasta el estrecho de Magallanes.

Carpinterito — ***Picoides lignarius*** (Molina)
Striped Woodpecker - Strichelkopfspecht

L. 18 cm. Por encima con barras blancas y negras; frente y corona negras con mancha roja en la nuca. La hembra carece de esa mancha roja. Partes inferiores blanco amarillentas con rayas negras. Iris rojo.

Vive en árboles dispersos de prados y faldeos, huertos y pequeñas plantaciones y en bosques del sur.

D. Desde Coquimbo hasta la provincia de Ultima Esperanza (Magallanes).



Pitío del norte



Pitío

CarpinteriTO

Carpintero ***Campephilus magellanicus*** (King)
Magellanic Woodpecker - Magellanspecht

L. 45 cm. Negro con brillo azulado, con dos franjas blancas en el dorso. La cabeza en el macho es de color escarlata; la hembra sólo tiene rojo alrededor de la base del pico. Es habitante de los bosques australes.

D. Desde sierra Bellavista hasta el canal Beagle.



Carpintero

MINEROS, BANDURRILLAS, CHURRETES, etc.

CANASTEROS — FAMILIA FURNARIIDAE

Esta familia comprende aves muy diversas, tanto desde el punto de vista de la apariencia como de las costumbres. Tienen en común en que todas son de colores apagados, con predominio de la coloración café, en que se alimentan preferentemente de insectos y en que. con la excepción del Trabajador, ponen huevos blancos en número de 2 a 5.

Los Mineros — Género *Geositta*

Los mineros del género Geositta que viven en Chile tienen una longitud total que vana entre los 14 y 17 cm. Son aves que caminan y corren muy bien y viven en zonas áridas o semiáridas. encontrándoselos desde la costa hasta la puna.

Son de coloración general café grisácea. En las alas y parte inferior de la cola, que es corta, presentan una coloración café rojiza, siendo la base de ésta de color claro. El pico es negro o gris obscuro, con la parte basal de la mandíbula blanquecina o clara.

Anidan en cuevas o cavidades bajo tierra o rocas y de este hábito deriva el nombre común de mineros.

Minero chico — ***Geositta maritima*** (d'Orbigny y Lafresnaye)
Grayish Miner - Grau-Erdhacker

L. 14 cm. Partes superiores gris arena e inferiores gris blanquecinas. Además, tinte café amarillento en los flancos, parte inferior del abdomen, muslos y coberteras subcaudales. Alas café grisáceas y cola café obscura con los bordes blancos o blanquecinos. Pico negro recto y corto. Patas negras.

Vive en costas áridas, internándose en zonas desérticas.

D. Desde Tarapacá hasta Atacama.

Minero grande — ***Geositta isabellina*** (Philippi y Landbeck)
Greamy-rumped Miner - Isabellerdhacker

L. 17 cm. Partes superiores café arena; inferiores café amarillento sucio. Coberteras supracaudales blanco sucio. Alas gris café con tinte rojizo. Cola café con bordes externos blancos. Pico y patas negros.

Vive en los riscos y quebradas cordilleranas, a alturas superiores a los 2.000 m.

D. Desde Atacama hasta Talca.



Minero chico

Minero grande



Minero cordillerano ***Geositta rufipennis*** (Burmeister)
Rufous-banded Miner - Rotschwanz-Erdhacker

L. 16 cm. Por encima es pardo grisáceo, con las supracaudales algo teñidas de café amarillento. Por debajo la garganta es blanco sucia y el resto blanquecino con tinte café amarillento. Alas y cola café rojizas, esta última con banda subterminal negra. Pico y patas negros. Juvenil con tendencia al acanelado.

Vive en la cordillera, alcanzando hasta la costa.

D. En nuestro país viven dos subespecies: el Minero cordillerano, *G. r. fasciata* (Philippi y Landbeck), desde el sur de Antofagasta a Cautín, y el Minero cordillerano austral. *G. r. rufipennis*, en Aysen. Esta última es de coloración más clara.

Minero ***Geositta cunicularia*** (Vieillot)
Common Miner - Kaninchen-E.

L. 15-16 cm. Las partes superiores son de color terroso a café grisáceo. Plumas de la corona con centro más obscuro y las de la espalda de color uniforme o con bordes pálidos más o menos notables. Partes inferiores de color crema o blanquecino, con las plumas del pecho con cantidad variable de café formando estrías poco definidas. Alas café con área café rojiza, bastante extensa. Cola del mismo color de las alas, excepto las plumas centrales que son del mismo color del dorso y con algo de café rojizo. Pico negro. Patas negruzcas.

Vive en terrenos áridos, dunas costeras y mesetas con pasto.

D. En nuestro país viven cinco subespecies: el Minero. *G. c. fissirostris* (Kittlitz), desde el sur de Atacama hasta Llanquihue. El minero argentino. *G. c. cunicularia*, en Magallanes, que es un poco más obscuro que la subespecie precedente y tiene las estrías del pecho menos marcadas y no tan obscuras. El Minero del norte. *G. c. deserticolor* Hellmayr, desde Arica a Atacama. en la costa y cordillera de la costa, es de coloración más pálida que las precedentes. El Minero boliviano, *G. c. titicacae* Zimmer, que vive en las cordilleras al interior de Arica. Esta es algo más grande que las otras subespecies; tiene las coberteras supracaudales de color café pálido y la base de la cola es blanquecina en vez de café amarillenta. El Minero del sur. *G. c. hellmayri* Peters. que se encuentra en el valle de Lonquimay, Malleco. Es parecida a titicacae, pero con las partes inferiores más claras.

Minero de la puna ***Geositta punensis*** Dabbene
Puna Miner - Puna-E.

L. 14,5 cm. Es uno de los mineros más pequeños. Tiene un parche alar café rojizo. La cola tiene una zona café rojiza en la base y una banda terminal negruzca. El pecho es blanquecino, sin estrías obscuras, lo que la diferencia de *G. cunicularia*.

Vive en zonas arenosas áridas, con vegetación baja.

D. En la cordillera de los Andes, desde el límite norte hasta Atacama



Minero cordillerano

Minero





Minero de la puna

Minero austral ***Geositta antarctica*** Landbeck
Short-billed Miner - Feuerland-E.

L. 15 cm. Parecida a *G. cunicularia*, pero el área café rojiza de las alas está apenas esbozada. Estrías del pecho apenas visible. El pico es más corto y más recto.
Vive en campos abiertos.

D. En la zona del estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.

Bandurrilla ***Upucerthia dumetaria*** G. Saint-Hilaire
Scale-throated Earthcreeper - Schuppenkehl-E.

L. 21 cm. Partes superiores café grisáceas a café oliváceas; partes inferiores café amarillentas pálidas, con las plumas del pecho bordeadas de café. Garganta más clara con bordes de las plumas como en el pecho. Pico negruzco largo y curvo.
Vive en zonas semiáridas. con vegetación.

D. En Chile viven tres subespecies: la Bandurrilla del sur, *U. d. dumetaria*, desde Aysen a Tierra del Fuego; la Bandurrilla, *U. d. saturatior* Scott, desde la provincia de Los Andes a Valdivia, con partes superiores café oliváceo, y la Bandurrilla de la cordillera, *U. d. hypoleuca* Reichenbach, desde Antofagasta a Talca. Se diferencia de la subespecie precedente en que la coloración general es más pálida y el pico es más largo y delgado.

Bandurrilla de Arica ***Upucerthia albigula*** Hellmayr
White-throated Earthcreeper - Weisskehl-E.

L. 22 cm. Partes superiores de color café terroso, con la corona más obscura. Por debajo la garganta es blanquecina, con las plumas de la parte inferior de aquélla y las superiores del pecho bordeadas de café obscuro. El resto de las partes inferiores es café amarillento, más obscuro en los flancos. Pico largo bastante curvado.
Vive en regiones altas con matorrales, en lugares húmedos.

D. En alrededores de Putre, provincia de Parinacota.

Minero austral

Bandurrilla

Bandurrilla de Arica

Bandurrilla de la puna ***Upucerthia validirostris*** (Burmeister)
Buff-breasted Earthcreeper - Braunbauch-E.

L. 19 cm. Partes superiores café claras e inferiores café amarillentas claras. Garganta blanquecina; plumas del pecho con bordes obscuros no muy notorios. Cola con plumas centrales del color del dorso y externas café amarillentas.

Vive en laderas rocosas con arbustos.

D. En la puna de la región de Tarapacá.

Bandurrilla de pico recto ***Upucerthia ruficauda*** (Meyen)
Straight-billed Earthcreeper - Gradschnabel-E.

L. 19 cm. Partes superiores café terroso con tono rojizo. Estrías café en la garganta y porción superior del pecho. Partes inferiores blanquecinas, con plumas del vientre y los flancos con bordes café rojizos. Parche café rojizo en las alas. Cola café rojiza clara, con todas las plumas, excepto las externas, con café obscuro o negro. Pico corto apenas curvado.

Vive en laderas rocosas.

D. En nuestro país se encuentran dos subespecies: la Bandurrilla de pico recto, *U. r. ruficauda*, en la alta cordillera desde Tarapacá a Santiago, y la Bandurrilla de pico recto peruana, *U. r. montana* d'Orbigny y Lafresnaye, que vive en la zona de la puna en la parte norte de Tarapacá. Se diferencia de la otra subespecie porque la parte inferior del abdomen es color castaño y, en general, las partes inferiores son más claras.

Bandurilla de las piedras ***Upucerthia andaecola*** d'Orbigny y Lafresnaye
Rock Earthcreeper - Felsen-E.

L. 19 cm. Muy parecida a la especie anterior, pero con la cola de color café rojizo uniforme. Las estrías de las partes inferiores son más obscuras y están mejor definidas.

Vive en laderas rocosas.

D. En la cordillera de Antofagasta.



Bandurrilla de la puna

Bandurrilla de pico recto





Bandurrilla de las piedras

Chiricoca ***Chilia melanura*** (G. R. Gray)
Grag Chilia - Streifenbauch-Uferwipper

L. 17cm. Corona y manto café claro. Lomo y coberteras supra y subcaudales café rojizas. Garganta y pecho blancos; resto de las partes inferiores café grisáceas pálidas. Primarias y secundarias negras con la base café rojiza. Cola negra con base café rojiza; rectrices externas con barbas café rojizas.

Vive en cerros rocosos.

D. En Chile tenemos dos subespecies; la Chiricoca, *Ch. m. melanura*, en las cordilleras de la Costa y de los Andes, desde la provincia de Los Andes hasta la de Colchagua, y la Chiricoca de Atacama, *Ch. m. atacamae* Hellmayr, en la provincia de Huasco, Atacama Es de coloración general más pálida que la otra subespecie y las partes café rojizas son café amarillentas. El pico es algo más corto y delgado.

Churrete ***Cinclodes patagonicus*** (Gmelin)
Dark-bellied Cinclodes - Strandwipper

L. 22 cm. Partes superiores de color café obscuro; partes inferiores café grisáceas Cabeza con ceja blanca que se prolonga hasta la nuca. Garganta blanquecina con barritas café grisáceas. Pecho y parte superior del abdomen con estrías blanquecinas. Alas con barra café rojiza. Pico negruzco.

Vive en la costa y en las riberas de ríos y esteros.

D. Dos subespecies se encuentran en Chile: el Churrete del sur, *C. p. patagonicus*, desde el golfo de Penas hasta Tierra del Fuego, y el Churrete, *C. p. chilensis* (Lesson), desde la provincia de Los Andes hasta Aysen. El Churrete del sur es un poco más grande y de coloración algo más clara que la otra subespecie. Las estrías de las partes inferiores se continúan hasta la parte baja del abdomen.

Churrete costero ***Cinclodes nigrofumosus*** (d'Orbigny y Lafresnaye)
Seaside Cinclodes
Kustc - Uferwipper

L. 27 cm. Es el más grande de los churretes que viven en nuestro país. La coloración general es café ahumada obscura, algo más clara en las partes inferiores. Tiene una banda en el ala de color café amarillento. Garganta blanca. Estrías blancas en las partes inferiores, incluyendo las subcaudales. Cola del mismo color del dorso, con plumas externas con algo de café amarillento pálido. Pico negro. Patas gris obscuras.

Vive en el litoral marino rocoso.

D. Desde Arica hasta Valdivia.



Chiricoca

Churrete





Churrete costero

Churrete acanelado ***Cinclodes fuscus*** (Vieillot)
Bar-winged Cinclodes - Binden-Uferwipper

L. 18 cm. Partes superiores gris cafesosas obscuras. Partes inferiores gris cafesosas, más claras que las superiores. Tiene una línea superciliar blanca amarillenta pálida y garganta blanca con barritas gris cafesosas. Banda del ala color café rojizo. Pico y patas negros.

Vive en terrenos húmedos y cerca de corrientes de agua. También en la costa.

D. En Chile viven dos subespecies: el Churrete acanelado, *C. f. fuscus*, desde Atacama hasta Tierra del Fuego, y el Churrete acanelado del norte, *C. f. albiventris* (Philippi y Landbeck), en la cordillera de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Las partes superiores son más rufescentes y las inferiores más claras.

Churrete chico ***Cinclodes oustaleti*** Scott
Gray-flanked Cinclodes - Grauflanken-U.

L. 17,5 cm. Partes superiores café grisáceas obscuras ceja blanquecina poco notoria. Por debajo la garganta es blanca, con barritas gris obscuras o café grisáceas. Pecho y flancos obscuros, variando de gris obscuro a café rojizo, con estrías claras poco marcadas; abdomen claro, blanquecino o café amarillento pálido. Barra café rojiza en el ala. Cola de color del dorso, con rectrices externas con manchas café amarillentas pálidas. Pico delgado de color negro.

Vive en lechos rocosos de corrientes de agua, canales de regadío y costas marinas.

D. Tenemos en Chile tres subespecies: el Churrete chico, *C. o. oustaleti*, desde Antofagasta a Aysen; el Churrete de Juan Fernández, *C. o. baeckstroemii* Lönnberg, endémico en archipiélago Juan Fernández. Es similar a la subespecie precedente, pero tiene un tinte café rojizo en los lados del abdomen, flancos y coberteras infracaudales, y el Churrete chico del sur, *C. o. hornensis* Dabbene, que vive en Tierra del Fuego, archipiélago del cabo de Hornos y zona del Estrecho de Magallanes. Es muy parecido a *C. o. oustaleti*, pero es ligeramente más grande y con el pico más largo.

Churrete austral ***Cinclodes antarcticus*** (Garnot)
Blackish Cinclodes - Einfarb-U.

L. 23 cm. Partes superiores de coloración café negruzca. Carece de banda superciliar y de banda alar. Partes inferiores de color ahumado obscuro, con mentón y garganta más claros y coberteras subalares más obscuras. Pico negro, corto y grueso, con base de la mandíbula amarilla.

Vive en playas rocosas.

D. Islas del sur del canal Beagle, en el archipiélago de Hornos y de la península Brecknock, en las islas Diego Ramírez, y en general en las costas exteriores de los canales patagónicos y fueguinos.



Churrete acanelado

Churrete chico





Churrete austral

Churrete de alas blancas ***Cinclodes atacamensis*** (Philippi)
White-winged Cinclodes - Flügelstreif-Uferwipper

L. 23 cm Partes superiores café con tinte rojizo, más intenso en el lomo. Raya postocular y garganta de color blanco, esta última con manchitas negras. Pecho y centro del abdomen gris claro. Flancos y subcaudales cafesosas. Doblez del ala y banda alar de color blanco. Cola con algo de blanco en la punta de las rectrices externas.

Vive en faldeos rocosos, cerca de los ríos y vegas de la alta cordillera.

D. Tarapacá hasta Baños del Toro (Coquimbo).

Colilarga ***Sylviorthorhynchus desmursii*** Des Murs
Des Mur's Wiretail - Sechsfedernschlüpfer

L. 24 cm. Inconfundible por su larga cola, que mide el doble de la longitud del cuerpo. Las partes superiores son de color café rojizo y las inferiores café amarillentas, más claras en el abdomen. Tiene sólo 6 rectrices, las centrales muy largas, las que siguen la mitad de la longitud de aquéllas y las externas rudimentarias.

Vive en bosques húmedos, entre los matorrales del sotobosque.

D. Desde la provincia de Petorca (Zapallar) hasta Magallanes.

Rayadito ***Aphrastura spinicauda*** (Gmelin)
Thorn-tailed Rayadito - Stachelschwanzschlüpfer

L. 14 cm. Corona y lados de la cabeza negros; frente negruzca. Banda superciliar café anaranjada que separa el negro de la cara con el de la corona. Resto de las partes superiores café con lomo y coberteras supracaudales café rojizas. Partes inferiores blanquecinas. La cola es muy característica, con las plumas centrales café rojizas y las restantes con mitad basal negra y el resto café rojizo. Todas terminan con los raquis desnudos, dándole apariencia de espinas.

Vive en bosques.

D. Desde la provincia de Limarí (Bosque de Fray Jorge) hasta Tierra del Fuego.

Tres subespecies de este Rayadito viven en Chile; el Rayadito, *A. s. spinicauda*, desde la provincia de Limarí (Bosque de Fray Jorge) hasta Tierra del Fuego; el Rayadito de la Mocha, *A. s. bullocki* Chapman, en la isla Mocha, y el Rayadito de Chiloé, *A. s. fulva Angelini*, en Chiloé y archipiélago de los Chonos. Tiene las partes inferiores de color amarillento, con la garganta generalmente blanquecina.



Churrete de alas blancas

Colilarga





Rayadito

Rayadito de Más Afuera ***Aphrastura masafuerae*** (Philippi y Landbeck)
Mas Afuera Rayadito - Masafuera-Schlüpfer

L. 15 cm. Muy parecido a la especie precedente, pero con la corona y cara de color café terroso y banda superciliar más clara, no tan bien definida ni tan conspicua.
Vive en bosques.

D. Endémica en la isla Alejandro Selkirk (ex Más Afuera), del archipiélago Juan Fernández.

Trabajador ***Phleocryptes melanops*** (Vieillot)
Wren-like Rushbird - Rohrschlüpfer

L. 13,5 cm. Frente y corona café obscura con estrías más pálidas. Banda superciliar color blanco amarillento. Dorso estriado de negro, café y gris. Lomo, partes laterales de la cabeza y del cuello café claro. Alas gris obscuras con banda castaña, moteadas del mismo color en las coberteras. Cola café con plumas externas negras. Partes inferiores blanco sucio con teñido cafesoso. Pico y patas café.
Vive en pajonales.

D. Dos subespecies de Trabajador viven en Chile: el Trabajador, *P. m. melanops*, desde Atacama hasta Aysen, y el Trabajador del norte, *P. m. loaensis* Philippi y Goodall, en pajonales del río Loa, entre Chacance y Quillagua, en el río San Salvador y en el oasis de Chintaguay. quebrada de Quisma (Tarapacá).

Tijeral listado ***Leptasthenura striata*** (Philippi y Landbeck)
Streaked Tit-spinetail - Streifenschlüpfer

L. 16,5 cm. Corona café rojiza con estrías negras y nuca gris pálida. Partes superiores café oliváceo con rayas blanco amarillentas. Alas de color café negruzco con las coberteras con bordes café rojizo claro y con banda café rojiza formada por la base de las primarias y secundarias. Garganta y pecho blancos, con pequeñas estrías negras. Abdomen blanco con plumas bordeadas de gris oliváceo. Cola larga café negruzca.
Vive en laderas arbustivas, con cactos.

D. Cordillera de Tarapacá, sobre los 1.200 m.



Rayadito de Más Afuera

Trabajador





Tijeral listado

Tijeral ***Leptasthenura aegithaloides*** (Kittlitz)
Plain-mantled Tit-spinetail - Schwanzmeisenschlüpfer

L. 16,5 cm. Cejas blancas. Corona y nuca café rojiza con estrías negras; resto de partes superiores café grisáceo pálido. Garganta y parte superior del pecho blanco, este último con estrías obscuras poco marcadas; resto de las partes inferiores café amarillento pálidas. Alas gris cafesosas con zona café rojiza. Cola café negruzca tan larga como el cuerpo. cuerpo.

Vive en terrenos arbustivos, con cactos y en oasis.

D. En Chile se encuentran cuatro subespecies: el Tijeral, *L. a. aegithaloides*, desde Coquimbo hasta Aysen; el Tijeral del norte. *L. a. grisescens* Hellmayr, desde Arica hasta Atacama, en la cordillera de la costa y oasis y valles cordilleranos; es de coloración más pálida que la subespecie precedente; el Tijeral cordillerano del norte. *L. a. berlepschi* Hartert, en la zona de la puna de Tarapacá y Antofagasta, arriba de los 3.000 m. Es parecido a *grisescens*, pero tiene más café rojizo en las partes inferiores y por encima es café arena, y el Tijeral argentino, *L. a. pallida* Dabbene. hasta ahora sólo encontrada en Lonquimay y Aysen. Su plumaje es similar al de la subespecie anterior, pero más pálido y las estrías de la corona son blanquecinas en vez de café rojizas.

Canastero ***Thripophaga humicola*** (Kittlitz)
Dusky-tailed Canastero - Schwarzschwanzschlüpfer

L. 16,5 cm. Partes superiores café con ligero tinte oliváceo; supracaudales teñidas de café amarillento. Estrecha banda superciliar blanca. Garganta blanquecina con puntitos negros; pecho y centro del abdomen gris con estrías más obscuras. Flancos y coberteras subcaudales café rojizo, con zona del mismo color pero más intenso, en el doblez del ala. que es del mismo color del dorso. Cola gris obscura. Pico y patas negros.

Vive en terrenos semiáridos cubiertos de espinos y cactos.

D. En Chile viven dos subespecies: el Canastero, *T. h. humicola*, desde Caldera (Atacama) hasta Constitución región del Maule), y el Canastero sureño, *T. h. polysticta* (Hellmayr). desde el sur de la región del Maule hasta la provincia de Arauco en la zona costera, y en la cordillera de Nahuelbuta. Tiene las estrias del pecho y abdomen más marcadas, dando lugar a un rayado blanco y negro bastante regular.

Canastero chico ***Thripophaga modesta*** (Eyton)
Cordilleran Canastero - Eytonschlüpfer

L. 15,5 cm. Partes superiores café grisáceas obscuras a café arena claro. Garganta café rojiza y resto de las partes inferiores blanquecinas. Alas café obscuras con base de las régimes café amarillentas. Cola con rectrices con la parte externa del vexilo y el ápice café amarillento y la parte interna negra.

Vive en terrenos semiáridos y laderas rocosas. En valles abrigados en invierno.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Canastero chico, *T. m. australis* (Hellmayr), en las cordilleras desde el sur de Atacama hasta Colchagua, y el Canastero chico del norte, *T. m. modesta*, en la zona de la puna de Tarapacá y Antofagasta, a alturas mayores de 3.500 m. Es más obscura que la otra subespecie y tiene más café amarillento en las alas.



Tijeral

Canastero





Canastero chico

Canastero del norte ***Thripophaga dorbignyi*** (Reichenbach)
Creamy-breasted Canastero - Fahlbrust-Schl.

L. 16.5 cm. Partes superiores de color gris cafesoso obscuro, con parte del lomo y supracaudales de color café rojizo. Partes inferiores color arena claro, con mancha café rojiza en la garganta. Subcaudales café rojizas, al igual que las coberteras subalares. Alas café obscuras con mancha rojiza. Cola redondeada café negruzca con la rectriz más externa café rojiza.

Vive en terrenos con escasos arbustos y en lugares húmedos.

D. Cordillera de Tarapacá.

Canastero de cola larga ***Thripophaga pyrrholeuca*** (Vieillot)
Lesser Canastero - Ockerkehl-Schl.

L. 17 cm. Es el canastero que tiene la cola más larga en proporción al cuerpo. Las partes superiores son de color café acanelado. Las inferiores son gris cafesosas, con una mancha rojo amarillenta con pintitas negras en la garganta. Ala con una faja café rojiza. Cola con las tres plumas laterales completamente café rojizas y las centrales café negruzcas.

Vive en laderas rocosas, en regiones semiáridas de la alta cordillera.

D. Desde la provincia de Los Andes hasta Aysen.

Canastero del sur ***Thripophaga anthoides*** (King)
Austral Canastero - King-Schl.

L. 16,5 cm. Partes superiores gris oliváceas, con rayas longitudinales negras, más marcadas en la cabeza y manto. En las partes inferiores el mentón y garganta son rojizos, el pecho gris amarillento y el abdomen gris blanquecino. Mancha rojiza en el doblez del ala y banda del mismo color en el ala. Cola con plumas centrales grises (con raquis negro) y las más laterales gris obscuras con punta rojiza.

Vive en prados húmedos y faldeos de cerros.

D. Desde la provincia de Los Andes hasta Tierra del Fuego. Anida de Concepción al sur.



Canastero del norte

Canastero de cola larga





Canastero del sur

Comesebo grande ***Pygarrhichas albogularis*** (King)
White-throated Treerunner - Spechttöpfer

L. 16 cm. Partes superiores café obscuro, con el lomo, supracaudales y cola café rojizo; ésta tiene espinas en la parte terminal, formadas por los raquis que se prolongan más allá del vexilo. Partes inferiores con la garganta y pecho blancos y el abdomen y coberteras subcaudales con plumas blancas bordeadas de café negruzco. Las alas son de color del dorso con las coberteras y secundarias bordeadas de café rojizo. Flancos café rojizo. Coberteras subalares blancas.

Vive en bosques.

D. Desde el Parque Nacional "La Campana" (región de Valparaíso) hasta Tierra del Fuego.



Comesebo grande

TAPACULOS — FAMILIA RHINOCRYPTIDAE

Los miembros de esta familia son aves terrestres que viven en los bosques y terrenos arbustivos. Tienen las patas muy grandes y las usan como las gallinas para escarbar la tierra. Caminan rápidamente, llevando la cola enhiesta. Emiten una serie de cantos y sonidos muy peculiares. Anidan en cuevas poniendo 2 a 4 huevos blancos.

Hued-hued castaño ***Pteroptochos castaneus*** Philippi y Landbeck
Chestnut-throated Huet-huet - Braunkehl-Huet-Huet

L. 25 cm. Frente, parte anterior de la corona y banda superciliar de color café rojizo; auriculares negras. Parte posterior de la corona, cuello y espalda negro apizarrado. Lomo café rojizo con banditas negras y amarillas. Supracaudales de un café rojizo intenso. Garganta, cuello y parte superior del pecho café rojizo, más pálido en el abdomen, que tiene estrías horizontales amarillentas, lo mismo que los flancos y coberteras subcaudales. Alas gris obscuras. Pico gris obscuro y patas negras.

Vive en bosques húmedos.

D. Desde Colchagua hasta Ñuble y Concepción.

Hued-hued del sur ***Pteroptochos tarnii*** (King)
Black-throated Huet-huet - Schwarzkehl-Huet-Huet

L. 25 cm. Frente y corona de color café rojizo. Lados de la cabeza, nuca, cuello y manto de color apizarrado. Lomo, pecho y resto de las partes inferiores café rojizo, con barras negras y amarillentas en el abdomen y subcaudales. Alas negruzcas, con algunas secundarias y coberteras marginadas de café rojizo. Pico gris obscuro y patas negras.

Vive en bosques densos y húmedos.

D. Desde el río Biobío hasta el canal Messier, en la provincia de Ultima Esperanza.

Turca ***Pteroptochos megapodius*** Kittlitz
Moustached Turca - Turco

L. 24 cm. Parte superior de la cabeza, cuello, dorso, alas y cola de color café ahumado con ligero tinte verdoso; lomo rufescente; línea superciliar, mentón y ancha banda mostachal blanquecinas. Garganta y parte alta del pecho rufescente; resto de las partes inferiores blancas rayadas de café y negro, al igual que los flancos. Pico y patas negros.

Vive en laderas cubiertas de matorrales, desde la costa a los contrafuertes cordilleranos, hasta los 3.000 m de altura.

D. En nuestro país viven dos subespecies: la Turca, *P. m. megapodius*, desde la provincia de Elqui hasta Concepción, y la Turca del norte, *P. m. atacamae* R. A. Philippi, en la provincia de Huasco Es más pequeña y más pálida, sobre todo en las partes inferiores.

Caranca

Pato silbón

Caiquén

Cormorán de las rocas

Hued-hued castaño

Hued-hued del sur



Turca

Tapaculo ***Scelorchilus albicollis*** (Kittlitz)
White-throated Tapaculo - Weisskehl-Tapaculo

L. 18-19 cm. Partes superiores de color café rojizo, con la cola y alas de un café rojizo más intenso. Bridas, superciliares y garganta blanquecinas. Resto de las partes inferiores blanco crema con barras angostas café obscuras.

Vive en zonas semiáridas.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Tapaculo, *S. a. albicollis*, desde Los Vilos, provincia de Choapa, hasta la de Curicó, y el Tapaculo del norte, *S. a. atacamae* Hellmayr, desde la quebrada de Paposo (provincia de Antofagasta) hasta Coquimbo (provincia de Elqui). Esta subespecie es más pálida.

Chucao ***Scelorchilus rubecula*** (Kittlitz)
Chucao Tapaculo - Rotkehl-T.

L. 18 cm. Partes superiores café obscuras, con tinte café rojizo en aves viejas. Bridas, garganta y pecho café rojizo. Vientre gris, con barras irregulares negras y blancas.

Vive en bosques densos y húmedos y entre las quilas.

D. Dos subespecies en Chile: el Chucao, *S. r. rubecula*, desde Colchagua hasta el golfo de Penas, y el Chucao de la Mocha, *S. r. mochae* Chapman, en la isla Mocha; de plumaje igual, pero algo más grande.

Churrín de la Mocha ***Eugralla paradoxa*** (Kittlitz)
Ochre-flanked Tapaculo - Rostflanken-T.

L. 15 cm. De coloración general gris pizarra, algo más clara en las partes inferiores. Lomo, flancos y subcaudales café rojizos.

Vive en bosques y matorrales húmedos.

D. Desde cerca de Cauquenes, región del Maule, hasta Chiloé. También en isla Mocha.



Tapaculo

Chucao



Churrín de la Mocha

Churrín ***Scytalopus magellanicus*** (Gmelin)
Andean Tapaculo - Anden-Tapaculo

L. 12 cm. Coloración general gris apizarrada obscura; más obscura, casi negra, en la cabeza y partes superiores. Flancos, coberteras, subcaudales y primarias tienen la tendencia al café. Algunos individuos tienen plumas blancas plateadas en la frente.

Vive en bosques húmedos, entre las quilas y matorrales, con frecuencia cerca de cursos de agua.

D. En nuestro país viven dos subespecies; el Churrín del sur, *S. m. magellanicus*, desde el Bío-Bío hasta Tierra del Fuego, y en la cordillera hasta Nuble por el norte, y el Churrín, *S. m. fuscus* Gould, desde Atacama hasta el Biobío, incluyendo la cordillera de los Andes hasta los 4.000 m.



Churrín

CAZAMOSCAS SUDAMERICANOS FAMILIA TYRANNIDAE

La mayoría de los cazamoscas sudamericanos son habitantes de los árboles y se alimentan de insectos que capturan mientras vuelan. Otras especies se alimentan de frutos silvestres. Unos pocos, como los de los géneros Muscisaxicola y Lessonia, son terrestres y capturan insectos en la tierra. El pico tiene forma variada, pero usualmente es moderadamente ancho, aplanado y terminado en un gancho no muy pronunciado. Las patas son pequeñas y débiles, excepto en las especies terrestres. Hacen nidos en forma de taza en árboles o en el suelo y la nidada es de 2 a 6 huevos blancos o con manchas o estrías.

Mero ***Agriornis livida*** (Kittlitz)
Great-Shrike-Tyrant - Würger-Tyrann

L. 27,5 cm. Partes superiores gris cafesosas, con estrías café obscuras en la cabeza. Partes inferiores gris parduscas, más claras que el dorso, con el abdomen café amarillento y subcaudales café rojizas. Garganta blanca con estrías negras. Alas negruzcas. Cola negra con barba externa de la rectriz lateral blanquecina. Pico negro con base de mandíbula color cuerno y maxila terminada en gancho. Patas negras.

Vive en campos abiertos y faldeos de cerros.

D. En Chile viven dos subespecies: el Mero, *A. l. livida*, desde el valle de Copiapó (Atacama) hasta Valdivia, y el Mero austral, *A. l. fortis* Berlepsch, solamente en Aysen Es más obscura y más grande que la otra subespecie.

Mero de Tarapacá ***Agriornis microptera*** Gould
Gray-bellied Shrike-Tyrant - Weissbrauen-T.

L. 24,5 cm. Muy parecido a A. livida, pero es más pequeño. Su coloración es más pálida. Las estrias de la garganta son parduscas y poco marcadas. Carece de café amarillento en el abdomen.

Vive en terrenos arbustivos.

D. Hasta ahora sólo se le ha encontrado en la alta cordillera al interior de Iquique (Tarapacá). a 4.000 m.

Mero gaucho ***Agriornis montana*** (d'Orbigny y Lafresnaye)
Black-billed Shrike-Tyrant - Berg-T.

L. 25 cm. Partes superiores de color gris apizarrado obscuro. Partes inferiores gris parduscas, más claras que las superiores. Garganta con estrías negruzcas. Abdomen con tinte café amarillento. Alas negro parduscas con ribetes blancos en las secundarias. Cola del mismo color de las alas, con las rectrices laterales casi enteramente blancas. Pico negro con maxila terminada en gancho bastante pronunciado.

Vive en laderas rocosas y cerca de las habitaciones humanas. Habita en las cordilleras, pero en invierno puede alcanzar la costa (Gaucho del norte).

D. Tres subespecies viven en Chile: el Mero gaucho. *A. m. leucura* Gould, en las cordilleras desde la provincia de Los Andes hasta el río Bío-Bío; el Mero gaucho del norte. *A. m. maritima* (Lafresnaye y d'Orbigny), desde Tarapacá a Coquimbo. Es similar a la subespecie anterior pero de coloración más clara y con las subcaudales y la punta de las rectrices centrales blanquecinas. El Mero gaucho boliviano. *A. m. intermedia* Hellmayr, en la cordillera de los Andes al interior de Arica, es similar a las otras subespecies Las rectrices laterales tienen muy poco negro, siendo casi enteramente blancas.



Mero

Mero de Tarapacá





Mero gaucho

Mero de la puna ***Agriornis albicauda*** (Philippi y Landbeck)
White-tailed Shrike-Tyrant - Weissschwanz-T.

L. 26 cm. Muy parecido al Mero gaucho, pero las partes superiores son café claras. El pico es más robusto, con la mandíbula de color carne y las estrías de la garganta son negras y están bien marcadas.

Vive en terrenos arbustivos abiertos.

D. Zona de la puna de Tarapacá y Antofagasta.

Cazamoscas chocolate ***Neoxolmis rufiventris*** (Vieillot)
Chocolate-vented Tyrant - Weissschulter-Monjita

L. 24 cm. Por encima es gris ahumado, con los lados de la cabeza negruzcos. La garganta y el pecho son gris ahumado pálido. Vientre, coberteras subcaudales y subalares de color castaño rojizo. Cola negra con margen externo blanco.

Vive en terrenos arbustivos abiertos.

D. Magallanes y Tierra del Fuego.

Diucón ***Pyrope pyrope*** (Kittlitz)
Fire-eyed Diucón - Feueraugen-Tyrann

L. 21 cm. Partes superiores de color gris obscuro. Garganta blanca, pecho gris; abdomen y subcaudales blanquecinas. Alas negruzcas, con los bordes de las secundarias blancos. Cola gris clara, con la barba externa de las rectrices festoneada de blanco. Iris rojo, notable. Pico y patas negros.

Vive en terrenos arbolados o arbustivos y abiertos.

D. En Chile viven dos subespecies: el Diucón, *P. p. pyrope,* desde el valle de Copiapó (Atacama) hasta Tierra del Fuego, y el Diucón de Chiloé, *P. p. fortis* Philippi y Johnson, en la Isla Grande de Chiloé, migrando durante el invierno al continente. Es más grande que la otra subespecie y más obscuro.



Mero de la puna



Cazamoscas chocolate

Diucón

LAS DORMILONAS — GENERO *MUSCISAXICOLA*

Las dormilonas del género Muscisaxicola son muy parecidas entre sí y las partes superiores varían de gris claro a cafesoso y las inferiores de blanquecinas a grisáceas. Se las puede diferenciar por el tamaño y por la coloración de la cabeza. Además, todas las dormilonas tienen el hábito de agitar nerviosamente la cola y las alas cuando están paradas.

Viven en faldeos y laderas rocosas cerca del agua, en las cordilleras principalmente. Son especies insectívoras y persiguen los insectos al vuelo.

Dormilona de nuca rojiza ***Muscisaxicola rufivertex*** d'Orbigny y Lafresnaye
Rufous-naped Ground-Tyrant - Rotnacken-Tyrann

L. 17-17,5 cm. Partes superiores gris pizarra claro con la parte posterior del lomo más obscura. Partes inferiores blancas, con algo de grisáceo en el cuello, pecho y flancos; subcaudales blancas. Alas gris obscuras y cola negruzca, con barba externa de la rectriz lateral más clara y con fino borde blanco. Mancha nucal de color café rojizo.

D. Dos subespecies en Chile: la Dormilona de nuca rojiza. *M. r. rufivertex*, en la cordillera y costas desde Antofagasta hasta Colchagua, y la Dormilona de nuca rojiza del norte. *M. r. pallidiceps* Hellmayr, en la cordillera de Tarapacá y Antofagasta. bajando a la pampa de las mismas regiones. Es de coloración general más pálida y con la mancha nucal de un rojizo más claro.

Dormilona de ceja blanca ***Muscisaxicola albilora*** Lafresnaye
White-browed Ground-Tyrant - Rotkäppchen-T.

L. 18 cm. Partes superiores gris cafesosas con tinte oliváceo; supracaudales negras. Partes inferiores blancas con algo de gris pálido en cuello, pecho y flancos. Mancha en la cabeza desde la parte anterior de la corona hasta la nuca de color café rojizo. Conspicua raya superciliar blanca desde las bridas hasta la región auricular. Alas gris cafesosas y cola negra con las dos rectrices laterales bordeadas de blanco.

D. En las cordilleras, entre 1.500 y 2.500 m. desde la provincia de Los Andes hasta Magallanes.

Dormilona de la puna ***Muscisaxicola juninensis*** Taczanowski
Puna Ground-Tyrant - Puna-T.

L. 18 cm. Muy parecida a la Dormilona de ceja blanca Se diferencia de aquella por tener la mancha nucal menos extensa y más obscura. La raya superciliar es menos notable, más angosta y de coloración grisácea. El blanco de las bridas se nota apenas. El pico es más delgado y más corto.

D. En la zona de la puna de la región de Tarapacá.



Dormilona de nuca rojiza



Dormilona de ceja blanca



Dormilona de la puna

Dormilona fraile ***Muscisaxicola flavinucha*** Lafresnaye
Ochre-naped Ground-Tyrant - Gelbnacken-T.

L. 20 cm. Tiene la mancha nucal de color amarillo cafesoso pálido. Una raya blanca parte de las bridas y sigue hacia atrás por encima y debajo del ojo. La cola es negra y tiene las dos rectrices laterales con borde blanco.

D. En Chile se encuentran dos subespecies: la Dormilona fraile, *M.f. flavinucha*, desde Tarapacá hasta Chiloé continental, y la Dormilona fraile de la Patagonia, *M.f. breviros-tris* Olrog, desde Aysen hasta el cabo de Hornos. Es más pequeña y más obscura que la otra subespecie.

Dormilona rufa ***Muscisaxicola capistrata*** (Burmeister)
Cinnamon-bellied Ground-Tyrant - Zügel-T.

L. 18 cm. Frente, bridas y encima del ojo de color negro. Corona castaño rojiza. Partes superiores gris cafesosas, con tinte café rojizo en el dorso y lomo. Garganta blanquecina, pecho gris claro con tinte café amarillento, que se hace más intenso en el abdomen, llegando a canela obscuro en los flancos y subcaudales. Alas y cubiertas alares gris cafesosas. más claras que el dorso. Cola negra, con la barba externa de las plumas laterales blanco crema; las dos siguientes con partes café amarillentas. Pico y patas negros.

D. Nidifica en la Patagonia y Tierra del Fuego. En invierno migra a la zona central, a la puna de Antofagasta y Atacama y a los valles del Loa y Copiapó.

Dormilona de frente negra ***Muscisaxicola frontalis*** (Burmeister)
Black-fronted Ground-Tyrant - Schwarzstirn-T.

L. 20.5 cm. Frente y centro de la corona de color negro; bridas blancas. Partes superiores grises con supracaudales negras. Garganta blanquecina y resto de las partes inferiores blanco sucio; subcaudales blancas. Cola negra con barba externa de las plumas laterales blanquecinas. Pico largo y algo encorvado en la punta.

D. Alta cordillera desde Antofagasta a Osorno. Después de temporales invernales se la puede encontrar al pie de la cordillera.



Dormilona fraile



Dormilona rufa



Dormilona de frente negra

Dormilona gigante ***Muscisaxicola albifrons*** (Tschudi)
White-fronted Ground-Tyrant - Klippen-T.

L. 24 cm. La más grande de las dormilonas. Frente, parte alta de las bridas y encima del ojo de color blanco; centro de la corona café rojizo, que pasa gradualmente a gris cafesoso. Partes superiores gris pardusco obscuro, con parte posterior del lomo y supracaudales de color negruzco. Mentón blanquecino y resto de las partes inferiores blanquecinas con tinte grisáceo y centro del abdomen y subcaudales blancas. Coberteras alares del color del dorso. Cola negra con borde blanco. Pico negro.

D. Alta cordillera de Tarapacá.

Dormilona cenicienta ***Muscisaxicola alpina*** (Jardine)
Plain-capped Ground-Tyrant - Felsen-T.

L. 17cm. Bridas y raya fina encima y debajo del ojo de color blanco. Partes superiores de color ceniciento claro, sin marcas en la corona o nuca; parte posterior del lomo negruzca y supracaudales negras. Partes inferiores blancas, con tinte grisáceo en los lados del cuello, pecho y abdomen. Subcaudales blancas. Alas más obscuras que el dorso, con la barba externa y las puntas de las remiges negruzcas. Subcaudales blancas. Cola negra. Pico y patas negros.

D. Cordillera de los Andes desde Coquimbo a Talca.

Dormilona tontita ***Muscisaxicola macloviana*** (Garnot)
Dark-faced Ground-Tyrant - Masken-T.

L. 16 cm. Coloración general cafesosa por encima y gris blanquecina por debajo. Parte superior de la cabeza café castaño obscuro y posterior del lomo y supracaudales negruzcas. Mentón castaño obscuro. Bridas negras. Subcaudales gris claras, casi blanquecinas. Cola gris cafesosa obscura, con barba externa de las rectrices laterales blanquecinas y las siguientes con sólo el borde blanquecino. Pico y patas negros.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego e isla Navarino.



Dormilona gigante



Dormilona cenicienta



Dormilona tontita

Dormilona chica ***Muscisaxicola maculirostris*** d'Orbigny y Lafresnaye
Spot-billed Ground-Tyrant - Lerchen-T.

L. 15 cm. Partes superiores de color gris cafesoso. con algo de café rojizo en el lomo, supracaudales gris obscuras. Partes inferiores de color amarillo grisáceo; centro de la garganta blanquecina y lados del cuello y pecho con tinte grisáceo. Alas del mismo color que el dorso. Cola negra con bordes blanquecinos. Pico negro con base de la mandíbula amarillo claro.

D. Desde la frontera con el Perú hasta isla Navarino Desde la cordillera baja en otoño a la precordillera, valle central y algunos valles transversales, como los del Huasco y Copiapó.

Cazamoscas de cola corta ***Muscigralla brevicauda*** Lafresnaye y d'Orbigny
Short-tailed Field-Tyrant - Stummel-T.

L. 12 cm. Partes superiores gris cafesosas, con banda occipital amarilla poco notable; lomo amarillento y supracaudales café rojizas. Partes inferiores blanquecinas, gris cenicienta en el pecho. Alas negruzcas con dos bandas blanquecinas. Cola negra muy corta, con punta de las rectrices blanquecinas. Patas largas color carne. La hembra es como el macho, pero sin la punta de la cola blanquecina.

Vive entre pastos y malezas de los campos cultivados y en el borde de los caminos, en zonas litorales áridas.

D. Solamente en las cercanías de Arica.

Colegial ***Lessonia rufa*** (Gmelin)
Rufous-backed Negrito - Sporn-T

L. 12,5 cm. Todo negro, con mancha de color castaño en el dorso. Pico y patas negros. La hembra tiene las partes superiores café, con mancha dorsal café anaranjada. Partes inferiores café grisáceas. Pico y patas negros.

Vive en terrenos bajos y pantanos, vegas, orillas de lagunas y esteros.

D. En nuestro país se encuentran dos subespecies: el Colegial, *L. r. rufa*, desde el río Copiapó hasta Tierra del Fuego, y el Colegial del norte, *L. r. oreas* (Sclater y Salvin), en las cordilleras desde Arica hasta Baños del Toro, Coquimbo. Es ligeramente más grande que la otra subespecie, y la mancha dorsal es más clara. La hembra es parecida a la de la raza típica, pero es más obscura y la mancha dorsal es más notable.



Dormilona chica

Cazamoscas de cola corta



Colegial

Pitajo rojizo ***Ochthoeca oenanthoides*** (Lafresnaye y d'Orbigny) **d'Orbigny's Chat-Tyrant - Kluft-T.**

L. 16,5 cm. Partes superiores gris cafesosas claras. Frente y banda superciliar blancas. Partes inferiores café rojizas, con excepción de la garganta que es grisácea. Alas café obscuras con franjas café rojizas. Cola café obscura con bordes blancos.

Vive en zonas altas, en quebradas y cerca de arroyos.

D. En Chile sólo en la cordillera de Arica.

Pitajo gris ***Ochthoeca leucophrys*** (Lafresnaye y d'Orbigny) **White-browe Chat-Tyrant - Schluchten-T.**

L. 16 cm. Partes de encima de color gris obscuro con parte terminal del dorso teñida de café rojizo. Cabeza con corona y lados más obscuros y ancha banda superciliar blanca. Garganta y pecho gris claros y abdomen blanco. Alas gris obscuras con dos bandas café rojizas. Cola gris obscura con bordes blancos.

Vive en campos cultivados, caminos y proximidades del agua, en valles cordilleranos.

D. Alturas intermedias en los Andes de Tarapacá.

Run-run ***Hymenops perspicillata*** (Gmelin) **Spectakled Tyrant - Brillen-T.**

L. 16 cm. Presenta dimorfismo sexual. El macho es completamente negro, menos las primarias que son blancas, con la base y la punta de color negro. El pico y el anillo periocular carnoso son de un vistoso color amarillo limón. Patas negras. La hembra tiene las partes superiores café obscuras, con los bordes de las plumas más claros. Partes inferiores amarillentas con estrías longitudinales en el pecho. Alas con mancha café rojiza y coberteras negras con puntas café amarillentas formando dos barras. Cola negra con borde café amarillento. Pico amarillo limón.

Vive en pajonales, pantanos y lechos de ríos.

D. Desde Coquimbo hasta Llanquihue. en partes bajas, hasta 1.200 m.

Pitajo rojizo

Pitajo gris



Run-run

Fío-fío ***Elaenia albiceps*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
White-crested Elaenia - Busch-Elänie

L. 15cm. Partes superiores grises teñidas de oliváceo. Sobre la cabeza una cresta blanca. Garganta y pecho grises y centro del abdomen blanco. Subcaudales amarillentas. Alas café grisáceas obscuras con dos bandas blancas. Cola del mismo color de las alas.

Vive en bosques, jardines, huertos y terrenos cultivados.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Fío-fío, *E. a. chilensis* Hellmayr, desde Atacama hasta Tierra del Fuego, solamente desde octubre a marzo, ya que realiza migraciones hasta el SE de Colombia, y el Fío-fío peruano, *E. a. modesta* Tschudi, en los valles y oasis de Tarapacá. Tiene el blanco de la cresta menos pronunciado y las barras de las alas poco notables.

Cazamoscas picochato ***Myiophobus fasciatus*** (Müller)
Bran-colored Flycatcher - Rost-Tyrann

L. 11,5 cm. Cabeza gris con corona y nuca con tinte café amarillento. Partes superiores café amarillentas, con el lomo café amarillento grisáceo. Partes inferiores con la garganta amarillo pálida y pecho y abdomen café rojizos; más intenso en este último. Alas grisáceas con banda amarilla obscura. Flancos y coberteras subcaudales café rojizas. Cola negra con punta café amarillenta. Pico café obscuro, corto y ancho en la base. Patas café obscuras.

Vive en el sotobosque y pastizales con arbustos.

D. Un solo registro en Chile: en las cercanías de Arica (Tarapacá).

Saca-tu-real ***Pyrocephalus rubinus*** (Boddaert)
Vermilion Elycatcher - Purpur-T.

L. 15,5 cm. Presenta dimorfismo sexual. El macho tiene la parte superior de la cabeza e inferiores del cuerpo de color rojo vivo, que se aclara hacia abajo llegando al rosado en las subcaudales. Lado de la cabeza, partes superiores, alas y cola de color negro ahumado. La hembra tiene las partes superiores gris ahumadas. Las inferiores con la garganta y parte anterior del cuello blanquecino o amarillo pálido; el pecho es blanquecino con estrías café y la parte inferior del pecho, abdomen, flancos y subcaudales de color rojo o rosado. Las subalares y pliegues del ala rosados.

Vive en terrenos semiáridos con arbustos.

D. En los valles vecinos a Arica y valles de la precordillera de Tarapacá.



Fío-fío

Cazamoscas picochato



Saca-tu-real

Benteveo ***Pitangus sulphuratus*** (LINNÉ)
Great Kiskadee - Benteveo

L. 24 cm. Corona y lados de la cabeza de color negro con banda superciliar blanca que parte de la frente; cresta no muy notable de color amarillo. Partes superiores café e inferiores amarillas brillantes, con garganta blanca, color que se prolonga bajo el negro que atraviesa el ojo. Alas y cola café obscuras. Rémiges y rectrices con bordes café rojizos.

Vive en bosques y claros de éstos y en parques y jardines.

D. Un solo registro en Chile; en las cercanías de Los Angeles (Región del Biobío).

Benteveo chico ***Myodynastes maculatus*** (MÜLLER)
Streaked Flycatcher - Streifen-T.

L. 21 cm. Partes superiores grises, con estrías negras. En la corona tiene un penacho amarillo poco notable. Lados de la cabeza negros con banda superciliar blanca. Partes inferiores teñidas de amarillo con estrías negras. Las alas son negras con dos bandas blancas. Cola negra con borde blanquecino y barbas externas de las rectrices café rojizas. Pico negro con base de la mandíbula color cuerno.

Vive en los claros y bordes de bosques y plantaciones.

D. Un solo registro en Chile: en Vallenar (Atacama).

Benteveo blanco Y negro ***Tyrannus tyrannus*** (LINNÉ)
Easter Kingbird - Königs-T.

L. 21 cm. Parte superior de la cabeza hasta debajo del ojo de color negro; plumas rojo anaranjadas en la corona, poco conspicuas. Resto de las partes superiores, incluyendo la cola de color gris pizarra. Partes inferiores blancas. Cola con banda terminal blanca.

Vive en terrenos con arbustos y árboles.

D. Visitante casual. Hay registros en las cercanías de Arica (Tarapacá). Antofagasta y Santo Domingo (región de Valparaíso).



Benteveo

Benteveo chico



Benteveo blanco y negro

Cazamoscas tijereta ***Tyrannus savana*** Vieillot
Fork-tailed Flycatcher - Gabelschwanz-T.

L. 40 cm. Partes superiores grises, con lomo negro. Partes inferiores blancas. Lados de la cabeza negros, con cresta amarilla poco notoria. Cola negra muy larga —28 cm—, muy ahorquillada y graduada. La hembra es similar al macho, pero la cola es un poco más corta.

Vive en pastizales semiáridos, bosques y ciudades.

D. Dos registros en Chile: en el valle de Lluta y quebrada de Camarones, Tarapacá.

Pájaro amarillo ***Pseudocolopteryx flaviventris*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Warbling Doradito - Rohrdoradito

L. 12,5 cm. Partes superiores, alas y cola de color café obscuro. Plumas de la corona con bordes café rojizos. Partes inferiores color amarillo canario.

Vive en pajonales de lagunas y pantanos y a orillas de los ríos.

D. Visitante de verano desde Antofagasta hasta Valdivia.

Siete-colores ***Tachuris rubrigastra*** (Vieillot)
Many-colored Rush-Tyrant - Vielfarben-Tachuri

L. 10,5 cm. Parte superior de la cabeza de color negro con mancha roja en la corona; banda superciliar amarilla que comienza en las fosas nasales y alcanza hasta los lados de la nuca; bridas, zona que rodea el ojo y auriculares de color negro azulado. Partes superiores de color verde bronceado obscuro. Inferiores con mentón blanco, que se prolonga formando hacia atrás una angosta barra que contrasta con el negro azulado que rodea los ojos. Resto de las partes inferiores amarillas, con collar negro incompleto en la parte inferior del pecho. Subcaudales rojo salmonadas. Alas gris cafesosas obscuras con barra blanca. Cola negra con borde blanco.

Vive en pajonales de lagunas, ríos y esteros.

D. En Chile viven dos subespecies: el Siete-colores, *T. r. rubrigastra*. desde Atacama hasta Aysen, y el Siete-colores del norte, *T. r. loaensis* Philippi y Johnson, en el río Loa, en la provincia de Tocopilla. Este es más pequeño, el blanco de la garganta es más notorio y el centro del abdomen es pálido, casi blanco.

Cazamoscas tijereta



Pájaro amarillo



Siete-colores

Cachudito ***Anairetes parulus*** (Kittlitz)
Tufted Tit-Tyrant - Meisen-Tachuri

L. 11 cm. Cabeza negra con la frente, auriculares y lados de la nuca estriados de blanco. Moño negro a veces con algo de blanco. Partes superiores gris ahumadas con tinte oliváceo en el lomo. Partes inferiores con la garganta y pecho con estrías negras; resto amarillo pálido. Pico y patas negros. Iris amarillo pálido. La hembra es de coloración igual al macho, pero tiene el moño más corto.

Vive en matorrales, en laderas semiáridas.

D. Dos subespecies se encuentran en nuestro país; el Cachudito, *A. p. parulus*, desde el valle del rio Copiapó (Atacama) hasta Aysen, y el Cachudito austral, *A. p. lippus* (Wetmore), en Magallanes hasta el canal Beagle. Es similar a la otra subespecie. pero es más obscuro y el tinte oliváceo del lomo es menos marcado. Las estrías de la garganta y pecho son más anchas y notorias.

Cachudito de Juan Fernández ***Anairetes fernandezianus*** (Philippi)
Juan Fernández Tit-Tyrant - Insel-T.

L. 14 cm. Cabeza y moño negros con mucho menos blanco que el Cachudito. Partes superiores color ceniciento obscuro. Partes inferiores blancas con gruesas estrías negras. Hembra igual al macho, pero el moño es más reducido.

Vive en los bosques, especialmente entre la maleza en los bordes de éstos.

D. Isla Robinson Crusoe (archipiélago Juan Fernández).

Cachudito del norte ***Anairetes flavirostris*** Sclater y Salvin
Yellow-billed Tit-Tyrant - Gelbschnabel-T.

L. 10,5 cm. Es muy parecido al Cachudito. del que se diferencia por tener las estrías del pecho más gruesas y las barras alares blancas bien marcadas. La base de la mandíbula es anaranjada y el iris es café.

Vive en la cordillera, en las cercanías de las terrazas cultivadas.

D. Región de Tarapacá.



Cachudito



Cachudito de Juan Fernández



Cachudito del norte

Cachudito de cresta blanca ***Anairetes reguloides*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Pied-crested Tit-Tyrant - Streifen-Tachuri

L. 11 cm. Tiene un moño grande con más blanco, que contrasta con el negro de la frente, lados de la cabeza y parte superior de la garganta. Hembra igual al macho, pero con estrías negras en la garganta.

Vive en laderas con arbustos y cerca de campos cultivados.

D. En las cercanías de Arica (Tarapacá).

Viudita ***Colorhamphus parvirostris*** (Darwin)
Patagonian Tyrant - Darwin-Tyrant

L. 13,5 cm. Partes superiores café grisáceas obscuras que se tornan café rojizo obscuro en el lomo. Raya superciliar gris que se continúa en el pecho en forma de herradura; auriculares café. Partes inferiores gris obscuras, más claras y teñidas de amarillento en el abdomen. Dos barras café rojizas en las alas. Cola gris cafesosa. Pico negro muy pequeño.

Vive en los bordes de bosques, especialmente cerca de lagunas y riachuelos.

D. Desde Coquimbo a Tierra del Fuego. Visitante de invierno en las regiones centrales.



Cachudito de cresta blanca

Viudita



Es ave que vive en campos cultivados, huertos y jardines. Tiene el pico aserrado, muy apropiado para cortar los brotes tiernos de los árboles, por lo que los campesinos la consideran una plaga. Es ave de hábitos solitarios, que en cierta época del año forma pequeñas bandadas. Ponen 2 a 4 huevos verde azulados con manchitas negras o café obscuras.

Rara ***Phytotoma rara*** Molina
Rufous-tailed Plantcutter - Rotschwanz-Pflanzenmäher

L. 19 cm. Frente y corona café rojizas, esta última a veces con estrías negras. Partes superiores café oliváceas con estrías negras. Alas negras con bandas blancas formadas por las puntas de las coberteras medianas y mayores. Partes inferiores café rojizas. Plumas centrales de la cola obscuras, el resto con manchas café rojizas y banda terminal obscura. Pico corto y grueso. Iris rojo. La hembra es diferente. Las partes superiores son café oliváceas con estrías negras. El mentón y la garganta son café amarillentos, al igual que el resto de las partes inferiores, pero con estrías negras. Alas con dos barras angostas café amarillentas. Cola como en el macho. Iris rojo.

Vive en bosques bajos y terrenos arbustivos. Visita huertos y jardines.

D. Desde Atacama (provincia de Huasco) hasta Parque Nacional "Torres del Paine" (provincia de Ultima Esperanza. Magallanes).



Rara

GOLONDRINAS — FAMILIA HIRUNDINIDAE

Estas aves tienen en su mayoría partes superiores obscuras —negras, cafés, verdes, azul, a menudo con brillo metálico— y las inferiores a menudo blancas, castañas o ante. Tienen cuello corto, cuerpos esbeltos y alas largas y puntiagudas. La cola es de largo moderado, usualmente ahorquillada. El pico es corto, aplanado y muy ancho en la base, una adaptación para capturar insectos al vuelo. Ponen 3 a 7 huevos blancos o manchados en nidos construidos en cuevas en barrancos, en cuevas naturales o construyen nidos de barro en edificios.

Golondrina chilena ***Tachycineta leucopyga*** (Meyen)
Chilean Swallow - Feuerland-Schwalbe

L. 13,5 cm. Partes superiores de color azul obscuro con brillo metálico, con parte inferior del lomo y supracaudales blancas, formando un parche dorsal notorio. Partes inferiores blancas, con los lados del pecho y flancos con un lavado grisáceo. Alas y cola, que es ligeramente ahorquillada, negruzcas.

Vive en casi todos los hábitats. También en ciudades.

D. Desde Copiapó (Atacama) hasta Tierra del Fuego.

Golondrina de dorso negro ***Pygochelidon cyanoleuca*** (Vieillot)
Blue and white Swallow - Schwarzsteiss-Schw.

L. 12,5 a 13cm. Partes superiores enteramente de color azul obscuro con brillo metálico e inferiores blancas con lavado grisáceo. Alas y cola de color negro pardusco. Se diferencia de la especie precedente por carecer del parche blanco en el lomo.

Vive cerca de lagos, ríos y vegas, acercándose menos a las habitaciones humanas.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego.

Golondrina negra ***Progne modesta*** Gould
Southern Martin - Gabel-Schw.

L. 18-22 cm. Macho: completamente negro con brillo azulado. Cola ahorquillada. Pico negro y patas café. Hembra: partes superiores gris laucha. Garganta, pecho y flancos café ahumado; centro del abdomen claro y coberteras subcaudales blancas con estrias obscuras.

Vive en costas rocosas, tierras cultivadas, bosques abiertos y cerca de las habitaciones humanas.

D. Dos subespecies son raros visitantes para Chile: la Golondrina negra peruana, *P. m. murphyi* Chapman, en las cercanías de Arica, y la Golondrina negra argentina, *P. m. elegans* Baird; un ejemplar capturado en Paine, cerca de Santiago. Es más grande que la otra subespecie.

Pato cortacorrientes

Pato castaño

Pato negro

Pato cuchara



Golondrina chilena



Golondrina de dorso negro



Golondrina negra

Golondrina barranquera ***Riparia riparia*** (Linné)
Bank Swallow - Uferschwalbe

L. 13 cm. Partes superiores y lados de la cabeza café ahumado. Partes inferiores blancas con banda pectoral café ahumada. Alas y cola, ésta última ahorquillada, de color café negruzco.

Vive cerca de lagos, estanques, ríos y ciénagas.

D. Es un visitante casual. Sólo en Pedro de Valdivia (Antofagasta).

Golondrina bermeja ***Hirundo rustica*** Linné
Barn Swallow - Rauch-Schw.

L. 15-20 cm. Partes superiores de color negro con brillo azulado, con la frente blanquecina. Partes inferiores blanquecinas con banda pectoral, interrumpida en el centro, del color del dorso. Las partes inferiores pueden tener partes teñidas de café rojizo con diversa intensidad, que es el color de estas partes en el verano boreal. Alas y cola negras con brillo verdoso. Cola muy ahorquillada.

Vive en campos agrícolas, áreas suburbanas, ciénagas y bordes de lagos.

D. Migrante del Hemisferio Norte que nos visita en verano. Desde Arica hasta Magallanes.

Golondrina de los riscos ***Hirundo andecola*** Lafresnaye y d'Orbigny
Andean Swallow - Anden-Schwalbe

L. 15 cm. Partes superiores negro azulado a verdosas brillantes con coberteras supracaudales cafesosas. Garganta y parte superior del pecho de color ceniciento que pasa a blanco en el centro del abdomen; coberteras subcaudales blanco grisáceas. Cola algo ahorquillada.

Vive en valles andinos.

D. Región de Tarapacá.



Golondrina barranquera

Golondrina bermeja



pr.



Golondrina de los riscos

Golondrina grande ***Hirundo pyrrhonota*** Vieillot
Cliff Swallow - Höhlenschwalbe

L. 13-15 cm. Partes superiores azul obscuro acerado con frente blanquecina y lomo café amarillento. Partes inferiores blanquecinas con garganta castaño obscura, color que pueden presentar en las mejillas y lados de la cara. Cola apenas ahorquillada. Pico y patas negros.

Vive en terrenos abiertos, cerca de acantilados. En migración en riberas de lagos y ciénagas.

D. Dos registros en Chile: en la quebrada de Camarones (Tarapacá) y en el lago Todos los Santos (región de los Lagos).



Golondrina grande

CHERCANES — FAMILIA TROGLODYTIDAE

Estas avecitas tienen una coloración de variados tonos de café, con las partes inferiores más claras, con barras más obscuras en las alas y cola, siendo esta última corta. Son insectívoras con picos delgados y ligeramente curvados. Viven en ambientes variados e invaden jardines y parques donde se puede escuchar su canto que es tan fuerte, que es difícil creer que sea emitido por una avecita tan pequeña. Ponen 4 a 7 huevos blancos o café, a veces manchados, en nidos construidos en muy diversos sitios.

Chercán — ***Troglodytes aedon*** Vieillot
House Wren - Hauszaunkönig

L. 12 cm. Partes superiores de color café, con supracaudales y cola de color café rojizo, esta última con barritas café obscuras. Alas café con barba externa de las primarias y secundarias con barritas café amarillentas. Partes inferiores blanquecinas con tinte café amarillento pálido, más intenso en los flancos y subcaudales. Pico fino de color cuerno. Patas color cuerno.

Vive en campos cultivados, quebradas y faldeos de los cerros, bosques y cerca de las habitaciones humanas.

D. En nuestro país viven tres subespecies: el Chercán, *T. a. chilensis* Lesson, desde Atacama hasta Tierra del Fuego; el Chercán de Atacama, *T. a. atacamensis* Hellmayr. desde la quebrada de Tana (Tarapacá) hasta El Tofo (Coquimbo), de coloración más pálida que la subespecie precedente, y el Chercán de Arica, *T. a. tecellatus* Lafresnaye y d'Orbigny, en los valles cercanos a Arica. Tiene las partes superiores con barritas negras que alcanzan hasta la base del cuello y las inferiores casi blancas, con un tenue lavado gris.

Chercán de las vegas — ***Cistothorus platensis*** (Latham)
Grass Wren - Seggen-Zaunkönig

L. 11 cm. Partes superiores gris cafesosas con estrías negras en la cabeza, y negras y blanquecinas en el dorso. Barritas negras en las supracaudales. Partes inferiores café amarillentas pálidas. Alas negras con barba externa café con rayas negras. La cola es café obscura con barras negruzcas. Pico y patas de color cuerno.

Vive en terrenos húmedos: vegas, pantanos y riberas de ríos.

D. Desde el valle de Huasco (Atacama) hasta Tierra del Fuego.



Chercán



Chercán de las vegas

MUSCICAPIDOS — FAMILIA MUSCICAPIDAE

ZORZALES — SUBFAMILIA TURDINAE

Los miembros de esta subfamilia están distribuidos en casi todo el mundo. Son solitarios y algunas especies forman bandadas después de la época de anidación. Son arbóreos o terrestres. Se distinguen por sus bellos cantos. En general son de coloración poco vistosa. La postura consiste en 2 a 6 huevos blancos, verdosos, blanco azulados o verde oliva, casi siempre con manchas.

Zorzal tropical — ***Catharus fuscescens*** (Stephens)
Veery - Wilson-Drossel

L. 18 cm. Partes superiores, alas y cola café rojizas. Garganta y parte superior del pecho amarillo obscuro, este último con estrías café. Resto de las partes inferiores blancas.
Vive en los bordes de los bosques.

D. Un solo registro en Chile: en el valle del Lluta. cerca de Arica (Tarapacá).

Zorzal negro — ***Turdus chiguanco*** Lafresnaye y d'Orbigny
Chiguanco Thrush - Chiguanco-Drossel

L. 29 cm. Partes superiores gris cafesosas; partes inferiores gris pálidas, con la garganta rayada longitudinalmente de café claro. Alas y cola más obscuras que el dorso. Pico y patas amarillo intenso.
Vive en bosques cerca de cursos de agua y en huertos.

D. En Chile se encuentran dos subespecies: el Zorzal negro, *T. c. chiguanco*, en los valles de Tarapacá, desde el nivel del mar hasta 3.600 m, y el Zorzal cuyano, *T. c. anthracinus* Burmeister. en la región del salar de Atacama (Antofagasta) y en Mamiña (Tarapacá). Es visitante accidental en la precordillera de Santiago, Talca y Bío-Bío. Es mucho más obscuro que la otra Subespecie. llegando a apizarrado obscuro en los machos.

Zorzal — ***Turdus falcklandii*** Quoy y Gaimard
Austral Thrush - Magellan-Drossel

L. 26 cm. Parte superior de la cabeza y auriculares negras, con las plumas de la frente marginadas de café claro. Resto de las partes superiores gris obscuro con tinte oliváceo. Garganta blanquecina con estrías negras. Pecho, vientre y subcaudales amarillo cafesoso claro. Alas y cola negras. Pico y patas amarillos.
Vive en huertos, jardines y pastizales.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Zorzal. *T. f. magellanicus* King, desde Chañaral (Atacama) hasta el cabo de Hornos e islas Juan Fernández, y el Zorzal de la Mocha, *T. f. mochae* Chapman. en la isla Mocha (región de La Araucanía). Su plumaje es similar a la subespecie precedente, pero más pálido. El pico es más largo y robusto.



Zorzal tropical

Zorzal negro



Zorzal

Zorzal argentino ***Turdus amaurochalinus*** Cabanis
Creamy-bellied Thrush - Rahmbauchdrossel

L. 23 cm. Partes superiores café oliváceas. Partes inferiores gris pálidas, con la garganta blanca con estrías café grisáceas y parte media del abdomen blanca. Cola y alas café oliváceas. Pico amarillo con punta negra en los machos, y negro o negruzco en las hembras. Patas cafesosas.

Vive en parques, huertos y bosques.

D. Un solo registro en Chile: cerca de Vallenar (Atacama).



Zorzal argentino

TENCAS — FAMILIA MIMIDAE

Las lencas son aves de alas cortas y redondeadas y cola larga, con pico fuerte de tamaño moderado y patas largas. Son arbóreas, de hábitos solitarios. Se alimentan de insectos, frutas y semillas. Algunas son notables por sus bellos cantos y por la capacidad de imitar los de otras aves. Ponen 2 a 5 huevos cafesosos. azules o verdes, manchados a veces. Construyen nidos voluminosos en matorrales o en el suelo.

Tenca — ***Mimus thenca*** (Molina)
Chilean Mockingbird - Chile-Spottdrossel

L. 28 cm. Partes superiores café obscuras. Partes inferiores gris cafesosas pálidas, con la garganta blanquecina y estrías más obscuras en el vientre. Tienen una conspicua ceja blanca y cola larga de color café obscuro con mancha blanca en borde terminal externo Pico y patas negros.

Vive en laderas de cerros con arbustos.

D. Sólo en Chile, desde el valle del Copiapó (Atacama) hasta Valdivia. Hay un registro en puerto Cárdenas, provincia de Palena (R. de los Lagos).

Tenca patagónica — ***Mimus patagonicus*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Patagonian Mockingbird - Rostflanken-Sp.

L. 23 cm. Muy parecida a la Tenca, pero es más pequeña y con el pico y la cola más cortos. Tiene los costados y la punta de la cola blancas y dos barritas del mismo color en las alas. Las partes superiores son grises y las inferiores blancas.

Vive en terrenos arbustivos.

D. Desde Valdivia hasta Tierra del Fuego.

Tenca de alas blancas — ***Mimus triurus*** (Vieillot)
White-banded Mockingbird - Weissbinden-Sp.

L. 23 cm. Partes superiores café grisáceas con lomo café rojizo. Partes inferiores blanco sucio, con café amarillento en los flancos y coberteras subcaudales. Ceja blanca. Alas negras con banda longitudinal blanca. Cola con las plumas centrales negras y las restantes blancas en su mayor parte.

Vive en terrenos arbustivos.

D. Visitante ocasional desde Argentina. Hay registros en Vallenar, Zapallar, Santiago, cerca de Pucón y en los alrededores de Valdivia.



Tenca



Tenca patagónica



Tenca de las alas blancas

BAILARINES CHICOS — FAMILIA MOTACILLIDAE

Aves pequeñas que andan y corren por el suelo con gran facilidad. Son de coloración poco vistosa y se mimetizan en el terreno en que viven, terrenos húmedos y vegas, con gran facilidad, mientras capturan insectos. Se caracterizan por tener la uña del dedo posterior desmesuradamente larga y afilada Su nombre común alude al bailoteo aéreo que los machos efectúan durante la época del cortejo. La postura es de 2 a 7 huevos blanquecinos profusamente manchados de café. Anidan en el suelo.

Bailarín chico — ***Anthus correndera*** Vieillot
Correndera Pipit - Kamp-Pieper

L. 15,5 cm. Partes superiores con franjas café y ante, más claras en el lomo. Partes inferiores con mentón y garganta blanquecina, pecho con estriaciones finas del color del dorso y abdomen ante Alas café obscuras con bordes de las rémiges más claros. Cola café obscura con bordes blancos. Pico negruzco con base de la mandíbula color cuerno. Patas color cuerno. Dedo posterior con uña muy larga.

Vive en potreros, llanos y prados húmedos.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Bailarín chico, *A. c. chilensis* (Lesson), desde Atacama (valle del río Copiapó) hasta Tierra del Fuego, y el Bailarín chico del norte. *A. c. catamarcae* Hellmayr, en la región de Antofagasta. La coloración ante del dorso es más obscura y el pico es más largo y delgado.

Bailarín chico argentino — ***Anthus hellmayri*** Hartert
Hellmayr's Pipit - Hellmayr-P.

L. 14,5 cm. Se diferencia de las otras especies de bailarines chicos por tener las plumas laterales de la cola cafesosas en vez de blancas. La uña del dedo posterior es más corta y encorvada.

Vive en potreros, llanos y prados húmedos.

D. Un solo registro en Chile: en Lonquimay. provincia de Malleco

Bailarín chico peruano — ***Anthus lutescens*** Puchera
Yellowish Pipit - Savannen-P.

L. 13 cm. Muy parecido a los otros bailarines que viven en Chile, de los que se diferencia por su tamaño más pequeño y por tener las partes inferiores con tonalidades amarillentas.

Vive en lugares áridos cerca de la costa.

D. En las cercanías de Arica, región de Tarapacá.



Bailarín chico

Bailarín chico argentino



Bailarín chico peruano

VERDERONES — FAMILIA VIREONIDAE

Los verderones son aves solitarias que viven en los árboles, entre cuyo follaje se alimentan de insectos y frutos. Son de colores apagados, con el pico moderadamente grueso y terminado en gancho. Son migratorios. Ponen de 2 a 5 huevos blancos escasamente manchados, en nidos construidos en árboles o matorrales.

Verderón de ojos rojos — ***Vireo olivaceus*** (Linné)
Red-eyed Vireo - Rotaugen-Vireo

L. 15 cm Partes superiores verde oliváceas e inferiores blanquecinas. Frente, corona y nuca grises. Raya superciliar blanca con borde superior negro. Ojos rojos.

Vive en bosques no muy densos y en sus bordes.

D. Un solo registro accidental en Chile: en las cercanías de Vallenar (Atacama).

EMBERIZIDOS — FAMILIA EMBERIZIDAE

CERROJILLOS — SUBFAMILIA PARULINAE

Aves pequeñas, muy activas y de colores brillantes, con pico delgado, recto y puntiagudo. Son típicamente arbóreas y se alimentan principalmente de insectos, frutos y néctar. Algunos tienen cantos bastantes notables. La nidada es de 2 a 5 huevos, usualmente blancos con marcas café.

Monjita americana — ***Dendroica striata*** (Forster)
Blackpoll Warbler - Streifenwaldsänger

L. 14 cm. Corona negra y mejillas blancas. Partes superiores grises con estrías negras. Inferiores blancas con estrías negras en los flancos. La hembra tiene las partes superiores oliváceas con estrias negras y las inferiores blanco amarillentas con estrías negras.

Es habitante de los bosques.

D. Un solo registro accidental en Chile: en las cercanías de Valdivia (región de los Lagos).



Verderón de ojos rojos



Monjita americana

TANGARAS SUBFAMILIA THRAUPINAE

Su tamaño fluctúa entre 7.5 y 30 cm. de longitud. En muchas especies el plumaje es de colores brillantes y en otras pocas de coloración poco conspicua. Pico más bien corto y algo cónico. Las patas son cortas. Son arbóreas y se alimentan de frutas, flores e insectos.

Comesebo chico ***Conirostrum cinereum*** Lafresnaye y d'Orbigny
Cinereous Conebill - Weissstirnspitzschnabel

L. 11 cm. Parles superiores gris pizarra con tinte oliváceo. Frente y banda superciliar blancas. Por debajo, mentón y garganta blancas; resto de las partes inferiores gris acanelado claro. Alas negras con banda blanca. Cola negra. Pico color cuerno, y patas negras.

Vive en laderas arbustivas y en plantaciones.

D. En oasis de la región de Tarapacá.

Comesebo de los tamarugales ***Conirostrum tamarugense*** Johnson y Millie
Tamarugo Conebill - Rotstirn-Sp.

L. 11,5 cm. Partes superiores gris pizarra. Raya superciliar café rojiza que parte de la frente. Garganta y parte superior del pecho café rojizo. Resto de las partes inferiores gris pálidas, algo amarillentas en el vientre. Subcaudales café rojizas. Alas y cola gris cafesosas, las primeras con una mancha blanca. La hembra tiene las partes superiores gris cafesosas. Raya de la frente y superciliar café rojiza, más pálida que la del macho. Partes inferiores con la garganta café rojiza pálida. Resto de las partes inferiores gris pálidas, con parte inferior del pecho y vientre blanco amarillento. Subcaudales blanco sucio, con algo de café rojizo pálido en la base. Alas y cola como las del macho.

Vive en bosques de tamarugos y laderas arbustivas.

D. Hasta ahora sólo se lo ha encontrado en los tamarugales del salar de Pintados y en Mamiña (Tarapacá).

Naranjero ***Thraupis bonariensis*** (Gmelin)
Blue-and-yellow Tanager - Furchen-Tangare

L. 18 cm. Cabeza y cuello azul claro; bridas negras. Dorso verdoso. Lomo, abdomen y subcaudales amarillos. Pecho anaranjado, con semicollar negro que lo separa del cuello. Alas y cola azul obscuro. La coloración de la hembra es más clara.

Vive en pastizales con arbustos y en parques y jardines.

D. Tarapacá, en valles andinos entre los 2.600 y los 4.000 m.



Comesebo chico



Comesebo de los tamarugales



Naranjero

Piranga ***Piranga rubra*** (Linné)
Summer Tanager - Sommer-Tangare

L. 16.5 cm. Enteramente rojo, con pico amarillo pálido. La hembra es de coloración amarilla anaranjada.

Vive cerca de cursos de agua en bosques.

D. Un solo registro en Chile: en Portezuelo del Carmen, a 23 km. al NE de la ciudad de Antofagasta.

CARDENALES, PEPITEROS, etc. SUBFAMILIA CARDINALINAE

Son aves de cuerpo robusto, con pico macizo y fuerte. Las hembras son de colores poco llamativos en contraste con los machos, que en su mayoría tienen colores brillantes. Son esencialmente arborícolas.

Pepitero ***Saltator aurantiirostris*** Vieillot
Golden-billed Saltator - Goldschnabel-Saltator

L. 23 cm. Partes superiores plomas e inferiores amarillo cafesosas claras. Cabeza blanca y negra; garganta blanca. Pico amarillo. Cola con mancha blanca en los lados. Hembra de colores menos vistosos.

Vive en lugares boscosos y arbustivos.

D. Un solo registro en Chile: en Socoroma. cordilllera de Arica (Tarapacá).



Piranga

Pepitero



CHIRIHUES, CHINCOLES Y SEMILLEROS — SUBFAMILIA EMBERIZINAE

Aves más bien pequeñas, de pico corto, grueso y cónico, de colores poco vistosos. Son terrestres o arbóreos. Sus voces son variadas y algunos tienen cantos agradables.

Negrillo — ***Volatinia jacarina*** (Linné)
Blue-black Grassquit - Jacarini

L. 12 cm. De color negro azulado brillante, con alas y cola negro cafesosas obscuras. Maxila negra y mandíbula gris clara. La hembra es café por encima y blanquecina con estrías café por debajo, con subcaudales café rojizas.

Vive en pastizales y zonas arbustivas.

D. En los valles bajos cercanos a Arica (Tarapacá).

Corbatita — ***Sporophila telasco*** (Lesson)
Chesnut-throated Seedeater - Braunkehl - Pfäffchen

L. 13 cm. Partes superiores grises, con estrías más obscuras en la corona y manto. Partes inferiores blancas, con la garganta castaña. Ala negruzca con mancha blanca. Cola negruzca con base blanca. La hembra es café por encima y blanquecina por debajo, con estrías obscuras en la corona, espalda, pecho y flancos.

Vive en lugares arbustivos y valles cultivados.

D. En los valles bajos cercanos a Arica (Tarapacá).

Semillero — ***Catamenia analis*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Band-tailed Seedeater - Spiegel-Catamenie

L. 14 cm. Coloración general gris pizarra, con zona negra alrededor del pico, que hace destacar más el pico corto, grueso, de color amarillo vistoso. Coberteras subcaudales castañas. Alas negras con bordes grises. Cola negra con manchas ovaladas blancas. La hembra tiene las partes superiores café claras con estrias negras finas; lomo y coberteras supracaudales color pizarra con estrías negras. Garganta y partes inferiores blanco plomizas, con delgadas líneas negras. Centro del pecho y abdomen blanquecinos. Coberteras subcaudales amarillentas.

Vive en terrenos arbustivos.

D. En nuestro país sólo en la cordillera de Tarapacá. entre los 3.000 y 3.600 m.



Negrillo



Corbatita



Semillero

Semillero peruano ***Catamenia inornata*** (Lafresnaye)
Plain-colored Seedeater - Schlicht-Catamenie

L. 13 cm. Parles superiores café plomizas con estrías negras. Partes inferiores gris ocráceas con coberteras subcaudales castañas. La hembra tiene las partes superiores café ocráceas con estrías más obscuras y las coberteras subcaudales ocráceas. Se distingue del Semillero por no tener las manchas ovaladas en la cola.

Vive en laderas arbustivas.

D. Sólo registrada en Mamiña (Tarapacá).

Comesebo negro ***Diglossa carbonaria*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Coal-black Flower-Piercer - Grauschulter-Hakenschnabel

L. 14 cm. Partes superiores, incluyendo cola, negras. Partes inferiores castaño rojizas. Flancos y coberteras subalares gris claras. Garganta negra.

Vive en zonas de páramos.

D. Un solo registro en Chile: en las cercanías de Putre, provincia de Parinacota (Tarapacá).

Chirihue cordillerano ***Sicalis uropygialis*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Bright-rumped Yellow-Finch - Goldbürzel-Gilbammer

L. 14 cm. De coloración general gris y amarilla. Se reconoce por una mancha gris a los lados de la cara, que comenzando en las bridas se extiende hacia atrás a las regiones subocular y auricular. La hembra difiere del macho por tener la corona estriada y el dorso con más gris. Las partes inferiores son de un amarillo más pálido.

Vive en laderas y terrenos abiertos.

D. En la zona cordillerana de Tarapacá y Antofagasta, generalmente sobre los 2.500 m.



Semillero peruano



Comesebo negro

Chirihue cordillerano

Chirihue dorado ***Sicalis auriventris*** Philippi y Landbeck
Greater Yellow-Finch - Goldbauch-Gilbammer

L. 16 cm. Cabeza y partes inferiores amarilla brillantes. Espalda amarilla verdosa con estrías grises. Lomo amarillo verdoso, subcaudales amarillas. Alas y cola negruzcas con cubiertas alares grisáceas. La hembra se diferencia del macho por tener la espalda más cafesosa. Sólo la garganta, centro del abdomen y subcaudales son amarillas, destacando-se la tonalidad café ceniciento en el resto de las partes inferiores.

Vive en laderas abiertas.

D. Desde Antofagasta a la laguna del Maule (provincia de Talca) en alturas superiores a los 2.000 m.

Chirihue verdoso ***Sicalis olivascens*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Greenish Yellow-Finch - Olivbrust-G.

L. 13,5 cm. Parecido al Chirihue cordillerano, se diferencia de éste por su plumaje más verdoso. El dorso y lomo son oliváceo verdosos y las partes inferiores amarillas con tono oliváceo poco intenso. La hembra tiene una coloración más obscura que el macho y los flancos son grisáceos en vez de verdoso amarillentos.

Vive en la cordillera, en laderas abiertas.

D. Desde Arica hasta Baños del Toro (Coquimbo)

Chirihue austral ***Sicalis lebruni*** (Oustalet)
Patagonian Yellow-Finch - Magellan-G.

L. 14 cm. Partes superiores grisáceas con manchas amarillentas. Cabeza amarillo verdosa con manchas grises. Partes inferiores amarillas con flancos grisáceos. La hembra tiene menos amarillo en las partes superiores e inferiores.

Vive en estepas y matorrales.

D. En la región de Magallanes, desde Ultima Esperanza hasta la parte norte de isla Tierra del Fuego.



Chirihue dorado



Chirihue verdoso



Chirihue austral

Chirihue ***Sicalis luteola*** (Sparrman)
Glassland Yellow-Finch - Kurzschnabel-Gilbammer

L. 14,5 cm. Partes superiores oliváceas con estrías café negruzcas; lomo y supracaudales amarillo verdosas. Auriculares grisáceas. Frente y parte inferiores amarillas con lavado grisáceo en el pecho y flancos. Alas y cola café. La hembra se diferencia del macho por tener las partes inferiores de un amarillo más pálido.

Vive en campos y prados abiertos.

D. Desde Atacama (quebrada del río Salado) hasta Aysen, incluyendo las islas Guaitecas.

Chincol ***Zonotrichia capensis*** (Müller)
Rufous-collared Sparrow - Morgenammer

L. 14 a 16 cm. Parte superior de la cabeza gris con plumas de la corona eréctiles y dos bandas laterales negras. Ancho anillo castaño alrededor del cuello. Partes superiores cafesosas con estrías más obscuras en el manto. Partes inferiores blanquecinas, con el pecho lavado de grisáceo. Alas gris obscuras con algo de color canela y dos bandas blancas. Cola gris obscura. Pico y patas de color cuerno. La hembra es muy parecida al macho, pero las plumas de la corona no son eréctiles.

Vive en campos, parques, jardines y huertos.

D. En Chile viven cinco razas: el Chincol, *Z. c. chilensis* (Meyen). desde Atacama a las islas Guaitecas y norte de Aysen; el Chincol del norte, *Z. c. antofagastae* Chapman, en Tarapacá y Antofagasta hasta los 2.500 m de altura. Es algo más pequeño que el precedente. Tiene las líneas laterales negras de la cabeza más anchas; el Chincol peruano, *Z. c. peruviensis* (Lesson), en Arica y su cordillera hasta los 3.500 m. Muy similar al anterior. Se diferencia por tener el pecho más blanco. El Chinchol andino. *Z. c. sanborni* Hellmayr, en la cordillera de los Andes desde Atacama hasta la provincia de Los Andes. Es muy parecido a *chilensis*, pero sin líneas laterales negras en la cabeza. Finalmente el Chincol austral, *Z. c. australis* (Latham), que se distribuye desde Aysen hasta el cabo de Hornos y hacia el norte en la cordillera hasta la región Metropolitana de Santiago. Es la más grande de las razas que viven en Chile y carece de las bandas laterales negras de la cabeza.



Chirihue



Chincol

LOICAS Y TORDOS — SUBFAMILIA ICTERINAE

Son aves de tamaño pequeño a mediano, con alas largas y puntiagudas; el pico es de tamaño mediano a corto y puntudo y las patas robustas. Se alimentan de insectos y semillas.

Mirlo — ***Molothrus bonariensis*** (Gmelin)

Shiny Cowbird - Seiden-Kuhstärling

L. 19,5 - 21,5 cm. El macho es completamente negro con brillo tornasolado azul violeta. Las alas y la cola tienen brillo tornasolado verdoso. Pico y patas negros. La hembra es café grisácea, más clara en las partes inferiores. Es de menor tamaño que el macho.

Vive en pastizales y campos cultivados.

D. Desde Atacama hasta Aysen.

Tordo bayo — ***Molothrus badius*** (Vieillot)

Bay-winged Cowbird - Braunkuh-Stärling

L. 19 cm. De coloración general café grisácea, más clara en las partes inferiores. Alas café amarillentas con negro en las puntas de las primarias y barba interna de las secundarias. Cola negruzca. Pico y patas negros.

Vive en pastizales, zonas arbustivas y bosques abiertos.

D. Un solo registro en Chile: en Curicó.

Tordo — ***Curaeus curaeus*** (Molina)

Austral Blackbird - Stachelkopfstärling

L. 28 cm. De coloración general negra aterciopelada brillante. Pico y patas negros.

Vive en laderas arbustivas, borde de bosques y campos cultivados.

D. En Chile viven tres subespecies: el Tordo, *C. c. curaeus*. desde Atacama hasta el estrecho de Magallanes; el Tordo de Tierra del Fuego, *C. c. reynoldsi* (Sclater), más grande y con el pico más largo y delgado que la subespecie precedente, en Magallanes y Tierra del Fuego; y el Tordo de los canales, *C. c. recurvirostris* Markham, de tamaño intermedio entre las otras subespecies. El pico presenta un levantamiento en la punta de la maxila, que es más larga que la mandíbula, formando algo así como una espátula; la mandíbula se curva ligeramente hacia abajo en la punta. Hasta ahora solamente en isla Riesco (Magallanes).



Mirlo

Tordo bayo





Tordo

Trile ***Agelaius thilius*** (Molina)

Yellow-winged Blackbird - Goldschulterstärling

L. 19,5 - 20,5 cm. El macho es de coloración general negra, con los bordes de las plumas cafesosos, los que con el uso se gastan y el ave queda completamente negra. Mancha amarilla en el doblez del ala. La hembra tiene el cuerpo café obscuro con estrías más claras. Banda superciliar blanquecina. Mancha amarilla en el ala, igual que el macho.

Vive en pajonales.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Trile, *A. t. thilius*, desde Atacama hasta Llanquihue, y el Trile argentino, *A. t. petersi* Laubmann. en Chile Chico (Aysen) y posiblemente en el Parque Nacional "Torres del Paine" (Magallanes).

Loica ***Sturnella loyca*** (Molina)

Long-tailed Meadowlark - Soldatenstärling

L. 26-28 cm. Partes superiores café con estrías más obscuras. Garganta, pecho y parte superior del abdomen de color rojo, lo que la identifica fácilmente. La hembra es de coloración más pálida y con la parte superior del pecho café con estrías negras. Garganta blanca y resto del pecho y abdomen rojo pálido.

Vive de preferencia en terrenos bajos y húmedos. En la cordillera hasta los 2.500 m.

D. Desde Copiapó (Atacama) hasta Tierra del Fuego.

Loica peruana ***Sturnella bellicosa*** Filippi

Peruvian Red-breasted Meadowlark - Weissschenkelsoldatenstärling

L. 20-22 cm. De menor tamaño que la especie precedente. Tiene el rojo de las partes inferiores mucho más vivo.

Vive en campos cultivados y terrenos arbolados.

D. En los valles cercanos a Arica y oasis (Tarapacá) hasta Quillagua (Antofagasta).



Trile

Loica



Loica peruana

Loica argentina ***Sturnella superciliaris*** (Bonaparte)
White-browed Blackbird - Weissbrauenstärling

L. 17,5 cm. Es de coloración general negra, con garganta, pecho y parte superior del abdomen de color rojo. La hembra es de color café claro con estrías negras, la garganta blanquecina y los flancos y el pecho rosados.

Vive en pastizales con arbustos y en terrenos húmedos.

D. Un solo registro en Chile: Baños del Toro, provincia de Elqui (Coquimbo).

Charlatán ***Dolichonyx oryzivorus*** (Linné)
Bobolink - Reisstärling

L. 14,5 cm. Cabeza, cuello, partes inferiores, alas y cola negros. Parte posterior del cuello café amarillento; manto negro con estrias café amarillentas claras. Parte inferior de la espalda y lomo blanquecinos. La hembra tiene las partes superiores estriadas de negruzco, café amarillento y café. Ceja café amarillenta pálida y corona con estrías café claras. Garganta y pecho café amarillento claro y resto de las partes inferiores amarillentas, con estrías obscuras a los lados del cuerpo.

Vive en campos abiertos.

D. Sólo dos registros en Chile: Pedro de Valdivia (Antofagasta) y valle del Lluta (Tarapacá).

Loica argentina

Charlatán



JILGUEROS, DIUCAS Y YALES FAMILIA FRINGILLIDAE

Su principal característica es el pico, corto, cónico y terminado en punta, adaptado principalmente para comer semillas, las que consumen en tierra. Con pocas excepciones son buenos voladores. Son gregarios y migran en bandadas. Son excelentes cantores.

Cometocino patagónico ***Phrygilus patagonicus*** Lowe
Patagonian Sierra-Finch - Magellan-Ämmerling

L. 15.5 cm. Cabeza, alas y cola grises; manto acanelado. Lomo y partes inferiores amarillo verdosas; amarillo intenso en el centro del abdomen. Subcaudales blancas. La hembra se diferencia del macho por tener las partes superiores de color oliváceo y las inferiores más claras, tirando a verdoso. Centro del abdomen y subcaudales blanquecinas.

Vive en quebradas con vegetación densa y en bosques, especialmente de renovales.

D. Desde Zapallar (provincia de Petorca) hasta el cabo de Hornos.

Cometocino de Gay ***Phrygilus gayi*** (Gervais)
Gray-hooded Sierra-Finch - Cordilleren-Ämmerling

L. 16 cm. Cabeza, cuello y parte superior del pecho de color gris obscuro azulado. Partes superiores amarillo oliváceas. Pecho, parte superior del abdomen y flancos amarillo oliváceo, más claro que el dorso. Parte inferior del abdomen y de los flancos y subcaudales de color blanco. Alas y cola gris cafesosa obscuras. La hembra difiere del macho por tener la cabeza más clara, con estrías negras. El dorso es oliváceo y las partes inferiores amarillo oliváceas. La parte baja del abdomen es grisácea.

Vive en valles altos regados, en terrenos abiertos y en la costa en el invierno.

D. Tres subespecies viven en Chile; el Cometocino de Gay. *P. g. gayi*. desde Atacama hasta Colchagua; el cometocino de Gay costero, *P. g. minor* Philippi y Goodall, más pequeño que el anterior, y que se encuentra desde Barquito (provincia de Chañaral) hasta Santo Domingo (provincia de San Antonio). El Cometocino de Gay austral, *P. g. caniceps* Burmeister. desde Aysen a Tierra del Fuego. Es más grande que las otras subespecies.

Cometocino del norte ***Phrygilus atriceps*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Black-hooded Sierra-Finch - Kapuzen-Ämmerling

L. 16,5 cm. Parecido al Cometocino de Gay, pero la cabeza, garganta y parte superior del pecho son de color negro. Manto y parte media del pecho acanelado claro, y lomo y partes inferiores amarillas; parte baja del vientre y subcaudales blancas. La hembra es parecida al macho, con cabeza y cuello gris laucha con estrías más obscuras. Pecho amarillo anaranjado con abdomen y subcaudales blanquecinas. Dorso café oliva, pasando al oliváceo en el lomo.

Vive en pastizales y matorrales.

D. En la cordillera de los Andes, desde el límite con Perú hasta Baños del Toro (Coquimbo).



Cometocino patagónico



Cometocino de Gay



Cometocino del norte

Yal ***Phrygilus fruticeti*** (Kittlitz)
Mourning Sierra-Finch - Strauch-Ämmerling

L. 18,5 cm. Partes superiores gris apizarradas, con la cabeza y manto estriados de negro. Garganta, parte anterior del cuello y pechos negros, variando la extensión del negro con la edad; las plumas están bordeadas de un delgado margen blanco. Abdomen y subcaudales blancos. Ala negra con dos bandas blancas. Pico amarillo y patas café amarillentas. La hembra es bastante diferente. Las partes superiores son grises con estrías cafesosas Garganta y pecho blanquecino. Cabeza con mancha cafesosa detrás del ojo. Pico y patas cafesosos.

Vive en laderas rocosas y arbustivas.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego. En las regiones nortinas, en la cordillera de los Andes sobre 3.000 m.

Pájaro plomo ***Phrygilus unicolor*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Plumbeous Sierra-Finch - Einfarb-Ämmerling

L. 17 cm. Partes superiores gris pizarra e inferiores del mismo color, pero más claras; subcaudales blanquecinas. Alas negruzcas y cola negra. La hembra es café por encima, con estrías café más obscuras; lomo y supracaudales gris pizarra. Partes inferiores blanquecinas con delgadas estrías café.

Vive en las cordilleras, acercándose al mar a medida que se avanza hacia el sur. En laderas rocosas y arbustivas.

D. Desde el límite con Perú hasta Tierra del Fuego.

Cometocino de dorso castaño ***Phrygilus dorsalis*** Cabanis
Red-backed Sierra-Finch - Braunmantel-Ämmerling

L. 15 cm. Muy parecido a la Diuca, pero tiene el manto café castaño. Garganta, parte inferior del pecho, vientre y subcaudales blancos.

Vive en terrenos rocosos en la cordillera de los Andes.

D. Alta cordillera de Antofagasta.



Yal

Pájaro plomo





Cometocino de dorso castaño

Cometocino de Arica ***Phrygilus erythronotus*** (Philippi y Landbeck)
White-throated Sierra-Finch - Weisskhel-Sierra-Fink

L. 15 cm. Parecido a la especie anterior, pero carece de café castaño en el dorso. Partes superiores de color gris pizarra. Partes inferiores con garganta y parte superior del cuello blancos; pecho gris claro y abdomen y subcaudales blancos. Auriculares con rayitas blancas. Ala y cola negro parduscas. Flancos teñidos de café amarillento.

Vive en quebradas y terrenos rocosos en la zona de la puna.

D. Alta cordillera de Arica, sobre los 4.000 m.

Plebeyo ***Phrygilus plebejus*** Tschudi
Ash-breasted Sierra-Finch - Aschbrust-Sierra-Fink

L. 13 cm. Partes superiores gris cenicientas estriadas con gris obscuro; estas estrías son muy finas en la cabeza y cuello y más largas y gruesas en el dorso. El lomo y supracaudales son pizarra obscuro. Partes inferiores gris pálidas; garganta blanquecina; abdomen y subcaudales blancas. Cabeza con tira superciliar gris clara y ojo con ribete blanquecino, formando una mancha debajo del ojo. Ala y cola gris obscuras. Patas café y pico gris córneo. La hembra es más estriada en las partes superiores y con estrías finas de color gris obscuro en el pecho y flancos.

Vive en la zona de la puna, en laderas rocosas con escasa vegetación.

D. Tarapacá y Antofagasta

Platero ***Phrygilus alaudinus*** (Kittlitz)
Band-tailed Sierra-Finch - Schwarzfleck-Sierra-Fink

L. 13 cm. Cabeza, garganta y pecho plomos, con parte superior de la cabeza con estrías más obscuras. Manto cafesoso con estrías más obscuras. Vientre blanquecino. Cola negra con ancha banda blanca en la parte media. Pico y patas amarillos, muy vistosos. La hembra es cafesosa por encima, con estrías café más obscuras. Garganta y pecho gris cafesosos con estrías café. Parte inferior del pecho y abdomen blanquecinos. La banda blanca de la cola es más angosta. Pico amarillo córneo y patas amarillas.

Vive en lugares rocosos abiertos con matorrales no muy espesos.

D. En Chile viven dos subespecies: el Platero, *P. a. alaudinus*, desde Atacama hasta Valdivia, y el Platero peruano, *P. a. bipartitus* Zimmer, en Putre, alta cordillera de Arica. Es del mismo tamaño que la otra subespecie, pero el color plomo tiene pintas azuladas con el abdomen y las subcaudales blancas. La hembra se parece a la del Pájaro plomo.



Cometocino de Arica

Plebeyo





Platero

Diuca de alas blancas ***Diuca speculifera*** (Lafresnaye y d'Orbigny)

L. 18,5 cm. De coloración general gris cenicienta, presenta parches blancos debajo del ojo, en la garganta, el vientre, subcaudales y en las alas. Alas y cola gris obscuras, esta última con bordes blancos. Pico negro.

Vive en laderas rocosas.

D. Sólo en la alta cordillera de Arica (Tarapacá).

Diuca ***Diuca diuca*** (Molina)

L. 17,5 cm. Coloración general gris pizarra, con mancha blanca en la garganta y abdomen, sectores acanelados en el bajo vientre. Subcaudales blancas con bordes acanelados. Alas y cola negruzcas, esta última con mancha blanca en la parte terminal.

Vive en toda clase de ambientes: campos, pueblos, cerros, quebradas, bosques, jardines y plazas de ciudades.

D. En Chile viven tres subespecies: la Diuca, *D. d. diuca*, desde Coquimbo a Ultima Esperanza (Magallanes), también en isla Nueva, al sur del canal Beagle; la Diuca del norte, *D. d. crassirostris* Hellmayr, desde Antofagasta hasta el norte de Coquimbo. Se diferencia de la Diuca por tener el pico más grande, y la Diuca de Chiloé, *D. d. chiloensis* Philippi y Peña, endémica en la isla grande de Chiloé; es más pequeña en todas sus dimensiones.

Introducida en la isla de Pascua, seguramente D. d. diuca.

Yal austral ***Melanodera melanodera*** (Quoy y Gaimard)

L. 14 cm. Corona, nuca y auriculares grises. Bridas negras con raya blanca por encima. Raya blanca encima y debajo del ojo. Espalda gris olivácea y lomo oliváceo. Garganta negra con bordes blancos. Centro del pecho amarillo oliváceo con los lados grises. Vientre amarillo y coberteras subcaudales blancas. Alas con amplia zona amarilla. Cola con centro oliváceo y amarillo pálido en los lados, más clara en las puntas. La hembra tiene las partes superiores café moteadas de negruzco; el lomo es café rojizo. Las bridas son blanquecinas y las auriculares y mejillas café obscuras con estrías más obscuras. Garganta blanca y pecho amarillo pálido teñido de café. Resto de las partes inferiores amarillo pálido. Flancos blanquecinos con estrías café. Coberteras menores de las alas amarillo oliváceo; las medianas y mayores con las puntas blancas. Rémiges con bordes amarillo oliváceos. Cola café obscura, con las rectrices intermedias con bordes amarillos las laterales amarillas en su mayor parte.

Vive en la estepas y campos abiertos.

D. En la región de Magallanes, desde la provincia de Ultima Esperanza hasta la parte norte de Tierra del Fuego.



Diuca de alas blancas

Diuca



Yal austral

Yal cordillerano ***Melanodera xanthogramma*** (Gray)
Yellow-bridled Finch - Zügel-Ammerfink

L. 15 cm. Parecido al Yal austral, pero la raya sobre las bridas y en los bordes de la garganta es amarilla en vez de blanca. Las partes superiores son gris azuladas claras, con algunas manchas amarillo oliváceas. Las rectrices laterales son amarillentas. Los machos presentan dos fases de coloración; en una predomina el amarillo verdoso en las partes superiores y en las rectrices externas, y en la otra predomina el gris azulado por encima y el amarillento en las rectrices externas. La hembra es completamente distinta al macho. La cabeza es variegada de negruzco y café amarillento. Resto de las partes superiores con plumas café negruzcas y bordes amarillentos. Alas y cola con bordes amarillos. Partes inferiores amarillas o blanquecinas con estrías café.

Vive en estepas y campos abiertos. Más al norte, en la cordillera.

D. Dos subespecies viven en Chile: el Yal cordillerano austral, *M. x. xanthogramma*. en el sur de Tierra del Fuego, archipiélagos fueguinos y del cabo de Hornos, y el Yal cordillerano, *M. x. barrosi Chapman*, desde la provincia de Los Andes (Valparaíso) hasta la laguna del Laja, provincia de Bío-Bío (Concepción). Se diferencia de la otra subespecie por tener el pico más largo y grueso, el pecho más amarillento y las marcas de las rectrices laterales blancas en vez de amarillas.

Pizarrita ***Xenospingus concolor*** (Lafresnaye y d'Orbigny)
Slender-billed Finch - Feinschnabel-Ammerfink

L. 12 cm. Partes superiores gris pizarra e inferiores del mismo color pero más claras, con el centro del abdomen blanquecino. Frente y bridas negras. Alas y cola gris cafesosas. Pico y patas amarillas muy vistosas. La hembra es más pequeña con las partes superiores más obscuras.

Vive en terrenos arbustivos, matorrales, totorales y potreros.

D. Desde el límite con Perú hasta el río Loa.

Jilguero grande ***Carduelis crassirostris*** (Landbeck)
Thick-billed Siskin - Dickschnabel-Zeisig

L. 14 cm. Cabeza y garganta negras. Partes inferiores, banda lateral del cuello y lomo amarillo canario. Partes superiores oliva amarillentas con estrías café obscuras. Parte inferior del abdomen grisácea. Alas y cola negro cafesosas, con base de las rémiges y rectrices amarillas. Pico grueso, carácter que lo distingue de los otros jilgueros que viven en Chile. La hembra es menos vistosa que el macho y carece de capuchón negro. Las partes superiores son gris cafesosas con lomo amarillo y las inferiores grisáceas, más claras en el abdomen. Alas y cola similares al macho, algo más claras.

Vive en zonas cordilleranas.

D. Provincia de Los Andes y región Metropolitana de Santiago.



Yal cordillerano



Pizarrita



Jilguero grande

Jilguero peruano ***Carduelis magellanica*** (Vieillot)
Hooded Siskin - Magellan-Zeisig

L. 14 cm. Cabeza y parte alta de la garganta de color negro. Partes superiores amarillas con estrías cafesosas y lomo amarillo intenso. Partes inferiores amarillo canario. Alas negras con banda amarilla. Cola negra con base amarilla y plumas centrales negras. La hembra carece de negro en la cabeza. Las partes superiores son verdes variegadas de negruzco. Partes inferiores amarillo verdosas con el bajo vientre amarillo blanquecino. El amarillo de las alas es menos visible y las rectrices menos amarillas.

Vive en laderas y quebradas arbustivas.

D. Cordillera de Tarapacá. entre los 2.000 y 4.000 m. Un ejemplar capturado en el salar de Pedernales (Atacama).

Jilguero negro ***Carduelis atratus*** Lafresnaye y d'Orbigny
Black Siskin - Schwarz-Zeisig

L. 15 cm. De color general negro, con centro del abdomen y coberteras subcaudales amarillo brillante. Rémiges con base amarilla formando dos espéculos. Cola negra con base amarilla y plumas centrales negras. La hembra es negro cafesosa con las zonas amarillas menos intensas.

Vive en laderas rocosas arbustivas.

D. Alta cordillera de Tarapacá y Antofagasta. Ocasionalmente en la cordillera de las provincias de Los Andes y Colchagua. Debe presentarse en la región intermedia.

Jilguero cordillerano ***Carduelis uropygialis*** (Sclater)
Yellow-rumped Siskin - Cordilleren-Zeisig

L. 14 cm. Cabeza, cuello y partes superiores negras, a veces con las plumas del dorso finamente bordeadas de amarillo verdoso. Lomo, pecho, abdomen y subcaudales amarillo canario; supracaudales amarillas con manchas negras. Alas negras con ancha banda amarilla. Cola gris obscura con base amarilla y plumas centrales gris obscuras. La hembra es de un negro menos intenso y el amarillo es más pálido.

Vive en quebradas y laderas arbustivas.

D. Cordilleras de Atacama a provincia de Biobío (Concepción). Ocasionalmente en la cordillera de Arica.



Jilguero peruano



Jilguero negro



Jilguero cordillerano

Jilguero ***Carduelis barbatus*** (Molina)
Black-chinned Siskin - Bartzeisig

L. 13,5 cm. Corona, centro de la garganta y parte anterior del cuello negros. Auriculares gris cafesosas. Partes superiores amarillo oliváceo con estrías más obscuras; lomo amarillo oliváceo claro. Partes inferiores verde amarillentas con el centro del abdomen blanquecino. Ala negra con banda amarilla. Cola negra con base amarilla. La hembra no tiene la corona ni el mentón negros y las partes inferiores son verdosas.

Vive en bosques y matorrales.

D. Desde el valle de Huasco (Atacama) hasta el cabo de Hornos.

GORRIONES FAMILIA PASSERIDAE

Son aves de tamaño más bien chico con el plumaje en que predominan los grises, cafés y negros. Presentan dimorfismo sexual. Tienen tendencia a vivir asociados con el hombre, habitando en edificios y alimentándose de los restos de cocina.

Gorrión ***Passer domesticus*** (Linné)
House Sparrow - Haussperling

L. 14.5 cm. Parte superior de la cabeza gris olivácea; manto estriado con castaño y negro; lomo gris oliváceo. Garganta y parte superior del pecho negras; resto de las partes inferiores blanco sucio y flancos grises. Se destaca una mancha castaño obscuro que parte detrás del ojo, y se ensancha hacia atrás. Pico corto y grueso. La hembra y los jóvenes tienen estrías café en las partes superiores y falta la coloración llamativa del macho.

Se le encuentra en casi todos los hábitat.

D. Desde Arica hasta Tierra del Fuego. También en el archipiélago Juan Fernández e isla de Pascua. Ave originaria de Europa.



Jilguero

Gorrión



GLOSARIO

ANILLO PERIOCULAR	Anillo alrededor del ojo.
ANTE (color)	Amarillo obscuro.
AXILARES	Plumas de las axilas, bajo las escapulares.
AZUL JACINTO (color)	Azul tirando a violado.
BANDA MOSTACHAL	Es la que tiene su origen en la base del pico y se dirige hacia atrás.
BANDA OCCIPITAL	Es la que está colocada en la zona de la nuca.
BANDA PECTORAL	Es la que cruza el pecho, de lado a lado.
BERMELLÓN (color)	Rojo brillante.
CANELA (color)	Café amarillento.
CAPUCHÓN	Plumaje de la cabeza cuyo color contrasta con el del resto del cuerpo.
CARMESÍ (color)	Rojo que tira a morado.
CARÚNCULA	Excrecencia carnosa, usualmente en la cabeza y cuello, de colores brillantes.
CASTAÑO (color)	Café rojizo.
COMISURA	La línea de unión entre la maxila y mandíbula, vistas lateralmente.
CULMEN	Arista superior de la maxila.
DIMORFISMO SEXUAL	Diferencia de tamaño y coloración entre el macho y la hembra.
	Lo que está más distante del eje o línea media o del arranque de un miembro u otra estructura.
DOBLEZ DEL ALA	Parte de ese apéndice que corresponde a la muñeca.
ERITRISMO	Estado del plumaje caracterizado por una cantidad anormal de coloración roja.
ESCUDO FRONTAL	Prolongación del pico hacia la frente, en forma de disco u ojiva.

FALCIFORME	En forma de hoz o echona.
GRIS PLÚMBEO (color)	El color gris del metal plomo.
IRIDISCENTE	Dícese de ciertas plumas que dan reflejos de variados colores.
LAMINILLAS O LAMELAS	Pequeñas placas que están en el borde del pico de algunas aves.
LEONADO (color)	Amarillo cafesoso obscuro.
MANO	Parte del ala que lleva las plumas primarias.
MELANISMO	Plumaje inusualmente obscuro debido al aumento de pigmento negro (melanina).
OCRE (color)	Rojo tostado.
PLUMÓN	Pequeñas plumas que cubren a los pollos o que están bajo el plumaje de los adultos.
PIZARRA (color)	Negro azulado.
PROXIMAL	Lo que está más próximo del eje o línea media o del arranque de un miembro u otro apéndice.
PÚRPURA (color)	Rojo subido con algo de violado.
ROJO CARMÍN (color)	Rojo vivo.
RUFO, RUFESCENTE (color)	Café rojizo.
SEMIPALMADO	Con los tres dedos frontales unidos en su parte basal por una membrana.
SUBALARES	Debajo de las alas.
VARIEGADAS	De distintos colores dispuestos de manera heterogénea.
VERMICULADO	Con líneas transversales finas y de forma ondulada o zigzagueante.

ÍNDICE DE NOMBRES COMUNES

Aguila 136
  pescadora 134
Aguilucho 138
  chico 140
  de cola rojiza 138
  de la puna 138
Albatros de Buller 40
  de cabeza gris 40
  de ceja negra 38
  de frente blanca 40
  errante 38
  obscuro 42
  obscuro de manto claro 42
  real 38
Ave del trópico de cola blanca 82
  de cola roja 82
  de pico rojo 82
Ave fragata 94
  fragata grande 94

Bailarín 136
Bailarín chico 334
  chico argentino 334
  chico peruano 334
Bandurria 102
Bandurrilla 270
  de Arica 270
  de la puna 272
  de las piedras 272
  de pico recto 272
Batitú 194
Becacina 198
  de la puna 198
  grande 200
  pintada 182
Benteveo 310
  blanco y negro 310
  chico 310
Blanquillo 34

Cachaña 240
Cachudito 314
  de cresta blanca 316
  de Juan Fernández 314
  del norte 314
Caiquén 114
Caití 178
Canastero 282
  chico 282
  de cola larga 284
  del norte 284
  del sur 284
Canquén 112
  colorado 112
Caranca 114
Carancho cordillerano 144
  cordillerano del sur 144
  negro 146
Carpinterito 262
Carpintero 264
Cazamoscas de cola corta 304
  chocolate 296
  picochato 308
  tijereta 312
Cernícalo 148
Cigüeña de cabeza pelada 106
Cisne coscoroba 110
  de cuello negro 110
Codorniz 152
Colegial 304

Colilarga 278
Comesebo de los tamarugales 338
chico 338
grande 286
negro 344
Cometocino de Arica 360
de dorso castaño 358
de Gay 356
del norte 356
patagónico 356
Concón 248
Cóndor 130
Corbatita 342
Cormorán de las Malvinas 92
de las rocas 90
imperial 92
Cuclillo de pico negro 242
Cuervo de pantano 102
de pantano de la puna 102
Charlatán 354
Chercán 326
de las vegas 326
Chincol 348
Chiricoca 274
Chirihue 348
austral 346
cordillerano 344
dorado 346
verdoso 346
Chorlito cordillerano 174
Chorlo ártico 166
cabezón 164
chileno 172
de campo 172
de collar 170
de doble collar 170
de la puna 170
de Magallanes 174
dorado 168
gritón 172
nevado 168
semipalmado 168
Choroy 240
Chucao 290
Chuncho 246
del norte 246
Churrete 274
acanelado 276
austral 276
costero 274
chico 276
de alas blancas 278
Churrín 292
de la Mocha 290
Diuca 362
de alas blancas 362
Diucón 296
Dormilona cenicienta 302
chica 304
de ceja blanca 298
de frente negra 300
de la puna 298
de nuca rojiza 298
fraile 300
gigante 302
rufa 300
tontita 302
Espátula 104
Faisán 152
Fardela atlántica 64
blanca 60
blanca de Juan Fernández 48
blanca de Más a Tierra 48
capirotada 60
chica 62
de alas grandes 52
de dorso gris 62
de Fénix **50**

de frente blanca 52
de Kerguelen 54
de Más Afuera 48
de Nueva Zelanda 60
de Pascua 64
gris 58
heráldica 50
moteada 52
negra 62
negra de Juan Fernández 50
negra de patas pálidas 64
negra grande 58

Fío-fío 308
Flamenco chileno 108

Gallina ciega 250
ciega peruana 250

Garcita azulada 98
Garza azul 98
boyera 98
chica 96
cuca 96
grande 96

Gaviota andina 216
austral 214
cáhuil 218
de Franklin 216
de las Galápagos 218
de Sabine 218
dominicana 216
garuma 214
peruana 214

Gaviotín albo 228
antártico 222
apizarrado 224
ártico 222
boreal 220
chico 226
de bridas 224
de San Ambrosio 230
de San Félix 228
de Sandwich 226
elegante 226
monja 228
negro 220
pascuense 224
piquerito 222
sudamericano 220

Golondrina barranquera 322
bermeja 322
chilena 320
de dorso negro 320
de los riscos 322
grande 324
negra 320
de mar 66
de mar chica 66
de mar de collar 70
de mar de garganta blanca 68
de mar de vientre blanco 68
de mar de vientre negro 68
de mar negra 70
de mar peruana 70
de mar subantártica 66

Gorrión 368
Guanay 90

Halcón pálido 148
perdiguero 148
peregrino 146
reidor 150

Huairavillo 100

Huairavo 100
Huala 36
Hued-hued castaño 288
del sur 288

Jacana 180
Jilguero 368
cordillerano 366
grande 364

negro 366
peruano 366

Jote de cabeza amarilla 132
de cabeza colorada 130
de cabeza negra 130

Lechuza 244
Lile 92
Loica 352
argentina 354
peruana 352

Martín pescador 260
pescador chico 260

Matacaballos 242
Mero 294
de la puna 296
de Tarapacá 294
gaucho 294

Minero 268
austral 270
cordillerano 268
chico 266
de la puna 268
grande 266

Mirlo 350
Monjita americana 336

Naranjero 338
Negrillo 342
Nuco 248

Ñandú 32

Pájaro amarillo 312
plomo 358

Paloma 232
antártica 208
de alas blancas 232

Parina chica 108
grande 108

Pato anteojillo 118
capuchino 124
castaño 124
colorado 120
cortacorrientes 122
criollo 126
cuchara 122
de alas azules 120
gargantillo 120
jergón chico 118
jergón grande 124
juarjual 116
negro 122
puna 126
rana de pico ancho 126
rana de pico delgado 128
real 118
rinconera 128
silbón 110

Pelícano 88
Pepitero 340
Pequén 248
Perdicita 206
cojón 204
cordillerana 204
cordillerana austral 204

Perdiz 28
austral 30
copetona 30
cordillerana 28
cordillerana de Arica 28
de la puna 30

Perico cordillerano 242
Perrito 178
Petrel antártico 46
azulado 54
de las nieves 46
gigante antártico 44

gigante subantártico 44
moteado 46
—paloma antártico 56
—paloma chico 58
—paloma de pico ancho 56
—paloma de pico delgado 56
plateado 44
Peuco 140
Peuquito 136
Picaflor 256
cordillerano 254
de Arica 258
de Cora 258
de Juan Fernández 256
de la puna 254
del norte 256
gigante 254
Picurio 34
Pidén 154
austral 154
moteado 154
Pidencito 156
Pilpilén 176
austral 176
negro 176
Pillo 106
Pimpollo 34
Pingüino antártico 76
de Adelia 76
de Humboldt 78
de Magallanes 80
de penacho amarillo 78
emperador 74
macaroni 78
papua 76
rey 74
Piquero 84
blanco 84
café 86
de patas azules 84
Piranga 340
Pitajo gris 306
rojizo 306
Pitío 262
del norte 262
Pitotoy chico 184
grande 184
solitario 184
Piuquén 112
Pizarrita 364
Platero 360
Playero ártico 188
blanco 194
de Baird 190
de las rompientes 188
de lomo blanco 190
de patas largas 194
enano 190
grande 188
gris 186
manchado 186
occidental 192
pectoral 192
semipalmado 192
vuelvepiedras 186
Plebeyo 360
Pollito de mar boreal 202
de mar rojizo 202
de mar tricolor 202
Queltehue 166
de la puna 166
Quetru no volador 116
volador 116
Rara 318
Rayadito 278
de Más Afuera 280
Rayador 230
Run-run 306

Saca-tu-real 308
Salteador chico 212
chileno 210
de cola larga 212
pardo 210
polar 210
pomarino 212
Semillero 342
peruano 344
Siete-colores 312

Tagua 158
americana 158
cornuda 162
chica 160
de frente roja 160
gigante 160
Tagüita 156
del norte 156
purpúrea 158
Tapaculo 290
Tenca 332
de alas blancas 332
patagónica 332
Tijeral 282
listado 280
Tiuque 144
Torcaza 232
Tordo 350
bayo 350
Tórtola 234
cordillerana 238
Tortolita boliviana 236
cuyana 234
de la puna 236
quiguagua 236
rojiza 234
Trabajador 280
Traro 146
Tricahue 240
Trile 352
Tucúquere 246
Turca 288

Vari 140
huevetero 142
Vencejo chico 252
de chimenea 252
Verderón de ojos rojos 336
Viudita 316

Yal 358
austral 362
cordillerano 364
Yeco 90
Yunco 72
de los canales 72
de Magallanes 72

Zarapito 196
boreal 196
de pico recto 196
moteado 198
Zorzal 328
argentino 330
negro 328
tropical 328

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Accipiter bicolor 136
Accipitridae 134
Accipitrinae 136
Actitis macularia 186
Aeronautes andecolus 252
Agelaius thilius 352
Agriornis albicauda 296
  livida 294
  microptera 294
  montana 294
Ajaia ajaja 104
Alcedinidae 260
Anairetes fernandezianus 314
  flavirostris 314
  parulus 314
  reguloides 316
  Anas bahamensis 120
  cyanoptera 120
  discors 120
  flavirostris 118
  georgica 124
  platalea 122
  puna 126
  sibilatrix 118
  specularis 118
  versicolor 124
Anatidae 110
Anatinae 116
Anous stolidus 228
Anserinae 110
Anthus correndera 334
  hellmayri 334
  lutescens 334
Aphrastura masafuerae 280
  spinicauda 278
Aphriza virgata 188
Apodidae 252
Aptenodytes forsteri 74
  patagonica 74
Ardea cocoi 96
Ardeidae 96
Arenaria interpres 186
Asio flammeus 248
Athene cunicularia 248
Attagis gayi 204
  malouinus 204

Bartramia longicauda 194
Bolborhynchus aurifrons 242
Bubo virginianus 246
Bulbucus ibis 98
Burhinidae 164
Burhinus superciliaris 164
Buteo albigula 140
  poecilochrous 138
  polyosoma 138
  ventralis 138
Butorides striatus 98

Cairina moschata 126
Calidris alba 194
  bairdii 190
  canutus 188
  fuscicollis 190
  himantopus 194
  mauri 192
  melanotos 192
  minutilla 190
  pusilla 192

Callipepla californica 152
Campephilus magellanicus 264
Caprimulgidae 250
Caprimulgus longirostris 250
Cardinalinae 340
Carduelis atratus 366
barbatus 368
crassirostris 364
magellanica 366
uropygialis 366
Casmerodius albus 96
Catamenia analis 342
inornata 344
Catharacta chilensis 210
lonnbergi 210
maccormicki 210
Cathartes aura 130
burrovianus 132
Cathartidae 130
Catharus fuscescens 328
Catoptrophorus semipalmatus 188
Ceryle torquata 260
Ciconiidae 106
Cinclodes antarcticus 276
atacamensis 278
fuscus 276
nigrofumosus 274
oustaleti 276
patagonicus 274
Circus buffoni 142
cinereus 140
Cistothorus platensis 326
Coccyzus melacoryphus 242
Colaptes pitius 262
rupicola 262
Colorhamphus parvirostris 316
Columba araucana 232
livia 232
Columbidae 232
Columbina cruziana 236
picui 234
talpacoti 234
Conirostrum cinereum 338
tamarugense 338
Coragyps atratus 130
Coscoroba coscoroba 110
Creagrus furcatus 218
Crotophaga sulcirostris 242
Cuculidae 242
Curaeus curaeus 350
Cyanoliseus patagonus 240
Cygnus melancoryphus 110
Chaetura pelagica 252
Charadriidae 166
Charadrius alexandrinus 168
alticola 170
collaris 170
falklandicus 170
semipalmatus 168
vociferus 172
Chilia melanura 274
Chionididae 208
Chionis alba 208
Chlidonias niger 220
Chloephaga hybrida 114
melanoptera 112
picta 114
poliocephala 112
rubidiceps 112
Chloroceryle americana 260
Chordeiles acutipennis 250

Daption capense 46
Dendrocygna bicolor 110
Dendroica striata 336
Diglossa carbonaria 344
Diomedea bulleri 40
cauta 40
chrysostoma 40
epomophora 38
exulans 38
melanophris 38
Diomedeidae 38
Diuca diuca 362
speculifera 362
Dolichonyx oryzivorus 354

Egretta caerulea 98
thula 96
Elaenia albiceps 308
Elanus leucurus 136
Emberizidae 336
Emberizinae 342
Enicognathus ferrugineus 240
leptorhynchus 240
Eudromia elegans 30
Eudyptes chrysolophus 78
crestatus 78
Eugralla paradoxa 290
Eulidia yarrellii 258
Euxenura maguari 106

Falco femoralis 148
kreyenborgi 148
peregrinus 146
sparverius 148
Falconidae 144
Fregata magnificens 94
minor 94
Fregatidae 94
Fregetta grallaria 68
tropica 68
Fringillidae 356
Fulica americana 158
armillata 158
cornuta 162
gigantea 160
leucoptera 160
rufifrons 160
Fulmarus glacialoides 44
Fumariidae 266

Gallinago andina 198
gallinago 198
stricklandii 200
Gallinula chloropus 156
Garrodia nereis 66
Geositta antarctica 270
cunicularia 268
isabellina 266
maritima 266
punensis 268
rufipennis 268
Geranoaetus melanoleucus 136
Glaucidium brasilianum 246
nanum 246
Gygis alba 228

Haematopodidae 176
Haematopus ater 176
leucopodus 176
palliatus 176
Halobaena caerulea 54
Herpetotheres cachinnans 150
Heteronetta atricapilla 128
Heteroscelus incanus 186
Himantopus mexicanus 178
Hirundinidae 320

Hirundo andecola 322
pyrrhonota 324
rustica 322
Hymenops perspicillata 306

Icterinae 350
Ixobrychus involucris 100

Jacana jacana 180
Jacanidae 180

Laridae 210
Larinae 214
Larosterna inca 228
Larus belcheri 214
dominicanus 216
maculipennis 218
modestus 214
pipixcan 216
scoresbii 214
serranus 216
Laterallus jamaicensis 156
Leptasthenura aegithaloides 282
striata 280
Lessonia rufa 304
Limosa fedoa 198
haemastica 196
Lophonetta specularioides 116

Macronectes giganteus 44
halli 44
Melanodera melanodera 362
xanthogramma 364
Merganetta armata 122
Metriopelia aymara 236
ceciliae 236
melanoptera 238
Milvago chimango 144
Mimidae 332
Mimus patagonicus 332
thenca 332
triurus 332
Molothrus badius 350
bonariensis 350
Motacillidae 334
Muscigralla brevicauda 304
Muscisaxicola albifrons 302
albilora 298
alpina 302
capistrata 300
flavinucha 300
frontalis 300
juninensis 298
macloviana 302
maculirostris 304
rufivertex 298
Muscicapidae 328
Mycteria americana 106
Myiodynastes maculatus 310
Myiophobus fasciatus 308

Neoxolmis rufiventris 296
Nesofregetta albigularis 68
Netta erythrophthalma 124
peposaca 122
Nothoprocta ornata 28
pentlandii 28
perdicaria 28
Numenius borealis 196
phaeopus 196
Nycticorax nycticorax 100
Nycticryphes semicollaris 182

Oceanites gracilis 66
oceanicus 66
Oceanitidae 66

Oceanodroma hornbyi 70
markhami 70
tethys 70
Ochthoeca leucophrys 306
oenanthoides 306
Oreopholus ruficollis 172
Oreotrochilus estella 254
leucopleurus 254
Oxyura jamaicensis 126
vittata 128

Pachyptila belcheri 56
desolata 56
salvini 56
turtur 58
Pagodroma nivea 46
Pandion haliaetus 134
Pandioninae 134
Parabuteo unicinctus 140
Parulinae 336
Passer domesticus 368
Passeridae 368
Patagona gigas 254
Pelecanidae 88
Pelecanoides garnotii 72
magellani 72
urinatrix 72
Pelecanoididae 72
Pelecanus thagus 88
Phaethon aethereus 82
lepturus 82
rubricauda 82
Phaethontidae 82
Phalacrocorax albiventer 92
atriceps 92
bougainvillii 90
gaimardi 92
magellanicus 90
olivaceus 90
Phalacrocoracidae 90
Phalaropodinae 202
Phalaropus fulicaria 202
lobatus 202
tricolor 202
Phalcoboenus albogularis 144
australis 146
megalopterus 144
Phasianidae 152
Phasianus colchicus 152
Phegornis mitchellii 174
Phleocryptes melanops 280
Phoebetria fusca 42
palpebrata 42
Phoenicoparrus andinus 108
jamesi 108
Phoenicopteridae 108
Phoenicopterus chilensis 108
Phrygilus alaudinus 360
atriceps 356
dorsalis 358
erythronotus 360
fruticeti 358
gayi 356
patagonicus 356
plebejus 360
unicolor 358
Phytotoma rara 318
Phytotomidae 318
Picidae 262
Picoides lignarius 262
Piranga rubra 340
Pitangus sulphuratus 310
Plataleinae 104
Plegadis chihi 102
ridgwayi 102
Pluvialis dominica 168
squatarola 166
Pluvianellus socialis 174

Podiceps major 36
occipitalis 34
rolland 34
Podicipedidae 34
Podilymbus podiceps 34
Polyborus plancus 146
Porphyriops melanops 156
Porphyrula martinica 158
Procelsterna cerulea 230
Procellaria aequinoctialis 58
cinerea 58
westlandica 60
Procellariidae 44
Progne modesta 320
Pseudocolopteryx flaviventris 312
Psittacidae 240
Pterocnemia pennata 32
Pterodroma alba 50
arminjoniana 50
brevirostris 54
cooki 48
externa 48
inexpectata 52
lessoni 52
longirostris 48
macroptera 52
neglecta 50
Pteroptochos castaneus 288
megapodius 288
tarnii 288
Puffinus assimilis 62
bulleri 62
carneipes 64
creatopus 60
gravis 60
griseus 62
nativitatis 64
puffinus 64
Pygarrhichas albogularis 286
Pygochelidon cyanoleuca 320
Pygoscelis adeliae 76
antarctica 76
papua 76
Pyrocephalus rubinus 308
Pyrope pyrope 296

Rallidae 154
Rallus antarcticus 154
maculatus 154
sanguinolentus 154
Recurvirostra andina 178
Recurvirostridae 178
Rheidae 32
Rhinocryptidae 288
Rhodopis vesper 256
Riparia riparia 322
Rostratulidae 182
Rynchopinae 230
Rynchops niger 230

Saltator aurantiirostris 340
Scelorchilus albicollis 290
rubecula 290
Scolopacidae 184
Scolopacinae 184
Scytalopus magellanicus 292
Sephanoides fernandensis 256
galeritus 256
Sicalis auriventris 346
lebruni 346
luteola 348
olivascens 346
uropygialis 344
Spheniscidae 74
Spheniscus humboldti 78
magellanicus 80

Sporophila telasco 342
Stercorariinae 210
Stercorarius longicaudus 212
parasiticus 212
pomarinus 212
Sterna anaethetus 224
elegans 226
fuscata 224
hirundinacea 220
hirundo 220
lorata 226
lunata 224
paradisaea 222
sanvicensis 226
trudeaui 222
vittata 222
Sterninae 220
Strigidae 246
Strix rufipes 248
Sturnella bellicosa 352
loyca 352
superciliaris 354
Sula dactylatra 84
leucogaster 86
nebouxii 84
variegata 84
Sulidae 84
Sylviorthorhynchus desmursii 278

Tachuris rubrigastra 312
Tachycineta leucopyga 320
Tachyeres patachonicus 116
pteneres
Thalassoica antarctica 46
Thaumastura cora 258
Theristicus caudatus 102
Thinocoridae 204
Thinocorus orbignyianus 204
rumicivorus 206
Thraupinae 338
Thraupis bonariensis 338
Threskiornithidae 102
Threskiornithinae 102
Thripophaga anthoides 284
dorbignyi 284
humicola 282
modesta 282
pyrrholeuca 284
Tinamidae 28
Tinamotis ingoufi 30
pentlandii 30
Tringa flavipes 184
melanoleuca 184
solitaria 184
Trochilidae 254
Troglodytes aedon 326
Troglodytidae 326
Turdinae 328
Turdus amaurochalinus 330
chiguanco 328
falcklandii 328
Tyrannidae 294
Tyrannus savana 312
tyrannus 310
Tyto alba 244
Tytonidae 244

Upucerthia albigula 270
andaecola 272
dumetaria 270
ruficauda 272
validirostris 272

Vanellus chilensis 166
resplendens 166
Vireo olivaceus 336
Vireonidae 336

Volatinia jacarina 342
Vultur gryphus 130

Xema sabini 218
Xenospingus concolor 364

Zenaida asiatica 232
auriculata 234
Zonibyx modestus 172
Zonotrichia capensis 348

INDEX

Albatross, Black-browed 38
Buller's 40
Gray-headed 40
Light-mantled 42
Royal 38
Sooty 42
Wandering 38
White-capped 40
Ani, Groove-billed 242
Avocet, Andean 178

Bittern, Stripe-backed 100
Blackbird, Austral 350
White-browed 354
Yellow-winged 352
Booby, Blue-footed 84
Brown 86
Masked 84
Peruvian 84
Bobolink 354
Buzzard-Eagle,
Black-chested 136
284
Austral, Canastero 282
Cordilleran 284
Creamy-breasted 282
Dusky-tailed 284
Lesser 144
Chimango Caracara 146
Crested 144
Mountain 146
Striated 144
White-throated 306
Chat-Tyrant, d'Orbigny's 306
White-browed 274
Crag Chilia 276
Cinclodes, Bar-winged 276
Blackish 274
Dark-bellied 276
Gray-flanked 274
Seaside 278
White-winged 130
Condor, Andean 338
Conebill, Cinereous 338
Tamarugo 158
Coot, American 160
Giant 162
Horned 160
Red-fronted 160
Red-gartered 158
Cormorant, Blue-eyed 92
Guanay 90
King 92
Magellan 90
Olivaceous 90
Red-legged 92
Cowbird, Shiny 350
Bay-winged 350
Crake, Black 156
Cuckoo, Dark-billed 242
Curlew, Eskimo 196

Diuca-Finch, Common 362
White-winged 362
Diucon, Fire-eyed 296
Diving-Petrel, Magellan 72

Peruvian 72
Subantarctic 72
Dotterel, Rufous-chested 172
Tawny-throated 172
Dove, Bare-faced 236
Eared 234
Rock 232
White-winged 232
Duck, Black-headed 128
Bronze-winged 118
Crested 116
Lake 128
Muscovy 126
Ruddy 126
Torrent 122
Whistling 110

Earthcreeper, Buff-breasted 272
Rock 272
Scale-throated 270
Straight-billed 272
White-throated 270
Egret, Cattle 98
Great 96
Snowy 96
Elaenia, White-crested 308

Falcon, Aplomado 148
Laughing 150
Pallid 148
Peregrine 146
Field-Tyrant, Short-tailed 304
Finch, Black-throated 362
Slender-billed 364
Yellow-bridled 364
Firecrown, Green backed 256
Juan Fernández 256
Flamingo, Andean 108
Chilean 108
Puna 108
Flicker, Andean 262
Chilean 262
Flower-Piercer, Coal-black 344
Flycatcher, Bran-colored 308
Fork-tailed 312
Streaked 310
Vermilion 308
Frigatebird, Great 94
Magnificent 94
Fulmar, Southern 44

Gallinule, Common 156
Purple 158
Spot-flanked 156
Giant Petrel, Northern 44
Southern 44

Godwit, Hudsonian 196
Marbled 198
Goose, Andean 112
Ashy-headed 112
Kelp 114
Ruddy-headed 112
Upland 114
Grassquit, Blue-black 342
Grebe, Great 35
Pied-billed 34
Silvery 34
White-tufted 34
Ground Dove, Black-winged 238
Croaking 236

Golden-spotted 236
Picui 234
Ruddy 234
Ground-tyrant,
Black-fronted 300
Cinnamon-bellied 300
Dark-facer 302
Ochre-naped 300
Plain-capped 302
Puna 298
Rufous-naped 298
Spot-billed 304
White-browed 298
White-fronted 302
Gull, Andean 216
Brown-hooded 218
Dolphin 214
Franklin's 216
Grey 214
Kelp 216
Sabine's 218
Simeon 214
Swallow-tailed 218
Harrier, Cinereous 140
Long-winged 142
Hawk, Bay-winged 140
Bicolored 136
Puna 138
Red-backed 138
Rufous-tailed 138
White-throated 140
Heron, Little Blue 98
Striated 98
White-necked 96
Hillstar, Andean 254
White-sided 254
Huet-huet, Black-throated 288
Chestnut-throated 288
Hummingbird, Giant 254
Oasis 256

Ibis, Buff-necked 102
Puna 102
White-faced 102

Jacana, Wattled 180
Jaeger, Long-tailed 212
Parasitic 212
Pomarine 212

Kestrel, American 148
Killdeer 172
Kingbird, Eastern 310
Kingfisher, Green 260
Ringed 260
Kiskadee, Great 310
Kite, White-tailed 136
Knot, Red 188

Lapwing, Andean 166
Southern 166

Martin, Southern 320
Meadowlark, Long-tailed 352
Peruvian Red-breasted 352
Miner, Common 268
Creamy-rumped 266
Grayish 266
Puna 268
Rufous-banded 268
Short-billed 270
Mockingbird, Chilean 332
Patagonian 332
White-banded 332

Negrito, Rufous-backed 304
Heron, Black-crowned Night 100
Nigthawk, Lesser 250
Nightjar, Band-winged 250
Noddy, Brown 228

Osprey 134
Owl, Barn 244
Burrowing 248
Great Horned 246
Rufous-legged 248
Short-eared 248
Oystercatcher, American 176
Black 176
Magellanic 176

Painted Snipe, South American 182
Parakeet, Austral 240
Mountain 242
Slender-billed 240
Parrot, Burrowing 240
Pelican, Chilean 88

Penguin, Adelie 76
Chinstrap 76
Emperor 74
Gentoo 76
Humboldt 78
King 74
Macaroni 78
Magellanic 80
Rockhopper 78
Petrel, Antarctic 46
Blue 54
Brown 58
Cook's 48
Great-winged 52
Herald 50
Juan Fernández 48
Kerguelen 54
Kermadec 50
Mottled 52
Phoenix 50
Pintado 46
Snow 46
Stejneger's 48
Westland 60
White-chinned 58
White-headed 52
Phalarope, Northern 202
Red 202
Wilson's 202
Pheasant, Common 152
Pigeon, Chilean 232
Pintail, Bahama 120
Brown 124
Pipit, Correndera 334
Hellmayr's 334
Yellowish 334
Plantcutter, Rufous-tailed 318
Plover, Black-bellied 166
Collared 170
Diademed Sandpiper 174
Golden 168
Magellanic 174
Puna 170
Semipalmated 168
Snowy 168
Two-banded 170
Pochard, Rosy-billed 122
South American 124

Prion, Antarctic 56
Fairy 58
Narrow-billed 56
Salvin's 56
Pygmy Owl, Austral 246
Ferruginous 246

Quail, California 152
Rail, Austral 154
Plumbeous 154
Spotted 154
Rayadito, Más Afuera 280
Thorn-tailed 278
Rhea, Lesser 32
Rushbird, Wren-like 280
Rush-Tyrant, Many-colored 312

Saltator, Golden-billed 340
Sanderling 194
Sandpiper, Baird's 190
Least 190
Pectoral 192
Semipalmated 192
Solitary 184
Spotted 186
Stilt 194
Upland 194
Western 192
White-rumped 190
Seedeater, Band-tailed 342
Chesnut-throated 342
Plain-colored 344
Seedsnipe, Gray-breasted 204
Least 206
Rufous-bellied 204
Whitp-hellied 204
Sheartail, Peruvian 258
Shearwater, Christmas 64
Flesh-footed 64
Greater 60
Little 62
Manx 64
New Zealand 62
Pink-footed 60
Sooty 62
Sheathbill, Snowy 208
Shoveler, Red 122
Shrike-Tyrant, Black-billed 294
Gray-bellied 294
Great 294
White-tailed 296
Sierra-Finch, Ash-breasted 360
Band-tailed 360
Black-hooded 356
Gray-hooded 356
Mourning 358
Patagonian 356
Plumbeous 358
Red-backed 358
White-throated 360
Siskin, Black-chinned 368
Black 366
Hooded 366
Thick-billed 364
Yellow-rumped 366
Skimmer, Black 230
Skua, Brown 210
Chilean 210
South Polar 210

Snipe, Common 198
Cordilleran 200

Puna 198
Sparrow, House 368
Rufous-collared 348
Spoonbill, Roseate 104
Steamer Duck, Flying 116
Magellanic Flightless 116
Stilt, Common 178
Stork, Maguan 106
Wood 106
Storm-Petrel, Black-bellied 68
Elliot's 66
Gray-backed 66
Hornby's 70
Markham's 70
Peruvian 70
White-bellied 68
White-throated 68
Wilson's 66
Surf-bird 188
Swallow, Andean 322
Bank 322
Barn 322
Blue and white 320
Chilean 320
Cliff 324
Swan, Black-necked 110
Coscoroba 110
Swift, Andean 252
Chimney 252

Tanager, Blue-and-yellow 338
Summer 340
Tapaculo, Andean 292
Chucao 290
Ochre-flanked 290
White-throated 290
Tattler, Wandering 186
Teal, Blue-winged 120
Chilean 118
Cinnamon 120
Puna 126
Silver 124
Tern, Antarctic 222
Arctic 222
Black 220
Bridled 224
Common 220
Elegant 226
Gray-backed 224
Inca 228
Peruvian 226
Sandwich 226
Snowy-crowned 222
Sooty 224
South American 220
White 228
Ternlet, Gray 230
Thick-knee, Peruvian 164
Trush, Austral 328
Chiguanco 328
Creamy-bellied 330
Tinamou, Andean 28
Chilean 28
Elegant 30
Ornate 28
Patagonian 30
Puna 30
Tit-spinetail, Plain-manted 282
Streaked 280
Tit-Tyrant, Juan Fernández 314
Pied-crested 316
Tufted 314
Yellow-billed 314

Treerunner, White-throated 286
Tropicbird, Red-billed 82
Red-tailed 82
White-tailed 82
Turca, Moustached 288
Turnstone, Ruddy 186
Tyrant, Chocolate-vented 296
Patagonian 316
Spectacled 306

Veery 328
Vireo, Red-eyed 336
Vulture, Black 130
Turkey 130
Yellow-headed 132

Warbler, Blackpoll 336
Warbling Doradito 312
Whimbrel 196
Chiloe Wigeon 118
Willet 188
Wiretail, Des Mur's 278
Woodpecker, Magellanic 264
Striped 262
Woodstar, Chilean 258
Wren, Grass 326
House 326

Yellow-Finch,
Brigth-rumped 344
Grassland 348
Greater 346
Greenish 346
Patagonian 346
Yellowlegs, Greater 184
Lesser 184

REGISTER

Adelie-Pinguin 76
Aguja 136
Anden-Gans 112
Anden-Kiebitz 166
Anden-Kolibri 254
Anden-Move 216
Anden-Säbelschnäbler 178
Anden-Schwalbe 322
Anden-Steisshuhn 28
Anden-Tapaculo 292
Anden-Wellenläufer 70
Andenente 118
Andensegler 252
Andenspecht 262
Antipoden-Seeschwalbe 222
Aplomado-Falke 148
Araukaner-Kauz 246
Araukaner-Taube 232
Armillata-Huhn 158
Aschbrust-Sierra-Fink 360
Atacama-Kolibri 256
Augenbrauenente 118
Aymara-Täubchen 236
Azara-Regenpfeifer 170
Bahamaente 120
Baird-Strandlaufer 190
Bänder-Regenpfeifer 174
Bänder-Specht 262
Bartzeisig 368
Bekassine 198
Belcher-Sturmvogel 56
Benteveo 310
Berg-Karakara 144
Berg-Tyrann 294
Bergstrandlaufer 192
Bigua-Scharbe 90
Binden-Fregattvogel 94
Binden-Ruderente 128
Binden-Taucher 34
Binden-Uferwipper 276
Bindenstrandlaufer 194
Blassfuss-Sturmvogel 60
Blassfuss-Sturmvogel 64
Blau-Noddi 230
Blau-Reiher 98
Blau-Sturmvogel 54
Blauaugen-Kormoran 92
Blauflügelente 120
Blaufuss-Tölpel 84
Blutschnabelmöwe 214
Brand-Seeschwalbe 226
Braun-Pelikan 88
Braun-Skua 210
Braun-Tölpel 86
Braunbauch-Erdhacker 272
Braunkehl-Huet-Huet 288
Braunkehl-Pfäffchen 342
Braun-Kuhstarling 350
Braunmantel-Ämmerling 358
Braunmantel-Austernfischer 176
Braunsteiss-Diuca-Fink 362
Brillen-Seeschwalbe 224
Brillen-Sichler 102
Brillen-Tyrann 306
Buller-Albatros 40
Buntfalke 148

Buntfuss-Sturmschwalbe 66
Buntscharbe 92
Busch-Elänie 308

Chiguanco-Drossel 328
Chile-Flamingo 108
Chile-Kolibri 256
Chile-Pfeifente 118
Chile-Spottdrossel 332
Chile-Steisshuhn 28
Chilenische-Skua 210
Chimango 144
Cook-Sturmvogel 48
Cora-Kolibri 258
Cordilleren-Ämmerling 356
Cordilleren-Bekassine 200
Cordilleren-Zeisig 366
Cordillerenlaufer 204
Coscoroba-Schwan 110

Darwin-Strauss / Nandu 32
Darwin-Tyrann 316
Dickschnabel-Zeisig 364
Diuca-Fink 362
Dominikaner-Mowe 216
Drosseluferlaufer 186
Dunkel-Albatros 42
Dunkel-Sturmvogel 62

Einfarb-Ämmerling 358
Einfarb-Uferwipper 276
Einsamer Wasserlaufer 184
Elliot-Sturmschwalbe 66
Esels-Pinguin 76
Eskimc-Brachvogel 196
Eytonschlüpfer 282

Fahlbrust-Schlüpfer 284
Falken-Raubmöwe 212
Falkland-Karakara 146
Falkland-Regenpfeifer 170
Falkland-Seeschwalbe 220
Fasan 152
Feen-Seeschwalbe 228
Feen-Sturmvogel 58
Feinschnabel-Ammerfink 364
Felsen-Erdhacker 272
Felsen-Kormoran 90
Felsen-Pinguin 78
Felsen-Sittich 240
Felsen-Tyrann 302
Felsentaube 232
Feueraugen-Tyrann 296
Feueriand-Erdhacker 270

Feuerland-Schwalbe 320
Fischadler 134
Flügelstreif-Uferwipper 278
Fluss-Seeschwalbe 220
Franklin-Mowe 216
Fuchs-Löffelente 122
Furchen-Tangare 338

Gabel-Schwalbe 320
Gabelschwanz-Mowe 218
Gabelschwanz-Tyrann 312
Galapagos-Kuckuck 242
Galapagos-Wellenläufer 70
Garnot-Sturmvogel 72
Gelbe Baumente 110
Gelbfuss-Flamingo 108
Gelbnacken-Tyrann 300
Gelbschenkel 184
Gelbschnabel-Tachuri 314
Gischtlaufer 188
Gleitaar 136

Goldbauch-Gilbamrner 346
Goldbürzel-Gilbammer 344
Goldschnabel-Saltator 340
Goldschnabel-Täubchen 236
Goldschopf-Pinguin 78
Goldschulterstärling 352
Gradschnabel-Erdhacker 272
Grau-Erdhacker 266
Grau-Sturmvogel 58
Graubrust-Strandlaufer 192
Grauflanken-Uferwipper 276
Graukehl-Höhenlaufer 204
Graukopf-Albatros 40
Graukopf-Gans 112
Graumöwe 214
Graunacken-Sturmvogel 62
Grauralle 154
Graurücken-Sturmschwalbe 66
Grauschulter-Hakenschnabel 344
Grauweihe 140
Grosser Gelbschenkel 184
Grünfischer 260
Guano-Kormoran 90
Guano-Tölpel 84

Hall-Sturmvogel 44
Haussperling 368
Hauszaunkönig 326
Hellmayr-Pieper 334
Höhlenschwalbe 324
Hudsonschnepfe 196
Humboldt-Pinguin 78

Indianerblässhuhn 158
Inka-Seeschwalbe 228
Inka-Taucher 34
Insel-Tachuri 314
Isabellerdhacker 266

Jacarini 342
Juan-Fernández-Kolibri 256

Kaiser-Pinguin 74
Kamp-Pieper 334
Kaninchen-Erdhacker 268
Kanincheneule 248
Kap-Sturmvogel 46
Kappen-Sturmvogel 60
Kapuzen-Ämmerling 356
Karakara 146
Kehlstreif-Pinguin 76
Kelp-Gans 114
Kerguelen-Sturmvogel 54
Kermadec-Sturmvogel 50
Kiebitz-Regenpfeifer 166
King-Schlüpfer 284
Kl. Gelbkopf-Geier 132
Kleiner Enten-Sturmvogel 56
Kleiner-Sturmvogel 62
Klippen-Regenpfeifer 172
Klippen-Tyrann 302
Kluft-Tyrann 306
Knutt 188
Kondor 130
Königs-Albatros 38
Königs-Kormoran 92
Königs-Pinguin 74
Königs-Tyrann 310
Kreyenborg-Falke 148
Kuckucksente 128
Kuh-Reiher 98

Kurzschnabel-Flamingo 108
Kurzschnabel-Gilbammer 348
Küsten-Seeschwalbe 222

Lachfalke 150
Langflügel-
Dampfschiffente 116
Langflügel-Sturmvogel 52
Langschnabel-Sittich 240
Lerchen-Tyrann 304
Lummen-Sturmvogel 72

Mac Cormick-Skua 210
Magellan-Ämmerling 356
Magellan-Austernfischer 176
Magellan-Bussard 138
Magellan-Dampfschiffente 116
Magellan-Drossel 328
Magellan-Gans 114
Magellan-Gilbammer 346
Magellan-Pinguin 80
Magellan-Regenpfeifer 174
Magellan-Sturmvogel 72
Magellan-Taucher 35
Magellan-Zeisig 366
Magellanlaufer 204
Magellanralle 154
Magellanspecht 264
Maguari-Storch 106

Mangroven-Reiher 98
Marmorschnepfe 198
Masafuera-Schlüpfer 280
Masken-Tölpel 84
Masken-Tyrann 302
Maskenpfuhlhuhn 156
Meisen-Tachuri 314
Mollymauk 38
Morgenammer 348
Moschusente 126

Nachtreiher 100
Nacktgesicht-Täubchen, 236
Noddi-Seeschwalbe 228

Ockerkehl-Schlüpfer 284
Odinshühnchen 202
Ohrfleck-Taube 234
Olivbrust-Gilbammer 346

Pardelralle 154
Patagonien-Mowe 218
Patagonien-Steisshuhn 30
Peposaka-Ente 122
Perl-Steisshuhn 30
Peru-Seeschwalbe 226
Peru-Triel 164
Phoenix-Sturmvogel 50
Picui-Täubchen 234
Pisacca 28
Pracht-Fregattvogel 94
Prärie-Strandlaufer 194
Puna Bussard 138
Puna-Bekassine 198
Puna-Erdhacker 268
Puna-Regenpfeifer 170
Puna-Steisshuhn 30
Puna-Tyrann 298
Punaente 126
Purpur-Tyrann 308

Rabengeier 130
Rahmbauchdrossel 330

Rauch-Schwalbe 322
Regen-Sturmvogel 52
Regenbrachvogel 196
Reisstärling 354
Riefenschnabel-Ani 242
Riesen-Fischer 260
Riesen-Kolibri 254
Riesenblässhuhn 160
Riesensturmvogel 44
Rohrdoradito 312
Rohrschlüpfer 280
Rolland-Taucher 34
Rosa-Löffler 104
Rost-Tyrann 308
Rostflanken-Spottdrossel 332
Rostflanken-Tapaculo 290
Rot-Täubchen 234
Rotaugen-Vireo 336
Rotaugenente 124
Rotbrust-Regenpfeifer 172
Rotfusskauz 248
Rotkäppchen-Tyrann 298
Rotkehl-Tapaculo 290
Rotkopf-Gans 112
Rotnacken-Tyrann 298
Rotruckenbussard 138
Rotschnabel-Tropikvogel 82
Rotschwanz-Erdhacker 268
Rotschwanz-Pflanzenmäher 318
Rotschwanz-Tropikvogel 82
Rotstirn-Jacana 180
Rotstirn-Spitzschnabel 338
Rotstirnblässhuhn 160
Russ-Albatros 42
Russ-Austernfischer 176
Russ-Seeschwalbe 224
Russ-Wellenläufer 70
Russelblasshuhn 162
Salvin-Sturmvogel 48
Sand-Regenpfeifer 168
Sand-Strandlaufer 192
Sanderling 194
Savannen-Pieper 334
Scheidenschnabel 208
Schieferralle 156
Schlammtreter 188
Schleiereule 244
Schlicht-Catamenie 344
Schluchten-Tyrann 306
Schmalschnabel-Sichler 102
Schmarotzer-Raubmöwe 212
Schmuck-Reiher 96
Schmuck-Seeschwalbe 226
Schnee-Sturmvogel 46
Schopfente 116
Schopfwachtel 152
Schornsteinsegler 252
Schrei-Regenpfeifer 172
Schuppenkehl-Erdhacker 270
Schwalben-Möwe 218
Schwanzmeisenschlüpfer 282
Schwarz-Zeisig 366
Schwarzbauch-Meerläufer 68
Schwarzfleck-Sierra-Fink 360
Schwarzhals-Schwan 110
Schwarzkehl-Ammerfink 362
Schwarzkehl-Huet-Huet 288
Schwarzkopf-Ruderente 126
Schwarzmantel-Scherenschnabel 230

Schwarzschnabel-Sturmvogel 64
Schwarzschwanzschlüpfer 282
Schwarzsteiss-Schwalbe 320
Schwarzstirn-Tyrann 300
Sechsfedemschlüpfer 278
See-Regenpfeifer 168
Seggen-Zaunkönig 326
Seiden-Kuhstärling 350
Silber-Reiher 96
Silber-Sturmvogel 44
Silberente 124
Simeonsmöwe 214
Smaragd-Sittich 240
Sokoi-Reiher 96
Soldatenstärling 352
Sommer-Tangare 340
Spatelraubmöwe 212
Spechttöpfer 286
Spiegel-Catamenie 342
Spiegel-Nachtschwalbe 250
Spitzschwanzente 124
Sporn-Tyrann 304
Stachelkopfstärling 350
Stachelschwanzschlüpfer 278
Steinwälzer 186
Stejneger-Sturmvogel 48
Stelzenlaufer 178
Strandwipper 274
Strauch-Ämmerling 358
Streifen-Dommel 100
Streifen-Tachuri 316
Streifen-Tyrann 310
Streifenbauch-Uferwipper 274
Streifenschlüpfer 280
Streifenwaldsänger 336
Strichelkauz 246
Strichelkopfspecht 262
Stummel-Tyrann 304
Sturzbachente 122
Südtrinidad-Sturmvogel 50
Sumpfohreule 248

Tauben-Sturmvogel 56
Teichralle 156
Tero-Tero 166
Texas-Nachtschwalbe 250
Thorshühnchen 202
Trauerseeschwalbe 220
Truthahngeier 130
Turco 288

Uferschwalbe 322

Vielfarben-Tachuri 312
Virginia-Uhu 246

Waldstorch 106
Wander-Regenpfeifer 168
Wanderalbatros 38
Wanderfalke 146
Wanderwasserlaufer 186
Weihnachts-Sturmvogel 64
Weissbauch-Meerläufer 68
Weissbinden-Spottdrossel 332
Weissbrauen-Tyrann 294
Weissbrauenstärling 354
Weissbrauenweihe 142
Weissbugtäubchen 238
Weissbürzel-Strandlaufer 190
Weissflanken-Kolibri 254
Weissflecken-Goldschnepfe 182
Weissflügel-Sturmvogel 46
Weissflügel-Taube 232
Weissflügelblässhuhn 160

Weisshals-Ibis 102
Weisskappen-Albatros 40
Weisskehl-Bussard 140
Weisskehl-Erdhacker 270
Weisskehl-Karakara 144
Weisskehl-Meerläufer 68
Weisskehl-Tapaculo 290
Weisskehl-Sierra-Fink 360
Weisskinn-Sturmvogel 58
Weisskopf-Seeschwalbe 222
Weisskopf-Sturmvogel 52
Weissschenkelsoldatenstärling 352
Weissschulter-Monjita 296
Weissschwanz-Tropikvogel 82
Weissschwanz-Tyrann 296
Weissstirnspitzschnabel 338
Westland-Sturmvogel 60
Wiesenstrandlaufer 190
Wilson-Drossel 328
Wilsons-Wassertreter 202
Würger-Tyrann 294
Wüsten-Bussard 140

Yarrel-Kolibri 258

Zimtente 120
Zitronen-Sittich 242
Zügel-Ammerfink 364
Zügel-Seeschwalbe 224
Zügel-Tyrann 300
Zweifarbensperber 136
Zwerghöhenlaufer 206
Zwergsultanshuhn 158

LITERATURA CONSULTADA

ALEXANDER, W.B. 1955. ***Birds of the Ocean.*** **Putnam.**

AMERICAN ORNITHOLOGISTS' UNION. 1983. ***Check-list of North American birds.*** **6th edition.**

ARAYA, B. 1985. ***Lista patrón de las aves chilenas.*** **2ª edición. Publ. Ocas. 3, Instituto de Oceanología, Universidad de Valparaíso.**

CASTRI, F. di. 1979. ***Esquisse ecologique du Chili.*** **In: Debouttevilleet y Rapoport (eds) Biologie de l'Amerique Australe IV: 7-52.**

DUFFY, D.C. 1986. ***Distribución del Pingüino de Humboldt*** **(in litt.).**

FALLA, R.A., R.B. SIBSON & E.G. TURBOTT. 1982. ***The new guide to the birds of New Zealand.*** **Collins. Auckland and London.**

GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON & R.A. PHILIPPI. 1946y 1951. ***Las Aves de Chile.*** **Vol. 1 y 2. Platt, Buenos Aires.**

GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON & R.A. PHILIPPI. 1957 y 1964. ***Suplemento y 2º Suplemento de las Aves de Chile.*** **Platt, Buenos Aires.**

HELLMAYR, C.E. 1932. ***The birds of Chile.*** **Field Museum of Natural History Publ. 308. Zoological Series. XIX: 1-472.**

HOUSSE, R. 1945. ***Las aves de Chile en su clasificación moderna.*** **Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago.**

HUMPHREY, P.S., D. BRIDGE; P.W. REYNOLDS; R.T. PETERSON. 1970. ***Birds of Isla Grande*** **(Tierra del Fuego). Preliminary Smithsonian Manual. Washington, D.C.**

JOHNSON, A.W. 1972. ***Supplement to The Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru.*** **Platt, Buenos Aires.**

KING, W.B. 1967. ***Seabirds of the tropical Pacific ocean.*** **Smithsonian Institution. Washington, D.C.**

KOEPCKE, M. 1964. ***Las aves del departamento de Lima.*** **Gráfica Morsom S.A. Lima, Perú.**

MAYR, E. & F. VUILLEUMIER. 1983. ***New species of birds described from 1966 to 1975.*** **J. Orn. 124(3): 217-232.**

MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. ***A guide to the birds of South America.*** **Livingston Publishing Co. Wynnewood, Pensylvania.**

MURPHY, R.C. 1936. *Oceanic birds of South America.* Vol. 1 y 2. Macmillan.

NAROSKY T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

OLROG, C.C. 1968. *Las aves sudamericanas.* Una guía de campo. I (Pingüinos - Pájaros Carpinteros). Universidad Nacional de Tucumán, Fundación Instituto "Miguel Lillo".

OYARZO H. y T. CEKALOVIC. 1985. *Aves observadas y capturadas en tramos de la Carretera Austral* (Chile) *con nuevas localidades.* Bol. de la Soc. de Biología de Concepción 56: 141-144.

PHILIPPI, R.A. 1964. *Catálogo de las aves chilenas con su distribución geográfica.* Inv. Zool. Chilenas XI: 1-179.

PISANO, EDMUNDO. 1966. *Zonas biogeográficas.* En: Geografía Económica de Chile, CORFO. Primer apéndice. Edit. Universitaria: 62-73.

RIVEROS, G. y J. THIELE. 1982. *Guía de campo para el reconocimiento de las aves del Parque Nacional "La Campana", V Región, Chile,* CONAF y Acad. Sup. Cs. Ped. Valparaíso.

SCHLATTER, R.P. 1973. *Observación de un pato casero* (CAIRINA MOSCHATA) asilvestrado. Bol. Ornitológico 5(1): 11.

SCHLATTER, R.P. 1977. *Una Fardela nueva para los mares chilenos* PTERODROMA BREVIROSTRIS, Lesson 1831 (Procellariiformes, Aves). Not. Men. M.N.H.N., XXI (245-246): 7-8.

SCOTT, P. 1965. *A coloured key to the wildfowl of the world.* The Wildfowl Trust. W.R. Royle & Son Ltd., London.

SLATER, P. 1972. *A field guide to Australian birds.* Oliver & Boyd, Edinburgh.

THOMSON, A.L. (ed.) 1965. *A new dictionary of birds.* Nelson, Edinburgh.

TODD, F.S. 1979. *Waterfowl.* Ducks, geese and swans of the world. Sea World Press.

TUCK, G. & H. HEINZEL. 1980. *A field guide to the seabirds of Britain and the world.* Collins, London.

VAN TYNE, J. & A. J. BERGER. 1959. *Fundamentals of Ornithology.* John Wiley & Sons, Inc. New York.

VAURIE, Ch. 1980. *Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae* (Aves, Passeriformes). Bull. American Mus. Nat. Hist. 166(1): 1-357.

VENEGAS, C. y H.J. JORY. 1979. *Guía de campo para las aves de Magallanes.* Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, Chile.

VENEGAS, C. 1982. *Suplemento a la guía de campo para las aves de Magallanes.* Ans. Inst. Pat., Punta Arenas (Chile). 13: 189-206.

WATSON, G.E., R.L. SUZI & R.E. STORER. 1963. *Preliminary field guide to the birds of the Indian ocean.* Smithsonian Institution, Washington, D.C.

WATSON, G.E. 1966. *Seabirds of the tropical Atlantic ocean.* Smithsonian Press, Washington, D.C.

WATSON, G.E. 1975. *Birds of the Antarctic and Sub-Antarctic.* American Geophysical Union. Washington, D.C.

WETMORE, A. 1960. *A classification for the birds of the world.* Smithsonian Mise. Col. 139: 1-37.

YÁÑEZ, P. 1949. *Vertebrados marinos chilenos.* II Aves. Rev. Biol. Mar., Valparaíso I (3): 183-228 y II(1): 1-42.

Esta *Guía de Campo de las Aves de Chile* es una herramienta de trabajo y está concebida para que los interesados en las aves, ya sean profesionales o aficionados, puedan identificarlas en el terreno con la ayuda de prismáticos.

Las descripciones, en lenguaje conciso, dan las características principales que ayudarán, junto con los dibujos, a identificar las aves, paso previo para cualquier estudio o simplemente para satisfacer la curiosidad de los amantes de la naturaleza a quienes está dedicada esta obra.

En Chile se encuentran 439 especies de aves, representantes de 56 familias, que constituyen el 5% de las 8.600 especies existentes en el mundo.

Acompañan al texto, en esta nueva edición, varias láminas a todo color, un glosario y la lista de los nombres científicos de las aves, así como su denominación común en castellano, inglés y alemán.

Braulio Araya es *Research Associate* del *Sea World Research Institute, Hubbs Marine Research Center.*

EDITORIAL UNIVERSITARIA